


Nombre complexe

- Le nombre de la forme $z = a + bi$ tel que $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ s'appelle nombre complexe .
 - $a = \operatorname{Re}(z)$ partie réelle de z ; $b = \operatorname{Im}(z)$ partie imaginaire de z .
 - $z = a \in \mathbb{R}$ s'appelle réel pur ; $z = bi$; ($b \in \mathbb{R}^*$) s'appelle nombre complexe imaginaire pur
 - $\bar{z} = a - bi$ s'appelle le conjugué de $z = a + bi$.
 - \mathbb{C} est l'ensemble des nombres complexes . \mathbb{C} est muni des opérations l'addition et la multiplication qui prolongent les mêmes opérations dans \mathbb{R} ont mêmes propriétés que dans \mathbb{R} . le reste de la leçon on considéré $z = x + yi$ et $z' = x' + y'i$ de \mathbb{C} ($a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$)
 - ❖ Addition dans \mathbb{C} : $z + z' = x + yi + x' + y'i = (x + x') + (y + y')i$. $x, y, x', y' \in \mathbb{R}$
 - ❖ Multiplication dans \mathbb{C} : $z \times z' = (x + yi) \times (x' + y'i) = (xx' - yy') + (xy' + yx')i$.
 - cas particulier $k \in \mathbb{R}$: $k \cdot z = k \cdot (x + yi) = kx + kyi$
 - ❖ L'inverse de $z = a + bi \neq 0$ ($(a, b) \neq (0, 0)$) :
- $$\frac{1}{z'} = \frac{1}{x' + y'i} = \frac{1 \times \bar{z}'}{z' \bar{z}'} = \frac{1 \times (x' - y'i)}{(x' + y'i)(x' - y'i)} = \frac{x'}{x'^2 + y'^2} - \frac{y'}{x'^2 + y'^2}i .$$
- ❖ Le quotient de z par z' : $\frac{z}{z'} = \frac{x + yi}{x' + y'i} = \frac{z \times \bar{z}'}{z' \times \bar{z}'} = \frac{1}{z' \times \bar{z}'} \times z \times \bar{z}'$



$$= \frac{1}{x'^2 + y'^2} \times (x + yi)(x' - y'i) = \frac{xx' + yy'}{x'^2 + y'^2} + \frac{yx' - xy'}{x'^2 + y'^2}i$$



Présentation géométrique d'un nombre complexe

Le plan (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

- A tout nombre complexe $z = x + yi$ de \mathbb{C} on lui associe le point $M(x, y)$ de (P) c.à.d. :
- $f : \mathbb{C} \rightarrow (P)$
- $z = x + yi \mapsto f(z) = f(x + yi) = M(x, y)$ (ou bien $\overrightarrow{OM} = \vec{xu} + \vec{yv}$)
- ❖ Dans ce cas :
- Le plan (P) est appelé le plan complexe .
- le point $M(x, y)$ est l'image du complexe $z = x + yi$.
- on note M_z ou $M_{(x+yi)}$ on lit le point M d'affixe z . de même pour le vecteur \overrightarrow{OM} .
- on note aussi z_M on lit z est l'affixe de M . de même pour $z_{\overrightarrow{OM}}$.
- Si $z = a \in \mathbb{R}$ alors M est sur l'axe des abscisses sera nommé axe réel .
- Si $z = bi$, ($b \in \mathbb{R}$) alors M est sur l'axe des ordonnées sera nommé axe imaginaire .

Propriétés des affixes	<p>$A(z_A)$; $B(z_A)$; $C(z_C)$ et $I(z_I)$ sont trois points du plan complexe (P).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Le vecteur \overrightarrow{AB} a pour affixe $z_B - z_A$. ❖ Le vecteur $k\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $k(z_B - z_A)$. ❖ Le point I milieu de $[A, B]$ a pour affixe $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$. ❖ $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$; ($k \in \mathbb{R}$) c^od^o $z_C - z_A = k(z_B - z_A)$ ou bien $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = k \in \mathbb{R}$ d'où les points A et B et C sont alignés (avec $z_B - z_A \neq 0$) 		
	Conjugué de $z = x + yi$ et Propriétés		<ul style="list-style-type: none"> • $z' = x - yi$ est appelé le conjugué de z on note $z' = \bar{z} = x - yi$. • $z + \bar{z} = 2x = 2\operatorname{Re}(z)$ et $z - \bar{z} = 2yi = 2\operatorname{Im}(z)i$. • $z = z$ et $z \times \bar{z} = x^2 + y^2$ et $\bar{z} + z' = \bar{z} + z'$ et $\bar{z} \times z' = \bar{z} \times \bar{z}'$ • $(z' \neq 0)$; $\left(\frac{1}{z'}\right) = \frac{1}{z'}$; $\left(\frac{z}{z'}\right) = \frac{z}{z'}$ et $\bar{z}^p = (\bar{z})^p$; $p \in \mathbb{Z}$ (avec $z \neq 0$ si $p \in \mathbb{Z}^-$)
	Module de $z = x + yi$	<ul style="list-style-type: none"> • Le nombre réel positif $\sqrt{zz} = \sqrt{x^2 + y^2}$ s'appelle le module de z sera noté $z = \sqrt{zz} = \sqrt{x^2 + y^2}$. • Interprétation géométrique du module de z: $z = \sqrt{x^2 + y^2} = \ \overrightarrow{OM}\$ avec M d'affixe $z = x + yi$. • D'où: $\ \overrightarrow{AB}\ = AB = z_B - z_A$. • $\left \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right = \frac{AB}{AC}$ donc si on a $\left \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right = \frac{AB}{AC} = 1$ alors le triangle ABC est isocèle en A. 	
	Propriétés du module	$ z = -z = z = -\bar{z} $ $\left \frac{1}{z'}\right = \frac{1}{ z' }; \left \frac{z}{z'}\right = \frac{ z }{ z' } \quad (z' \neq 0)$	$ z + z' \leq z + z' $ $ z \times z' = z \times z' $ $ z^p = z ^p, p \in \mathbb{Z} \text{ et } z \neq 0$
	Argument d'un nombre complexe non nul		<p>$M_{(z)}$ ($M_{(z)} \neq O$ donc $z \neq 0$) est un point du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toute mesure α de l'angle orienté (\vec{u}, \vec{v}) s'appelle argument du nombre complexe z on note : $\arg(z) \equiv \alpha [2\pi]; \text{ d'où } \arg(z) \equiv [\overrightarrow{u, OM}] [2\pi] \text{ ou } \arg(z) = \alpha + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}$
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> • $z = a > 0$ alors $\arg(a) \equiv 0 [2\pi]$ et $z = a < 0$ alors $\arg(a) \equiv \pi [2\pi]$. 		

- $z = bi ; b > 0$ alors $\arg(z) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$ et $z = bi ; b < 0$ alors $\arg(z) = -\frac{\pi}{2} [2\pi]$.
- $\arg(-z) = \pi + \arg(z) [2\pi]$ et $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) [2\pi]$ (sans oublier $z \neq 0$).

Propriétés des arguments	$\arg(z \times z') = \arg z + \arg z' [2\pi]$	$p \in \mathbb{Z} ; \arg(z^p) = p \times \arg z [2\pi]$
	$\arg\left(\frac{1}{z'}\right) = -\arg z' [2\pi]$	$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' [2\pi]$
	Si $k > 0$ alors $\arg(kz) = \arg(z) [2\pi]$	Si $k > 0$ alors $\arg(kz) = \pi + \arg(z) [2\pi]$

« écriture trigonométrique (forme trigonométrique) D'un nombre complexe non nul	$z = x + yi \in \mathbb{C}^* ; (z \neq 0)$ tel que $\arg(z) = \alpha [2\pi]$; $ z = r$. Le nombre complexe z s'écrit de la forme suivante : $z = z (\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ou $z = \sqrt{x^2 + y^2}(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ou $z = [r, \alpha]$ chaque écriture s'appelle écriture trigonométrique ou forme trigonométrique du nombre complexe non nul z
---	--

Remarque	$z = a > 0$ alors $z = [a, 0]$, $z = a < 0$ alors $z = [-a, \pi]$ $z = bi ; b > 0$ alors $[b, \frac{\pi}{2}]$, $z = bi ; b < 0$ alors $[b, -\frac{\pi}{2}]$
----------	--

Operations sur les formes trigonométriques  Abraham de Moivre en 1736	Les opérations	$z = [r, \alpha] = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, $z' = [r', \alpha'] = r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')$
	Produit : $z \times z'$	$z \times z' = [r, \alpha] \times [r', \alpha'] = [r \times r', \alpha + \alpha']$ ou $z z' = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \times r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha') = rr'(\cos(\alpha + \alpha') + i \sin(\alpha + \alpha'))$
	Produit : $\underbrace{z \times z \times \dots z}_{n \text{ fois}} = z^n$	$z^n = [r, \alpha]^n = [r^n, n\alpha]$ $z^n = (r(\cos \alpha + i \sin \alpha))^n = r^n(\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$ Cas particulier $r = 1$: $[1, \alpha]^n = [1^n, n\alpha] = [1, n\alpha]$ ou encore $(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$ formule de MOIVRE
	Inverse	$\frac{1}{z'} = \frac{1}{[r', \alpha']} = [r', -\alpha']$ ou $\frac{1}{z'} = \frac{1}{r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')} = \frac{1}{r'}(\cos(-\alpha') + i \sin(-\alpha'))$
	Quotient	$\frac{z}{z'} = \frac{[r, \alpha]}{[r', \alpha']} = \left[\frac{r}{r'}, \alpha - \alpha' \right]$ ou $\frac{z}{z'} = \frac{r(\cos \alpha + i \sin \alpha)}{r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')} = \frac{r}{r'}(\cos(\alpha - \alpha') + i \sin(\alpha - \alpha'))$

Notation exponentielle ou écriture exponentielle D'un nombre complexe non nul

- L'écriture trigonométrique de $z = [r, \alpha] = [|\mathbf{z}|, \arg z]$ sera notée de la manière suivante $z = [r, \alpha] = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) = e^{i\alpha}$
- $z = e^{i\alpha}$ s'appelle l'écriture exponentielle ou la forme exponentielle de z non nul
- propriétés : $(e^{i\alpha})^n = e^{in\alpha}$; $\frac{e^{i\alpha}}{e^{i\beta}} = e^{i(\alpha-\beta)}$; $\frac{1}{e^{i\beta}} = e^{i\beta}$; $e^{i\alpha} \times e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ avec α et β de \mathbb{R} et $n \in \mathbb{Z}$.

Formules d'EULER

Leonhard EULER
(Bâle 1707, Saint-Pétersbourg 1783)



La notation i fut introduite par Euler, le grand mathématicien suisse. Dans ce livre, on notera j à la place de i , notation utilisée pour l'intensité en électricité.

$\alpha \in \mathbb{R}$ on pose $z = [r, \alpha] = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ on a :

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \\ \sin \alpha = \frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \end{cases} \text{ on les appelle formules d'EULER}$$

Remarque : avec $z = \cos \alpha + i \sin \alpha = e^{i\alpha}$

- $e^{in\alpha} + e^{-in\alpha} = z^n + (\bar{z})^n = 2 \cos n\alpha$
- $e^{in\alpha} - e^{-in\alpha} = z^n - (\bar{z})^n = 2i \sin n\alpha$.
- $e^{in\alpha} \times e^{-in\alpha} = z^n \times (\bar{z})^n = 1$

Equation du deuxième degré de la forme $z \in \mathbb{C} / z^2 = a$

$a = 0$ alors $S = \{0\}$

$a > 0$ alors $S = \{\sqrt{a}, -\sqrt{a}\}$

$a < 0$ alors $S = \{i\sqrt{-a}, -i\sqrt{-a}\}$

Equation du 2^{ème} degré de la forme $z \in \mathbb{C} / az^2 + bz + c = 0$; $a \in \mathbb{R}^*$ $b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$ avec $\Delta = b^2 - 4ac$

• $\Delta = 0$ donc $S = \left\{ \frac{-b}{2a} \right\}$

• $\Delta > 0$ donc deux solutions réelles : $z_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$.

• $\Delta < 0$ donc deux solutions complexes conjuguées : $z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Remarques: factorisation de $az^2 + bz + c$

- $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 \times z_2 = \frac{c}{a}$.
- $\Delta \neq 0$ alors $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$.
- $\Delta = 0$ alors $az^2 + bz + c = a(z - z_1)^2$

Écriture complexe des transformations (noté T ou bien f): translation - homothétie - rotation

Transformation f dans le plan complexe qui transforme le point $M(z)$ au point $M'(z')$

$f : (P) \rightarrow (P)$

C'est-à-dire

$$M(z) \mapsto f(M(z)) = M'(z')$$

On donne T ou bien f Donc il faut déterminer

la nature de T ou bien f et Ses éléments caractéristiques

Rappel Transformation est :	Ecriture complexe	Transformation donnée de la forme f transforme le point $M(z)$ au point $M'(z')$ avec $z' = az + b$; ($a, b \in \mathbb{C}$) Le programme se limite à trois cas (les valeurs de a)
Translation : $f = t_{\vec{u}}$ $f(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$	$z' - z = b$ ou bien $z' = z + b$	1 ^{er} cas $a = 1$ on a : $z' = z + b$ Nature de la transformation : f est une Translation Eléments caractéristiques : • b est l'affixe du vecteur \vec{u} de la translation f .
Homothétie : $f = h(\Omega, k)$ Ω centre de l'homothétie k rapport de l'homothétie définition : $f(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$	$z' - \omega = k(z - \omega)$ ou bien $z' = kz + b$ ($b = \omega - k\omega \in \mathbb{C}$)	2 ^{ième} cas $a = k \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ on a : $z' = kz + b$ Nature de la transformation f : f est une Homothétie Eléments caractéristiques : • k rapport de l'homothétie f • $\omega = \frac{b}{1-k} = \frac{b}{1-a}$ est l'affixe du centre Ω de l'homothétie f • Remarque : Ω est invariant par f donc $f(\Omega) = \Omega$ D'où : $z' = kz + b \Leftrightarrow \omega = k\omega + b$ donc $\omega = \frac{b}{1-k}$
Rotation : $f = r(\Omega, \alpha)$ Ω centre de l'homothétie α angle de rotation définition : $f(M) = M' \Leftrightarrow$ $\begin{cases} \overrightarrow{\Omega M'} = \overrightarrow{\Omega M} \\ \left(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'} \right) \equiv \alpha \ (2\pi) \end{cases}$	$z' - \omega = (z - \omega)e^{i\alpha}$ ou bien $z' = e^{i\alpha}z + b$ ($b = \omega - \omega e^{i\alpha}$)	3 ^{ième} cas $ a = 1$ on a : $z' = e^{i\alpha}z + b$ ou $z' = az + b = (\cos \alpha + i \sin \alpha)z + b$ ou $z' = (x + yi)z + b$; (avec $ x + yi $) Nature de la transformation f : f est une Rotation Eléments caractéristiques : • α ou $\arg(x + yi)$ est l'angle de la rotation . • Ou $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{b}{1-e^{i\alpha}} = \frac{b}{1-(\cos \alpha + i \sin \alpha)} = \frac{b}{1-(x + yi)}$ $\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{b}{1-e^{i\alpha}}$ est l'affixe du centre Ω de la rotation f • Remarque : ❖ Ω est invariant par f donc $f(\Omega) = \Omega$ D'où : $z' = az + b \Leftrightarrow \omega = k\omega + b$ donc $\omega = \frac{b}{1-a}$. ❖ De même : $\alpha \equiv \arg\left(\frac{z' - \omega}{z - \omega}\right) (2\pi)$

la géométrie et Les nombres complexes

A et B et C et D et I cinq points du plan complexe tel que leurs affixes sont z_A et z_B et z_C et z_D et z_I

• $\|\overrightarrow{AB}\| = AB = |z_B - z_A|$

Mesure de $(\vec{u}, \overrightarrow{AB})$ est :

$$\left(\vec{u}, \overrightarrow{AB} \right) \equiv \arg(z_B - z_A) [2\pi]$$

• $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$ affixe de I milieu de $[AB]$

Mesure de $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$ est :

$$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} \right) \equiv \arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) [2\pi]$$

$$\overrightarrow{AC} = k \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow z_C - z_A = k(z_B - z_A)$$

$$\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = k \in \mathbb{R} \quad ; \quad (A \neq B)$$

A et B et C sont alignés équivaut à : $(\arg(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}) \equiv \pi [2\pi]$ ou

$$\arg(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}) \equiv 0 [2\pi]$$

Remarque : $\left(\arg(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}) \equiv 0 [2\pi] \text{ ou } \arg(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}) \equiv \pi [2\pi] \right)$

équivaut à $\arg(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}) \equiv 0 [\pi]$

Z_w et Z_t affixes des vecteurs \vec{u} et \vec{v} on a

$$\left(\vec{u}, \vec{v} \right) \equiv \arg(Z_w) - \arg(Z_t) [2\pi]$$

ou

$$\left(\vec{u}, \vec{v} \right) \equiv \arg\left(\frac{Z_t}{Z_w}\right) [2\pi]$$

\vec{u} et \vec{v} sont colinéaires équivaut $\frac{Z_w}{Z_t} \in \mathbb{R} \quad (Z_t \neq 0)$

A et B et C et D sont alignés ou cocycliques équivaut à

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} \times \frac{z_B - z_C}{z_D - z_C} \in \mathbb{R}$$

\vec{u} et \vec{v} sont orthogonaux équivaut $\frac{Z_t}{Z_w} = bi ; (b \in \mathbb{R}^*) \quad (Z_t \neq 0)$

$$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{Z_t}{Z_w}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$$

$(AB) // (CD) \Leftrightarrow \arg(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}) \equiv \pi [2\pi] \text{ ou } \arg(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}) \equiv 0 [2\pi]$

$$(AB) \perp (CD) \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} \right) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$$

$$\Leftrightarrow \arg(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}) \equiv 0 [\pi]$$

$$\Leftrightarrow \arg(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$$

Relation complexe

Signification géométrique

L'ensemble des M d'affixe z tel que : $|z - z_A| = |z - z_B|$

- AM = BM . M appartienne à la médiatrice du segment $[AB]$.
- L'ensemble des M c'est la médiatrice du segment $[AB]$.

$$|z - z_A| = k \quad (k > 0)$$

- AM = k
- M appartienne au cercle de centre A et de rayon k .

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[r; \pm \frac{\pi}{2} \right] = re^{\pm \frac{\pi}{2}i}$$

- Si $r \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ alors ABC est un triangle rectangle en A .
- Si $r = 1$ alors ABC est un triangle rectangle et isocèle en A .

$$\left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = 1$$

alors ABC est un triangle isocèle en A .

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \left[1; \pm \frac{\pi}{3} \right] = e^{\pm \frac{\pi}{3}i}$$

alors ABC est un triangle équilatéral .