

Solution de l'équation différentielle $(E) : y' = ay + b$ ($a \neq 0$)

La solution générale de l'équation différentielle (E) est l'ensemble des fonctions y

définies sur \mathbb{R} par : $y(x) = ke^{ax} - \frac{b}{a}$ avec $k \in \mathbb{R}$

Solution de l'équation différentielle $(E) : y'' + ay' + by = 0$

L'équation $r^2 + ar + b = 0$ s'appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle (E)

→ On calcule le discriminant Δ :

Si :	Alors l'équation caractéristique admet :	Alors l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) est l'ensemble des fonctions y définies sur \mathbb{R} par :
$\Delta > 0$	Deux solutions réels r_1 et r_2	$y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$ Tels que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
$\Delta = 0$	Solution double r_0	$y(x) = (\alpha x + \beta) e^{r_0 x}$ Tels que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
$\Delta < 0$	Deux solutions complexes conjuguées : $r_1 = p + iq$ et : $r_2 = \bar{r}_1$	$y(x) = e^{px} (\alpha \cos(qx) + \beta \sin(qx))$ tels que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

