هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

أجوبة امتحان الدورة العادية 2011

التمرين الأول :

1 أ

لنحل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $x^2+4x-5=0$.

لدينا : $\Delta = 4^2-4(-5)=16+20=36$

إذن : المعادلة تقبل حلين حقيقيين x_1 و x_2 معرفين بما يلي :

$$x_2=\frac{-4+6}{2}=1 \quad \text{و} \quad x_1=\frac{-4-6}{2}=-5$$

1 ب

لنحل في $]0;+\infty[$ المعادلة : $\ln(x^2+5)=\ln(x+2)+\ln(2x)$

نستعمل قواعد الدالة ln نجد : $\ln(x^2+5)=\ln\big(2x(x+2)\big)$

يعني : $\ln(x^2+5)=\ln(2x^2+4x)$

أي : $e^{\ln(x^2+5)}=e^{\ln(2x^2+4x)}$

يعني : $x^2+5=2x^2+4x$

و منه : $x^2+4x-5=0$

و هذه المعادلة تقبل في $\mathbb{R}$ الحلين -5 و 1 .

بما أن : $-5 \notin]0;+\infty[$ و $1 \in]0;+\infty[$.

فإن المعادلة : $\ln(x^2+5)=\ln(x+2)+\ln(2x)$ تقبل حلا وحيدا في $]0;+\infty[$ و هو 1 .

2

لنحل في $]0;+\infty[$ المتراجحة $\ln x+\ln(x+1)\geq \ln(x^2+1)$

هذه المتراجحة تصبح : $\ln(x^2+x)\geq \ln(x^2+1)$

بما أن الدالة ln تقابل من $\mathbb{R}_*^+$ نحو $\mathbb{R}$ فإن المتراجحة تصبح :

$x^2+x\geq x^2+1$

يعني : $x\geq 1$

و بالتالي : مجموعة حلول المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي 1 . أو بتعبير آخر : $\mathcal{S}=[1;+\infty[$

التمرين الثاني :

1

نعتبر العبارة (P_n) المعرفة بما يلي : (P_n) : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ u_n>0$

لدينا : $1>0$ إذن : $u_0=1>0$

و هذا يعني أن العبارة (P_0) صحيحة .

نفترض أن : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ u_n>0$

إذن : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ 5+8u_n>5>0$

و هذا يعني أن الكميتين u_n و $(5+8u_n)$ موجبتين قطعا .

إذن $\dfrac{u_n}{5+8u_n}$ كمية موجبة قطعا .

أي : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ \dfrac{u_n}{5+8u_n}>0$

يعني : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ u_{n+1}>0$

إذن : العبارة (P_{n+1}) صحيحة .

حصلنا إذن على النتائج التالية :

$$\begin{cases}(P_0)\ est\ vraie\\ (P_n)\implies(P_{n+1})\ ;\ (\forall n\epsilon\mathbb{N})\end{cases}$$

إذن حسب مبدأ الترجع : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ u_n>0$

2 أ

ليكن n عنصرا من $\mathbb{N}$. لدينا : $v_n=\frac{1}{u_n}+2$

إذن :

$$v_{n+1}=\frac{1}{u_{n+1}}+2=\frac{1}{\left(\frac{u_n}{5+8u_n}\right)}+2=\frac{5+8u_n}{u_n}+2$$

$$=\frac{5+10u_n}{u_n}=\frac{5}{u_n}+10=5\left(\frac{1}{u_n}+2\right)=5v_n$$

إذن : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ v_{n+1}=5\,v_n$

و هذا يعني أن المتتالية $(v_n)_{n\epsilon\mathbb{N}}$ هندسية و أساسها هو العدد 5 .

و منه فإن الحد العام v_n لهذه المتتالية يُكتب على الشكل :

$$v_n=v_0 5^{n-0}=\left(\frac{1}{u_0}+2\right)5^n=\left(\frac{1}{1}+2\right)5^n=3\times 5^n$$

إذن : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ v_n=3\times 5^n$

2 ب

نعلم أن : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ v_n=\frac{1}{u_n}+2$

إذن : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ v_n-2=\frac{1}{u_n}$

يعني : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ u_n=\frac{1}{v_n-2}$

إذن : $(\forall n\epsilon\mathbb{N})\ ;\ u_n=\frac{1}{3\times 5^n-2}$

نلاحظ أن التعبير 5^n عبارة عن متتالية هندسية أساسها 5 و هو عدد حقيقي أكبر من 1

إذن : $\lim\limits_{n\infty}5^n=+\infty$

و منه : $\lim\limits_{n\infty}u_n=\lim\limits_{n\infty}\left(\frac{1}{3\times 5^n-2}\right)=\frac{1}{+\infty}=0$

إذن : $\lim\limits_{n\infty}u_n=0$

التمرين الثالث :

1

لنحل في $\mathbb{C}$ المعادلة : $z^2-18z+82=0$

لدينا : $\Delta=(-18)^2-4\times 82=-4=(2i)^2$

إذن المعادلة تقبل حلين عقديين z_1 و z_2 معرفين بما يلي :

$$z_2=\frac{18+2i}{2}=9+i \quad \text{و} \quad z_1=\frac{18-2i}{2}=9-i$$

2 أ

لدينا : $\dfrac{c-b}{a-b}=\dfrac{(11-i)-(9-i)}{(9+i)-(9-i)}=\dfrac{2}{2i}=\dfrac{1}{i}=\dfrac{1\times i}{i\times i}=-i$

إذن : $\dfrac{c-b}{a-b}=-i$

و من هذه الكتابة الأخيرة نحصل على :

$$\begin{cases}\arg\left(\frac{c-b}{a-b}\right)\equiv\arg(-i)\ [2\pi]\\ \left|\frac{c-b}{a-b}\right|=|-i|\end{cases}$$

يعني :

$$\begin{cases}\arg\left(\frac{c-b}{a-b}\right)\equiv\frac{-\pi}{2}\ [2\pi]\\ \left|\frac{c-b}{a-b}\right|=1\end{cases}$$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع

أي : $\begin{cases} (\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}) \equiv \frac{-\pi}{2}\ [2\pi] \\ |c-b| = |a-b| \end{cases}$ أي : $\begin{cases} (\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}) \equiv \frac{-\pi}{2}\ [2\pi] \\ BC = BA \end{cases}$

و من هذه الكتابة الأخيرة نستنتج أن ABC مثلث قائم الزاوية و متساوي الساقين في نفس النقطة B .

ملاحظة : إذا كان $(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$ نقول أن ABC مثلث قائم الزاوية مباشر . و إذا كان $(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}) \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$ نقول أن ABC مثلث قائم الزاوية غير مباشر .

2 ب

لدينا : $|4(1-i)| = 4\sqrt{1^2+(-1)^2} = 4\sqrt{2}$

إذن : $4(1-i) = 4\sqrt{2}e^{i\theta}$

لنبحث الآن عن العمدة θ .

و من أجل ذلك ننطلق من : $4(1-i) = 4\sqrt{2}\cos\theta + i\,4\sqrt{2}\sin\theta$

يعني : $\begin{cases} 4 = 4\sqrt{2}\cos\theta \\ -4 = 4\sqrt{2}\sin\theta \end{cases}$

يعني : $\begin{cases} \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = \frac{-\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ يعني : $\begin{cases} \cos\theta = \cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) \\ \sin\theta = \sin\left(\frac{-\pi}{4}\right) \end{cases}$

إذن : $\theta \equiv \frac{-\pi}{4}\ [2\pi]$

و بالتالي : $4(1-i) = 4\sqrt{2}e^{\frac{-i\pi}{4}}$

2 ج

لدينا : $(c-a)(c-b) = (11-i-9-i)(11-i-9+i)$

و منه : $(c-a)(c-b) = 4(1-i)$

يعني : $|(c-a)(c-b)| = |4(1-i)|$

يعني : $|c-a| \times |c-b| = 4|1-i|$

إذن : $|c-a| \times |c-b| = 4\sqrt{2}$

يعني : $AC \times BC = 4\sqrt{2}$

2 د

لدينا $\mathcal{R}$ دوران معرف بما يلي : $\mathcal{R}_B\left(\frac{3\pi}{2}\right)$: $\begin{matrix} (\mathcal{P}) & \mapsto & (\mathcal{P}) \\ M(z) & \mapsto & M'(z') \end{matrix}$

ننطلق من المعطى : $\mathcal{R}(M) = M'$

إذن حسب التعريف العقدي للدوران : $(z'-b) = e^{\frac{i3\pi}{2}}(z-b)$

يعني : $(z'-9+i) = -i(z-9+i)$

يعني : $z'-9+i = -iz+9i+1$

يعني : $z' = -iz+8i+10$

إذن الدوران $\mathcal{R}$ يصبح : $\begin{matrix} (\mathcal{P}) & \mapsto & (\mathcal{P}) \\ M(z) & \mapsto & M'(-iz+8i+10) \end{matrix}$

لدينا : $-ic+8i+10 = -i(11-i)+8i+10$

$= -11i-1+8i+10 = -3i+9 = c' = aff(C')$

إذن حسب الكتابة العقدية للدوران $\mathcal{R}$ نستنتج أن : $\mathcal{R}(C) = C'$

و كذلك : $aff(C') = c' = 9-3i$

التمرين الرابع :

I 1 أ

ليكن x عنصرا من $\mathbb{R}$. لدينا : $g(x) = (1-x)e^x - 1$

إذن : $g'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$

إذن : $(\forall x \epsilon \mathbb{R})\ ;\ g'(x) = -xe^x$

I 1 ب

إذا كان $x \epsilon [0,+\infty[$ فإن : $-xe^x \leq 0$

و منه : $\forall\, x \epsilon [0;+\infty[\ ;\ g'(x) \leq 0$

و هذا يعني أن الدالة g تناقصية على $[0;+\infty[$.

إذا كان : $x \epsilon]-\infty;0]$ فإن : $-xe^x \geq 0$

و منه : $\forall\, x \epsilon [0;+\infty[\ ;\ g'(x) \geq 0$

و هذا يعني أن الدالة g تزايدية على $]-\infty;0]$.

و لدينا : $g(0) = (1-0)e^0 - 1 = 0$

I 2

ليكن x عنصرا من $\mathbb{R}$. نفصل بين حالتين :

الحالة الأولى : إذا كان : $x \geq 0$

فإن : $g(x) \leq g(0)$ لأن g تناقصية على $[0;+\infty[$.

و منه : $(\forall x \geq 0)\ ;\ g(x) \leq 0$

الحالة الثانية : إذا كان : $x \leq 0$

فإن : $g(x) \leq g(0)$ لأن g تزايدية على $]-\infty;0]$.

و منه : $(\forall x \leq 0)\ ;\ g(x) \leq 0$

نلاحظ في كلتا الحالتين أن : $g(x) \leq 0$

إذن : $(\forall x \epsilon \mathbb{R})\ ;\ g(x) \leq 0$

II 1 أ

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} (2-x)e^x - x = (2-\infty)e^{+\infty} - \infty$$
$$= (-\infty)(+\infty) - \infty = -\infty - \infty = -\infty$$

إذن : (1) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

II 1 ب

لدينا : $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{2}{x}-1\right)e^x - 1$

$= \left(\frac{2}{x}-1\right)e^{+\infty} - 1 = (0-1)(+\infty) - 1$

$= (-1)(+\infty) - 1 = -\infty - 1 = -\infty$

إذن : (2) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$

نستنتج إذن من النتيجتين (1) و (2) أن المنحنى $(\mathscr{C})$ يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار $+\infty$.

II 2 أ

لدينا : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} (2-x)e^x - x$

$= \lim\limits_{x\to-\infty} \left(2e^x - xe^x - x\right)$

($2e^x \to 0^+$ ، $-xe^x \to 0^-$ ، $-x \to -\infty$)

$= 2\times 0 - 0 - (-\infty) = 0 + \infty = +\infty$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع

إذن : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ (3)

و لدينا : $\lim\limits_{x\to-\infty} (f(x)+x) = \lim\limits_{x\to-\infty} (2-x)e^x = \lim\limits_{x\to-\infty} 2e^x - xe^x = 0-0=0$

إذن : $\lim\limits_{x\to-\infty} (f(x)+x) = 0$ (4)

II 2 ب

لدينا : $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty} \left(\frac{2}{x}-1\right)e^x - 1 = \left(\frac{2}{-\infty}-1\right)e^{-\infty} - 1 = (0-1)(0)-1 = -1$

إذن : $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = -1$ (5)

من النهايات (3) و (4) و (5) نستنتج أن المستقيم (D) الذي معادلته $(D) : y = -1x + 0$ مقارب مائل للمنحنى $(\mathscr{C})$ بجوار $-\infty$.

II 3 أ

ليكن x عنصرا من $\mathbb{R}$. لدينا : $f(x) = (2-x)e^x - x$

إذن : $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x - 1 = (-1+2-x)e^x - 1 = (1-x)e^x - 1 = g(x)$

إذن : $(\forall x\in\mathbb{R})\ ;\ f'(x) = g(x)$

II 3 ب

النتيجة $f'(0) = 0$ تعني هندسيا أن المنحنى $(\mathscr{C})$ يقبل مماسا أفقيا (موازي لمحور الأفاصيل) بجوار النقطة ذات الأفصول 0 .

II 3 ج

لدينا : $(\forall x\in\mathbb{R})\ ;\ f'(x) = g(x)$

و نعلم حسب نتيجة السؤال I 2) أن : $(\forall x\in\mathbb{R})\ ;\ g(x) \le 0$

إذن : $(\forall x\in\mathbb{R})\ ;\ f'(x) \le 0$

و هذا يعني أن الدالة f تناقصية على $\mathbb{R}$.

و نضع جدول تغيرات f كما يلي :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$-$	
f	$+\infty$	↘	2	↘	$-\infty$

II 4

لدينا f دالة متصلة و تناقصية قطعا على $\mathbb{R}$.

إذن f تقابل من $\mathbb{R}$ نحو $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$

و منه كل عنصر من $\mathbb{R}$ يمتلك سابقا واحدا من $\mathbb{R}$ بالدالة f .

لدينا : $0 \in \mathbb{R}$ إذن : $(\exists!\ \alpha\in\mathbb{R})\ ;\ f(\alpha) = 0$

يعني أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في $\mathbb{R}$ و هو العدد α .

و لدينا : f دالة متصلة على المجال $\left[2;\frac{3}{2}\right]$. (2)

و لدينا كذلك : $f(2) = (2-2)e^2 - 2 = -2 < 0$

إذن : $f(2) < 0$ (2)

و لدينا كذلك : $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}$

بما أن : $e^{\frac{3}{2}} > 3$ فإن : $\frac{1}{2}e^{\frac{3}{2}} > \frac{3}{2}$

و منه : $\frac{1}{2}e^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} > 0$ أي : $f\left(\frac{3}{2}\right) > 0$ (3)

من النتيجتين (2) و (3) نستنتج أن : $f(2)\cdot f\left(\frac{3}{2}\right) < 0$ (4)

إذن من النتيجتين (1) و (4) نستنتج حسب مبرهنة القيم الوسيطية (TVI) أن : $\exists!\ \alpha\in\left]2;\frac{3}{2}\right[\ ;\ f(\alpha) = 0$

و بالتالي : المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α محصور بين 2 و $\frac{3}{2}$

النقطة ذات الأفصول α هي نقطة تقاطع $(\mathscr{C})$ و محور الأفاصيل .

II 5 أ

المعادلة $f(x) + x = 0$ تصبح : $(2-x)e^x - x + x = 0$

يعني : $(2-x)e^x = 0$

نعلم أن : $(\forall x\in\mathbb{R})\ ;\ e^x \neq 0$

إذن : $2 - x = 0$ و منه : $x = 2$

إذن أفصول نقطة تقاطع $(\mathscr{C})$ و المستقيم (D) ذو المعادلة $y = -x$

هو 2 و أرتوبها هو : $f(2) = -2$

و بالتالي : $(\mathscr{C})$ و (D) يتقاطعان في النقطة $A(2;-2)$.

II 5 ب

لدينا : $(\forall x\in\mathbb{R})\ ;\ f(x) + x = (2-x)e^x$

إذن : إشارة $f(x)+x$ تتعلق فقط بإشارة $(2-x)$

و ذلك لأن : $(\forall x\in\mathbb{R})\ ;\ e^x > 0$

إذا كان : $x = 2$ فإن : $f(x) + x = 0$.

إذا كان : $x > 2$ فإن : $f(x) + x < 0$.

إذا كان : $x < 2$ فإن : $f(x) + x > 0$.

II 5 ج

نستنتج من السؤال ب) أنه :

- إذا كان : $x > 2$ فإن : $f(x) <$
- إذا كان : $x < 2$ فإن : $f(x) >$

إذن : $(\mathscr{C})$ يوجد فوق المستقيم (D) على المجال $]-\infty;2[$.

و $(\mathscr{C})$ يوجد أسفل (D) على المجال $]2;+\infty[$.

II 6 أ

لدراسة نقط الإنعطاف ندرس النقط التي تنعدم فيها المشتقة الثانية f'' .

ليكن x عنصرا من $\mathbb{R}$. و نريد أن نحل المعادلة : $f''(x) = 0$

لدينا : $f''(x) = g'(x) = -xe^x$

إذن المعادلة تصبح : $-xe^x = 0$

نعلم أن : $(\forall x\in\mathbb{R})\ ;\ e^0 \neq 0$

إذن المعادلة تصبح : $x = 0$

و منه : فالمعادلة تقبل حلا وحيدا و هو الصفر .

يعني أن $(\mathscr{C})$ يقبل نقطة انعطاف واحدة أفصولها 0 .

و أرتوبها هو $f(0) = 2$

أي : $B(0;2)$ نقطة انعطاف للمنحنى $(\mathscr{C})$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

Talamid.ma : هذا الملف تم تحميله من موقع

II 6 ب



أضفت الصورة الأولى لنرى بوضوح ما يقع بجوار $-\infty$.



II 7 أ

لدينا : $\int_{-1}^{0} \underbrace{(2-x)}_{u} \underbrace{e^x}_{v'}\, dx = [uv]_{-1}^{0} - \int_{-1}^{0} u'v\, dx$

$= [(2-x)e^x]_{-1}^{0} - \int_{-1}^{0} -e^x\, dx$

$= [(2-x)e^x]_{-1}^{0} + \int_{-1}^{0} e^x\, dx$

$= [(2-x)e^x]_{-1}^{0} + [e^x]_{-1}^{0}$

$= \left(2-\frac{3}{2}\right) + \left(1-\frac{1}{e}\right) = \boxed{3-\frac{4}{e}}$

إذن : $\int_{-1}^{0} (2-x)\ e^x\, dx = 3-\frac{4}{e}$

II 7 ب

لتكن $\mathcal{A}$ مساحة الحيز من المستوى المحصور بين المنحنى $(\mathscr{C})$ و المستقيم (D) و المستقيمين اللذين معادلتاهما $x=-1$ و $x=0$.

نعلم أن التكامل يقيس هندسيا طول أو مساحة أو حجم .

إذن : $\mathcal{A} = \int_{-1}^{0} |f(x)-(-x)|\, dx = \int_{-1}^{0} |f(x)+x|\ dx$

من خلال دراسة إشارة $(f(x)+x)$ حسب (II) 5) ب)

نكتب : $(\forall x < 2)\ ;\ f(x)+x > 0$

إذن : $(\forall x < 2)\ ;\ |f(x)+x| = f(x)+x$

و منه : $\mathcal{A} = \int_{-1}^{0} |f(x)+x|\ dx = \int_{-1}^{0} (f(x)+x)\, dx$

$= \left(3-\frac{4}{e}\right)\ unité^2$

إذن : $\mathcal{A} = \left(3-\frac{4}{e}\right)\ unité^2$

بما أن : $\|\vec{\imath}\| = \|\vec{\jmath}\| = 2\ cm$ فإن : $l'unité = 2cm$

إذن : $(l'unité)^2 = 4\ cm^2$

و بالتالي : $\mathcal{A} = 4\left(3-\frac{4}{e}\right)\ cm^2 = \left(12-\frac{16}{e}\right) cm^2$



للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma