



التمرين الأول: (3 ن)

0,25 + 0,25 : لنبين أن مركز الفلكة (S) هي النقطة $(1,0,1)$ و أن شعاعها $r = \sqrt{3}$

$$\text{لدينا } x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 1 = 0 \text{ معادلة ديكارتية للفلكة (S)}$$

$$(S): (x-1)^2 - 1 + (y-0)^2 + (z-1)^2 - 1 - 1 = 0 \text{ إذن } (S): x^2 - 2x + y^2 + z^2 - 2z - 1 = 0 \text{ ومنه}$$

$$(S): (x-1)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2 = (\sqrt{3})^2 \text{ إذن } (S): (x-1)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2 = 3 \text{ أي}$$

المعادلة المختصرة للفلكة (S) و بالتالي مركز الفلكة (S) هي النقطة $(1,0,1)$ و شعاعها يساوي $\sqrt{3}$

$$(2) \leftarrow \text{لنبين أن } 0,5 \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{k}$$

لدينا: $C(3,2,1)$; $B(0,1,-2)$; $A(1,1,-1)$

$$\overrightarrow{AB}(-1,0,-1) \text{ ومنه: } \overrightarrow{AB}(0-1,1-1,-2+1) \text{ إذن: } \overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$$

$$\overrightarrow{AC}(2,1,2) \text{ ومنه: } \overrightarrow{AC}(3-1,2-1,1+1) \text{ إذن: } \overrightarrow{AC}(x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A) \text{ و}$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \text{ إذن: }$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = (0+1)\vec{i} - (-2+2)\vec{j} + (-1-0)\vec{k} \text{ أي:}$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{i} - \vec{k} \text{ وبالتالي:}$$

0,25 : $x - z - 2 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (ABC)

طريقة 1: لدينا $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(1,0,-1)$ متجهة منظمية على المستوى (ABC)

إذن: $0x + 0y - 1z + d = 0$ معادلة ديكارتية للمستوى (ABC)

و بما أن $A \in (ABC)$ فإن مثُول إحداثياتها يحقق المعادلة الديكارتية للمستوى (ABC).

$$d = -2 \text{ إذن } A(1,1,-1) \in (ABC) \Leftrightarrow 1 - (-1) + d = 0 \text{ أي } 2 + d = 0$$

وبالتالي $x - z - 2 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (ABC).

طريقة 2: لدينا $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}(1,0,-1)$ متجهة منظمية على المستوى (ABC)

$$M(x,y,z) \in (ABC) : \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \\ z+1 \end{pmatrix} = 0 \text{ إذن: }$$

$$M(x,y,z) \in (ABC) \Leftrightarrow 1(x-1) + 0(y-1) - 1(z+1) = 0 \Leftrightarrow x - 1 - z - 1 = 0$$

وبالتالي: $x - z - 2 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (ABC).

ب- لنتحقق من أن $d(\Omega, (ABC)) = \sqrt{2}$ ثم لنبين أن المستوى (ABC) يقطع الفلكة (S) وفق دائرة (Γ) شعاعها $r=1$:

$$d(\Omega, (ABC)) = \frac{|1 \times 1 + 0 - 1 \times 1 - 2|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}} = \frac{|1 + 0 - 1 - 2|}{\sqrt{1+1}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \quad \text{إذن}$$

لدينا $x - z - 2 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (ABC) و $\Omega(1,0,1)$

إذن $d(\Omega, (ABC)) = \frac{|ax_\Omega + by_\Omega + cz_\Omega + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ وبما أن $r = \sqrt{3}$ فإن المستوى (ABC) يقطع الفلكة (S) وفق

$$0,25 + 0,25 + 0,5 \quad . \quad R = \sqrt{d^2 - r^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = 1 \quad \text{شعاعها 1 دائرة } (\Gamma)$$

أ- لنبين أن $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 0 \\ z = 1-t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$ تمثيل بارامטרי للمستقيم (Δ) المار من Ω والعمودي على المستوى (ABC) :

بما أن المستقيم (Δ) عمودي على المستوى (ABC) فإن $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{i} - \vec{k}$ المتجهة المنظمية على (ABC) هي متجهة موجهة للمستقيم (Δ) و $\Omega \in (\Delta)$ و

$$\begin{cases} x - 1 = t \\ y - 0 = 0 \\ z - 1 = -t \end{cases} \quad M \in (\Delta) \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} / \overrightarrow{\Omega M} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y - 0 \\ z - 1 \end{pmatrix} = t \vec{AB} \wedge \vec{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{إذن} (M(x,y,z) \in (\Delta))$$

$$0,25 \quad . \quad \text{تمثيل بارامטרי للمستقيم } (\Delta) \quad \begin{cases} x = 1+t \\ y = 0 \\ z = 1-t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{إذن}$$

ب- لنبين أن مثلث إحداثيات H نقطة تقاطع المستقيم (Δ) و المستوى (ABC) هو $(2;0;0)$

$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = 0 \\ z = 1-t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} x = 1+t \\ y = 0 \\ z = 1-t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{انحل تحليليا النقطة:}$$

$$1 + t - 1 + t - 2 = 0 \quad x - z - 2 = 0$$

$$\begin{cases} x = 1+1 = 2 \\ y = 0 \\ z = 1-1 = 0 \end{cases} \quad \text{إذن} \quad \begin{cases} x = 1+t \\ y = 0 \\ z = 1-t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{يعني} \quad \begin{cases} x = 1+t \\ y = 0 \\ z = 1-t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{يعني} \quad \begin{cases} x = 1+t \\ y = 0 \\ z = 1-t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$t = 1 \quad t = 1 \quad 2t = 2 \quad 2t - 2 = 0$$

و بالتالي مثلث إحداثيات H نقطة تقاطع المستقيم (Δ) و المستوى (ABC) هو $(2;0;0)$.

ج- لنسنن مركز الدائرة (Γ) :

$\star H(2;0;0)$ نقطة تقاطع المستقيم (Δ) و المستوى (ABC) هي المسقط العمودي للنقطة Ω مركز الفلكة (S) و بما أن الفلكة (S) تقطع المستوى (ABC) وفق دائرة فإن $H(2;0;0)$ هي مركز الدائرة (Γ) .



التمرين الثاني: (3 ن)

(1) لنحل في \mathbb{C} مجموعه الأعداد العقدية المعادلة: $z^2 - 12z + 61 = 0$

$$0,25 \quad \Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4 \times 1 \times 61 = 144 - 244 = -100 \quad \text{لدينا: } a = 1; b = -12; c = 61$$

بما أن $\Delta \neq 0$ فإن المعادلة تقبل حلين مترافقين

$$z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{12 - 10i}{2 \times 1} = \frac{2(6 - 5i)}{2} \quad \text{و} \quad z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{12 + 10i}{2 \times 1} = \frac{2(6 + 5i)}{2}$$

0,25 + 0,25 $S = \{6 + 5i, 6 - 5i\}$ إذن: $z_2 = 6 - 5i$ و $z_1 = 6 + 5i$ و بالتالي:

(2) أ- لنحسب $\frac{a-c}{b-c}$ و لنستنتج أن النقط A و B و C مستقيمية:

$$\frac{a-c}{b-c} \in \mathbb{R} \quad \text{فإن النقط A و B و C مستقيمية.} \quad \text{لدينا: } \frac{a-c}{b-c} = \frac{6-5i-2-i}{4-2i-2-i} = \frac{4-6i}{2-3i} = \frac{2(2-3i)}{2-3i} = 2$$

ب- لنتتحقق من أن لحق النقطة D صورة النقطة C بالإزاحة T ذات المتجهة $\vec{u}(1+5i)$ هو

$$\text{لدينا } T(C) = D \Leftrightarrow \overrightarrow{CD} = \vec{u} \Leftrightarrow d - c = 1 + 5i \Leftrightarrow d = 1 + 5i + c = 1 + 5i + 2 + i = 3 + 6i$$

0,25 + 0,25 . $d = 3 + 6i$ هو صورة النقطة C بالإزاحة T ذات المتجهة $\vec{u}(1+5i)$ و بالتالي لحق النقطة D

ج- **0,5** لنبين أن: $\frac{d-c}{b-c} = -1+i$

$$\frac{d-c}{b-c} = \frac{3+6i-2-i}{4-2i-2-i} = \frac{1+5i}{2-3i} = \frac{(1+5i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)} = \frac{2+3i+10i-15}{2^2+3^2} = \frac{-13+13i}{13} = \frac{13(-1+i)}{13} \quad \text{طريقة 1:}$$

و منه $\frac{d-c}{b-c} = -1+i$

$$\frac{d-c}{b-c} = \frac{3+6i-2-i}{4-2i-2-i} = \frac{1+5i}{2-3i} = \frac{(1+5i)(-1+i)}{(2-3i)(-1+i)} = \frac{(1+5i)(-1+i)}{-2+2i+3i+3} = \frac{(1+5i)(-1+i)}{1+5i} = -1+i \quad \text{طريقة 2:}$$

0,25 : لنبين أن $\frac{3\pi}{4}$ عمدة للعدد العقدي i

$$\left| \frac{d-c}{b-c} \right| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad \text{و منه} \quad \frac{d-c}{b-c} = -1+i \quad \star \quad \text{لدينا}$$

$$\sin(\arg(-1+i)) = \frac{\operatorname{Im}(-1+i)}{|-1+i|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{و} \quad \cos(\arg(-1+i)) = \frac{\operatorname{Re}(-1+i)}{|-1+i|} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

إذن $\arg(-1+i) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ عمدة للعدد العقدي i

د- لنستنتاج قياساً للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CD})$

$$(\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CD}) = \frac{3\pi}{4}[2\pi] \quad \text{و بالتالي} \quad (\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\frac{d-c}{b-c}\right) = \arg(-1+i)$$



التمرين الثالث: (3 ن)

2 2 1 1 1 1 1 0

نسحب عشوائياً تانياً ثلاثة بيدقات من كيس يضم ثمان بيدقات

$$: p(A) = \frac{5}{28} \text{ لأننيين } (1)$$

A : "نحصل على ثلاثة بيدقاط تحمل أرقاما مختلفة مثى مثى" : $\{0;1;2\}$

$$0,5 + 0,5 \quad p(A) = \frac{5}{28} \quad \text{و بالتالي} \quad p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_1^1 \times C_5^1 \times C_2^1}{C_8^3} = \frac{1 \times 5 \times 2}{56} = \frac{10}{56}$$

$$: p(B) = \frac{5}{56} \text{ لأن نبین}(2)$$

B: "نحصل على ثلاثة بيدقات تحمل أرقاما مجموعها يساوي 5 " : $\{1;2;2\}$

$$0,5 + 0,5 \quad p(B) = \frac{5}{56} \quad \text{و بالتالي} \quad p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_5^1 \times C_2^2}{C_8^3} = \frac{5 \times 1}{56}$$

$$: p(C) = \frac{3}{8} \text{ لنبين أن } (3)$$

C: نحصل على ثلاثة بيدقات تحمل أرقاما مجموعها يساوي 4 " $\{0;2;2\}$ أو $\{1;1;2\}$ " :

$$0,5 + 0,5 \quad p(C) = \frac{3}{8} \quad \text{و بالتالي} \quad p(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_1^1 \times C_2^2 + C_5^2 \times C_2^1}{C_8^3} = \frac{1+10 \times 2}{56} = \frac{21}{56}$$

التمرين الرابع: (3 ن)

(1) لنتتحقق من أن: $u_{n+1} - 12 = \frac{10}{11}(u_n - 12)$ لكل n من \mathbb{N}

$$\forall n \in \mathbb{N}; u_{n+1} - 12 = \frac{10}{11}(u_n - 12) \quad \text{و بالتالي } u_{n+1} - 12 = \frac{10}{11}u_n + \frac{12}{11} - 12 = \frac{10u_n + 12 - 132}{11} = \frac{10u_n - 120}{11} \quad \text{لدينا}$$

(2) أ- لنبين بالترجع أن: $u_n < 12$ لكل n من \mathbb{N}

❶ لنتتحقق من أن $u_0 < 12$: لدينا $u_0 = 11$ و $11 < 12$ إذن $u_0 < 12$

❷ نفترض أن $u_n < 12$ و نبين أن $u_{n+1} < 12$:

$$\frac{10}{11}(u_n - 12) < 12 \quad \text{إذن } 0 < u_n - 12 - 0 \quad \text{و منه } 0 < u_n - 12 \quad \text{لدينا حسب فرضية الترجع}$$

أي $u_{n+1} < 12$ لكل n من \mathbb{N} من ❶ و ❷ نستنتج أن $u_n < 12$ لكل n من \mathbb{N} .

ب- لنبين أن المتالية (u_n) تزايدية قطعاً:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{10}{11}u_n + \frac{12}{11} - u_n = \frac{10u_n + 12 - 11u_n}{11} = \frac{1}{11}(12 - u_n) \quad \text{لدينا}$$

$\frac{1}{11}(12 - u_n) > 0$ إذن $12 - u_n > 0$ و منه $0 < 12 - u_n < 11$ إذن لكل n من \mathbb{N} :

أي $u_{n+1} - u_n > 0$ لكل n من \mathbb{N} و بالتالي (u_n) تزايدية قطعاً.

ج- لنتستخرج أن المتالية (u_n) متقاربة :

لدينا مما سبق أن المتالية (u_n) تزايدية قطعاً n ومكبورة بالعدد 12 إذن المتالية (u_n) متقاربة.

(3) أ- كـ لنبين أن المتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{10}{11}$:

$$\frac{10}{11}(u_n - 12) = v_{n+1} = \frac{10}{11}v_n \quad \text{و } v_n = u_n - 12 \quad \text{لدينا} \quad \text{لدينا}$$

كـ لنكتب v_n بدلالة n :

$$v_n = v_0 \times q^n = -1 \times \left(\frac{10}{11}\right)^n \quad \text{و } v_0 = u_0 - 12 = 11 - 12 = -1 \quad \text{لدينا}$$

ب- ☆ لنبين أن $u_n = 12 - \left(\frac{10}{11}\right)^n$ لكل n من \mathbb{N} :

$$v_n = -\left(\frac{10}{11}\right)^n \quad \text{و } u_n = v_n + 12 \quad \text{لدينا} \quad \text{لدينا}$$

$$u_n = 12 - \left(\frac{10}{11}\right)^n \quad \text{إذن} \quad . \quad \text{لدينا}$$

☆ لنحسب نهاية المتالية (u_n) :

$$u_n = 12 - \left(\frac{10}{11}\right)^n \quad \text{لدينا} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 12 \quad \text{إذن} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{10}{11}\right)^n = 0 \quad \text{و } \frac{10}{11} < 1 \quad \text{لدينا}$$

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

المملكة المغربية



شعبة العلوم التجريبية بمسالكها و شعبة العلوم والتكنولوجيا بمسلكيها

المعامل: 7

مادة الرياضيات مدة الانجاز: 3 ساعات

المركز الوطني للتقدير والامتحانات

التمرين الخامس: (8 ن)

1-I كـ لنبين أن: $1 - x^2$ و $2x^2 \ln(x)$ لهما نفس الإشارة على المجال $[0;1]$:
 لدينا $x > 0$ و منه $0 < x^2 < 1$ إذن $-x^2 < -1 < 0$ و وبالتالي إشارة $1 - x^2$ سالبة على المجال $[0;1]$.
 وإشارة $2x^2 \ln(x)$ هي إشارة $\ln(x)$ لأن لكل x من $[0;1] : 0 < 2x^2 < 1$ و $\ln(x)$ على المجال $[0;1]$
 وبالتالي إشارة $2x^2 \ln(x)$ سالبة على المجال $[0;1]$.
 إذن $1 - x^2$ و $2x^2 \ln(x)$ لهما نفس الإشارة على المجال $[0;1]$.

كـ نستنتج أن $0 \leq g(x)$ و لكل x من $[0;1]$:
 من ① و ② نستنتج أن إشارة $1 + 2x^2 \ln(x)$ سالبة على المجال $[0;1]$ أي g سالبة على المجال $[0;1]$
 (لأن مجموع دالتين سالبيتين $1 - x^2$ و $x \mapsto 2x^2 \ln(x)$ هي دالة سالبة) و $g(1) = 0$
 إذن نستنتج أن $0 \leq g(x)$ و لكل x من $[0;1]$.

2 كـ لنبين أن: $1 - x^2$ و $2x^2 \ln(x)$ لهما نفس الإشارة على المجال $[\infty; +\infty]$:
 لدينا $x > 1$ و منه $1 < x < +\infty$ إذن $-1 < -x^2 < 0$ و وبالتالي إشارة $1 - x^2$ موجبة على المجال $[\infty; +\infty]$.
 وإشارة $2x^2 \ln(x)$ هي إشارة $\ln(x)$ لأن لكل x من $[\infty; +\infty] : 0 < 2x^2 < +\infty$ و $\ln(x)$ على المجال $[\infty; +\infty]$
 وبالتالي إشارة $2x^2 \ln(x)$ موجبة على المجال $[\infty; +\infty]$.
 إذن $1 - x^2$ و $2x^2 \ln(x)$ لهما نفس الإشارة على المجال $[\infty; +\infty]$.

كـ نستنتج أن $0 \geq g(x)$ و لكل x من $[\infty; +\infty]$:
 من ③ و ④ نستنتج أن إشارة $1 + 2x^2 \ln(x)$ موجبة على المجال $[\infty; +\infty]$ أي g موجبة على المجال $[\infty; +\infty]$
 (لأن مجموع دالتين موجبتيين $1 - x^2$ و $x \mapsto 2x^2 \ln(x)$ هي دالة موجبة) و $g(1) = 0$
 إذن نستنتج أن $0 \geq g(x)$ و لكل x من $[\infty; +\infty]$.

0,25 + 0,25 : لنبين أن: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ ولنؤول النتيجة مبيانيا:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty \quad \text{وبالتالي} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x^2 - 1) \ln(x) = (-1) \times (-\infty) \quad \text{إذن} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x^2 - 1) = -1 \quad \text{لدينا}$$

و منه نستنتج أن (C) منحنى الدالة f يقبل مقاريا عموديا معادلة $x = 0$.

ب - ك لحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 1) \ln(x) = (+\infty) \times (+\infty) = +\infty \quad \text{إذن} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{وبالتالي}$$

ب - ك لنبين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ و لنسننج أن المنحنى (C) يقبل فرعا شلجميا بجوار ∞ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x} \right) \ln(x) = +\infty \quad \text{إذن} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \quad \text{لدينا}$$

وبالتالي ∞ ومنه نسننج أن المنحنى (C) يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأراتيب بجوار ∞ (أ).

ك لنبين أن $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ لكل x من $]0; +\infty[$

$$f(x) = (x^2 - 1) \ln(x) :]0; +\infty[\quad \text{لدينا لكل } x \text{ من}$$

$$f'(x) = (x^2 - 1)' \ln(x) + (x^2 - 1)(\ln(x))' = 2x \ln(x) + (x^2 - 1) \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{x^2 - 1 + 2x^2 \ln(x)}{x} \quad \text{ومنه}$$

$$\cdot]0; +\infty[\quad f'(x) = \frac{g(x)}{x} \quad \text{وبالتالي} \quad g(x) = x^2 - 1 + 2x^2 \ln(x)$$

ك لنوؤول هندسيا النتيجة $0,25 : f'(1) = 0$

لدينا $f'(1) = 0$ و منه يقبل المنحنى (C) مماساً أفقيا في النقطة $A(1, 0)$

ب - ل نسننج أن الدالة f تناقصية على المجال $[0, 1]$ و تزايدية على المجال $[1, +\infty[$:

لدينا $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ لكل x من $]0; +\infty[$ إذن إشارة $(x)f'$ هي نفس إشارة $(x)g$ وكل x من $]0; +\infty[$

☆ إذا كان $x \in [0, 1]$ فإن $0 \leq (x)g \leq (x)f'$ و بالتالي f تناقصية على المجال $[0, 1]$.

☆ إذا كان $x \in [1, +\infty[$ فإن $0 \geq (x)g \geq (x)f'$ و بالتالي f تزايدية على المجال $[1, +\infty[$.


ج - ك لنجز جدول تغيرات الدالة f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

ك لنبين أن $0 \leq f(x) \leq 0$ لكل x من $]0; +\infty[$

لدينا 0 قيمة دنيا مطلقة للدالة f عند $x = 1$ إذن $0 \leq f(x) \leq 0$ لكل x من $[0; +\infty[$.

(3) لنشئ (C) منحنى الدالة f : 1



أ- لنبين أن $x \mapsto \frac{x^3}{3} - x$ دالة أصلية للدالة $x \mapsto x^2 - 1$ على \mathbb{R} (4)

لدينا $x \mapsto x^3 - 1$ دالة متصلة على \mathbb{R} لأنها دالة حدودية و

إذن $x \mapsto \frac{x^3}{3} - x$ دالة أصلية للدالة $x \mapsto x^2 - 1$ على \mathbb{R} .

ب- لنبين باستعمال المتكاملة بالأجزاء أن: (1) $\int_1^2 (x^2 - 1) \ln(x) dx = \frac{2}{9}(1 + 3\ln(2))$

$$\begin{cases} u(x) = \frac{x^3}{3} - x \\ v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases} \quad \text{و منه} \quad \begin{cases} u'(x) = x^2 - 1 \\ v(x) = \ln(x) \end{cases}$$

إذن $\int_1^2 (x^2 - 1) \ln(x) dx = \left[\left(\frac{x^3}{3} - x \right) \ln(x) \right]_1^2 - \int_1^2 \left(\frac{x^3}{3} - x \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx = \left[\left(\frac{x^3}{3} - x \right) \ln(x) \right]_1^2 - \int_1^2 \left(\frac{1}{3}x^2 - 1 \right) dx$

إذن $\int_1^2 (x^2 - 1) \ln(x) dx = \left[\left(\frac{x^3}{3} - x \right) \ln(x) \right]_1^2 - \left[\frac{x^3}{9} - x \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) \ln(2) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \ln(1) - \left(\frac{8}{9} - 2 - \frac{1}{9} + 1 \right)$

إذن $\int_1^2 (x^2 - 1) \ln(x) dx = \frac{2}{9}(1 + 3\ln(2))$ و وبالتالي $\int_1^2 (x^2 - 1) \ln(x) dx = \frac{2\ln(2)}{3} - 0 + \frac{2}{9}$

ج- لنحسب ب cm^2 مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى (C) و محور الأفاسيل و المستقيمين اللذين

0,25 معادلاتها $x=1$ و $x=2$ و $y=0$:

لدينا $S = 2(1 + 3\ln(2)) cm^2$ و وبالتالي $S = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 (x^2 - 1) \ln(x) dx = \frac{2}{9}(1 + 3\ln(2)) \times 9$