


### نبذة عن عالم

عرف القرن التاسع عشر اهتماما واسعا بالدقة الرياضية المؤدية إلى تحديد المفاهيم الأساسية للتحليل . و كان عالم الرياضيات والفيزياء الفرنسي أوغستان لوイ كوشي ( 1789 – 1857 ) من بين رموز هذا التوجه .


دخل كوشي مدرسة الهندسة ( مدرسة الجسور و الطرق ) وأشرف عليه بيير جيرارد Pierre Girard في مشروع قناة Ourcq ، وأسهم في إنشاء ميناء بحري في شيربورغ عام 1810 . تميز كوشي بأعماله في الرياضيات ، و حل مجموعة مسائل تحد طرح عليه لاغرانج Lagrange ، وفي عام 1814 نشر بحثا عن التكاملات المحدودة ، وعيّن كوشي في هذا العام أستاذا مساعدا في التحليل في مدرسة البوليتكنيك . درس طرق التكامل في كلية العلوم ، ووضع تعريف دقيقة للنهايات والاتصال والتكميل والتقارب المتتاليات والمتسلسلات . و ساهم في تعريف الاتصال على مجال  $[a, b]$  .




جوزيف لويس لاغرانج



أوغستان لويس كوشي



$a$  في متصلة  $f$



$a$  في متصلة غير  $f$

La notion de continuité nous est familière : le temps s'écoule d'une manière continue , on ne passe pas brutalement de 12h à 12h01s , il n'y pas de saut . C'est en ce sens que l'expression fonction continue est employée en mathématiques .

## بطاقة تقنية رقم : 02

المستوى : الثانية باكالوريا علوم تجريبية  
 درس : النهايات والاتصال  
 التذير الرمزي : 15 ساعة

ثانوية : الفتح التأهيلية  
 السنة الدراسية : 2015 - 2016  
 الأستاذ : عادل بناجي

<p><b>فقرات الدرس</b></p> <p>1 مبرهنة القيم الوسطية          2 الدالة العكسية لدالة متصلة          3 دالة الجذر من الرتبة <math>n</math>          4 الاتصال في نقطة - الاتصال على مجال          5 العمليات على الدوال المتصلة          6 صورة مجال بدالة متصلة</p>	<p>• عموميات حول الدوال العددية          • مفاهيم أساسية في درس النهايات والاشتقاق          • دراسة الدوال العددية</p>	<p>• تحديد صورة قطعة أو مجال بدالة متصلة و بدالة متصلة و رتبية قطعا ؛          • تطبيق مبرهنة القيم الوسطية في دراسة بعض المعادلات و المترابحات أو دراسة إشارة بعض التعابير ...؛          • استعمال طريقة التفرع الثنائي (<i>ladi-chotomie</i>) في تحديد قيم مقربة لحلول المعادلة أو لتأطير هذه الحلول ؛          • تطبيق مبرهنة القيم الوسطية و مبرهنة الدالة التقابلية في حالة دالة متصلة و رتبية قطعا على مجال ؛</p>	<p>• تحديد صورة قطعة أو مجال بدالة متصلة و بدالة متصلة و رتبية قطعا ؛          • تطبيق مبرهنة القيم الوسطية في دراسة بعض المعادلات و المترابحات أو دراسة إشارة بعض التعابير ...؛          • استعمال طريقة التفرع الثنائي (<i>ladi-chotomie</i>) في تحديد قيم مقربة لحلول المعادلة أو لتأطير هذه الحلول ؛          • تطبيق مبرهنة القيم الوسطية و مبرهنة الدالة التقابلية في حالة دالة متصلة و رتبية قطعا على مجال ؛</p>	<p>• يتم اعتماد التعريف التالي : نقول إن دالة <math>f</math> متصلة في النقطة <math>x_0</math> إذا كان <math>\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)</math>          • نقبل النتائج المتعلقة باتصال الدوال الحدودية والجذرية و الدوال المثلثية والدالة جذر مربع و يتم التركيز على تطبيقها ؛          • نقبل أن صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة وأن صورة مجال بدالة متصلة هي مجال ثم نستنتج مبرهنة القيم الوسطية ؛          • نقبل خصصيات العمليات على الدوال المتصلة و اتصال مركب دالتين .</p>	<p>سلسلة أنشطة - سلسلة تمارين - الكتاب المدرسي - ملخص المكتسبات السابقة ؛</p> <p><b>الوسائل الديداكتيكية</b></p>
<p><b>المكتسبات القبلية</b></p>					
<p><b>الكافئات المستهدفة</b></p>					
<p><b>التوجيهات التربوية</b></p>					

## النهايات

نشاط

...

### أحسب النهايات التالية 1

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + 3x^5 - 4$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{27x^7 - x^3}{11x^5 - 2x^2 - 15}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 - 5x^3 - x^5 - 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^4 - 4x}{8x^4 + 2x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - 3x^3 + x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - 30}{x^3 - 7x^2 - 5x + 75}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 27x^7 - x^3 - 4x$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 6x + 4}{-x^3 + x^2 + 5x + 3}$$

### أحسب النهايات التالية 2

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{20 - x^3}{11x - 2x^2 - 15}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{20 - x^3}{11x - 2x^2 - 15}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2 + 4}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2 + 4}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{x^2 + x - 4}{x^2 + 6x + 8}$$

$$\lim_{x \rightarrow -4^-} \frac{x^2 + x - 4}{x^2 + 6x + 8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{-5x - 3}{-3x^2 + 11x - 6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-5x - 3}{-3x^2 + 11x - 6}$$

### أحسب النهايات التالية 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x^3 + x}{2x - x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 + x - 30}{x^3 - 7x^2 - 5x + 75}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{27 - x^3}{11x - 2x^2 - 15}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 6x + 4}{-x^3 + x^2 + 5x + 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\sqrt{5}} \frac{x + \sqrt{5}}{5 - x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$$

### أحسب النهايات التالية 4

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 25} \frac{x - 25}{\sqrt{x} - 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4-x} - \sqrt{4+x}}{x}$$

### أحسب النهايات التالية 5

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{3x^2 - 4x + 7} - 3x + 8$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{x^2 - 6x - 2} - x + 12$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^2 - 1 - 12x + \sqrt{4x+7}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - \sqrt{8x-3} + 2x^4 - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{7x-9} + 8x^5 - 4x^3 + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{-9x-4} - 8x^2 - 3x - 1$$

الأشكال غير محددة

الأشكال غير المحددة هي :

## خواصيات النهايات

نهايات دوال اعبارية في  $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{|x|} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

خاصية

الصفحة : 3

ذ. عادل بناجي

## خاصية

نهايات دوال اعتيادية في  $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{|x|}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 6\infty} \frac{1}{x^3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 6\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 6\infty} \frac{1}{x} = 0$$

## خاصية

نهايات دوال اعتيادية في 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt{|x|}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

## خاصية

نهايات الدوال الجذرية والحدودية

**2** نهاية دالة جذرية عند  $+\infty$  أو  $-\infty$  هي نهاية خارج حدتها الأكبر درجة

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

**1** نهاية دالة حدودية عند  $+\infty$  أو  $-\infty$  هي نهاية حدتها الأكبر درجة

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

## خاصية

نهايات الدوال المثلثية

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$$

$$(a \neq 0); \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

## خاصية

النهايات والتزبيب

$$\begin{cases} f(x) \leq g(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l' \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

$$\begin{cases} 0 < f(x) \leq u(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

$$\begin{cases} u(x) \leq f(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

$$\begin{cases} g(x) \leq f(x) \leq h(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

$$\begin{cases} |f(x) - l| \leq u(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = l \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

$$\begin{cases} f(x) \leq u(x) \\ \lim_{x \rightarrow a} u(x) = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

## الاتصال 

### 1 الاتصال في نقطة - الاتصال على مجال

#### 1.1 الاتصال في نقطة

##### نشاط

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بمباليي :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} & ; x \neq 2 \\ f(2) = 4 \end{cases}$$

1 حدد  $D_f$  مجموعة تعريف الدالة  $f$

2 أحسب  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

3 أنشئ التصيل المبيانى للدالة  $f$

﴿ نلاحظ أن  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$  نقول إن الدالة  $f$  متصلة في 2 ﴾


##### نشاط

لتكن  $f$  دالة عددية و  $C_f$  منحناها في معلم متعمد منظم  
( $O, \vec{i}, \vec{j}$ ) (أنظر الشكل جانبه ) .

1 من خلال الشكل كيف ترى المنحنى  $C_f$  عند النقطة ذات الأصول 1- ثم عند النقطة ذات الأصول 3



أ. أوجد مبيانا  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$  و  $f(3)$  . ماذا تستنتج ؟

ب. أوجد مبيانا  $f(-1)$  ونهاية  $f$  عند -1 . ماذا تستنتج ؟



## تعريف

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال مفتوح  $I$  و  $a$  عنصر من  $I$  ، تكون  $f$  متصلة في  $a$  إذا وفقط إذا كان :



## مثال

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بمايلي :  

$$\begin{cases} f(x) = \frac{2x^2 - 2}{x - 1} & ; x \neq 1 \\ f(2) = 4 \end{cases}$$
  
 لدينا :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x^2 - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} 2(x + 1) \\ &= 2(1 + 1) \\ &= 4 = f(2) \end{aligned}$$

﴿ بما أن  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$  فإن  $f$  متصلة في 1 .﴾

## ملاحظة

إذا كانت  $f$  غير متصلة في  $a$  فإننا نقول إن  $f$  غير متصلة (أو منفصلة) في  $a$  .

تطبيقي ترين

...

**1** نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بعاليٍ :  

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3} & ; x \neq 3 \\ f(3) = 6 \end{cases}$$

**2** نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بعاليٍ :  

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} & ; x \neq 1 \\ f(1) = 3 \end{cases}$$

تطبيقي ترين

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بعاليٍ :  

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2} & ; x \neq 2 \\ f(2) = a & ; a \in \mathbb{R} \end{cases}$$

## 2.1 الاتصال على اليمين - الاتصال على اليسار

تعريف

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال من نوع  $[a, a + \alpha]$  حيث  $(\alpha > 0)$  تكون  $f$  متصلة على اليمين في  $a$  إذا وفقط إذا كان :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال من نوع  $[a - \alpha, a]$  حيث  $(\alpha > 0)$  تكون  $f$  متصلة على اليسار في  $a$  إذا وفقط إذا كان :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

خاصية

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال مفتوح  $I$  و  $a$  عنصر من  $I$  ، تكون  $f$  متصلة في  $a$  إذا وفقط إذا كانت متصلة على اليمين

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

## تطبيقي ترين

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بعالي :  
$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x+3} & ; x > 1 \\ f(x) = x+1 & ; x \leq 1 \end{cases}$$

2 هل الدالة  $f$  متصلة في 1 ؟

1 أدرس اتصال  $f$  على اليمين وعلى اليسار في 1 ؟

## تطبيقي ترين

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة بعالي :  
$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} & ; x > 2 \\ f(x) = \frac{x^2-4x+3}{x-3} & ; x \leq 2 \end{cases}$$

2 أدرس اتصال  $f$  في 2

1 أحسب  $f(2)$

## 3.1 الاتصال على مجال

### تعريف

...

- ٠ تكون الدالة  $f$  متصلة على المجال المفتوح  $]a, b[$  إذا كانت متصلة في كل نقطة من المجال  $]a, b[$
- ٠ تكون الدالة  $f$  متصلة على المجال المغلق  $[a, b]$  إذا كانت متصلة على  $[a, b]$  ومتصلة في  $a^+$  و  $b^-$

### ملاحظات

...

- ٠ نعرف بالمثل الاتصال على المجالات  $[a, b]$  و  $[a, b[$  و  $]a, b]$  و  $]-\infty, b]$  و  $]-\infty, b[$  و  $]a, +\infty[$
- ٠ التمثيل المباني لدالة متصلة على  $[a, b]$  هو خط متصل طرفاه النقطتان  $(a, f(a))$  و  $(b, f(b))$

## مثال

دالة الجزء الصحيح

ـ دالة الجزء الصحيح هي الدالة التي نرمز لها ب  $E(x)$  إذا كان  $n \leq x < n+1$  (حيث  $n \in \mathbb{Z}$ )  
ـ مثلا :

$$3 \leq 3,5 < 3+1 \text{ لأن } E(3,5) = 3 \quad \bullet$$

$$5 \leq 5+1 \text{ لأن } E(5) = 5 \quad \bullet$$

$$-3 \leq -2,4 < -3+1 \text{ لأن } E(-2,4) = -3 \quad \bullet$$

$$4 \leq 5 < 9 \Rightarrow \sqrt{4} \leq \sqrt{5} < \sqrt{9} \Rightarrow 2 \leq \sqrt{5} < 3 \text{ لأن } E(\sqrt{5}) = 2 \quad \bullet$$

**1** مثل مبيانيا الدالة  $E$  على المجال  $[0,4]$

**2** أدرس اتصال الدالة  $E$  على المجالات  $[3,3.5]$  ،  $[1,2]$  ،  $[0,2]$  ،  $[1,3]$  و  $[0,1]$

## خاصة

...

- ـ كل دالة حدودية متصلة على  $\mathbb{R}$
- ـ كل دالة جذرية متصلة على مجموعة تعريفها
- ـ الدالتين  $x \mapsto \cos(x)$  و  $x \mapsto \sin(x)$  متصلتين على  $\mathbb{R}$
- ـ الدالة  $x \mapsto \tan(x)$  متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها
- ـ الدالة  $x \mapsto \sqrt{x}$  متصلة على  $\mathbb{R}^+$

## أمثلة

...

- ـ الدالة  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x + 7$  متصلة على  $\mathbb{R}$  (لأنها دالة حدودية)
- ـ الدالة  $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$  متصلة على  $\mathbb{R} - \{1\}$  (لأنها دالة جذرية)
- ـ الدالة  $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$  متصلة بالخصوص على المجالين  $(-\infty, 1]$  و  $[3, +\infty)$  (لأنها  $\mathbb{R} - \{1\}$ subset  $\mathbb{R}$ )

## 4.1 قصور دالة عدديّة

### تعريف

إذا كانت  $f$  دالة معرفة على مجال  $I$  و  $g$  دالة معرفة على مجال  $J$  ضمن  $I$  بحيث  $f(x) = g(x) \forall x \in I$  ، فإننا نقول إن الدالة  $g$  قصور الدالة  $f$  على المجال  $J$ .

نتيجة

إذا كانت الدالة  $f$  متصلة على  $I$  و  $g$  قصور الدالة  $f$  على المجال  $J$  فإن  $g$  متصلة على  $I$

## 2 العمليات على الدوال المتصلة

خاصية

خاصية مقبولة

لتكن  $f$  و  $g$  دالتين متصلتين على مجال  $I$  و  $k$  عددا حقيقيا .  
الدوال  $f+g$  و  $f-g$  و  $f \cdot g$  و  $(kf)$  و  $\frac{f}{g}$  ( $\forall x \in I, g(x) \neq 0$ ) متصلة على  $I$  .

مثال

...

1 الدالة  $x \rightarrow x^2 + \sqrt{x}$  متصلة على  $\mathbb{R}^+$  (لأنها مجموع الدالتين  $\sqrt{x} \rightarrow x$  و  $x \rightarrow x^2$  المتصلتين على  $\mathbb{R}^+$ )

2 الدالة  $x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}}$  متصلة على  $[0, +\infty]$  (لأنها مقلوب الدالة  $\sqrt{x} \rightarrow x$  المتصلة على  $[0, +\infty]$  و لا تendum على  $[0, +\infty]$ )

3 الدالة  $x \rightarrow \frac{x+2}{\sqrt{x+x^2}}$  متصلة على  $[0, +\infty]$  (لأنها خارج الدالة  $x \rightarrow x+2$  المتصلة على  $[0, +\infty]$  و الدالة  $x \rightarrow \sqrt{x+x^2}$  المتصلة على  $[0, +\infty]$  و لا تendum على  $[0, +\infty]$ )

تطبيقي تمرن

بين أن الدالة  $f$  متصلة على المجال  $I$  في كل حالة من الحالات التالية :

$$I = [0, +\infty] \text{ و } f(x) = 2x + \sqrt{x} \quad 1$$

$$I = \mathbb{R} \text{ و } f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2} \quad 2$$

$$I = ]0, +\infty[ \text{ و } f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x}} \quad 3$$

$$I = [0, +\infty] \text{ و } f(x) = \sin(x) + \sqrt{x} \quad 4$$

$$I = \mathbb{R} \text{ و } f(x) = \frac{\cos(x)}{x^2 + 1} \quad 5$$

تمرين

لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  بمা�يلي :  
 حدد العددين الحقيقيين  $a$  و  $b$  لكي تكون  $f$  دالة متصلة على  $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x + a & ; x < 1 \\ 2x - 3 & ; 1 \leq x \leq 3 \\ bx + 1 & ; x > 3 \end{cases}$$

نشاط

- نعتبر  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين المعرفتين بـ :
- $$g(x) = \sqrt{x} \quad f(x) = x^2 + x + 1$$
- 1 دد الدالة  $g \circ f$
  - 2 ادرس اتصال  $f$  في 0 و اتصال  $g$  في  $f(0)$
  - 3 ادرس اتصال الدالة  $g \circ f$  في 0

## اتصال مركب دالتين

خاصية

لتكن  $f$  دالة متصلة على  $I$  و  $g$  دالة متصلة على  $J$  و  $f(I) \subset J$   
 الدالة :  $g \circ f$  متصلة على  $I$ .

مثال

لندرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة بـ :

$$D_f = \mathbb{R}^*$$

- لدينا  $D_f = \mathbb{R}^*$
- نضع :  $h(x) = \sin(x)$  و  $g(x) = \frac{3}{x}$  بحيث  $f(x) = h(g(x))$

لدينا  $g$  دالة جذرية إذن فهي متصلة على مجموعة تعريفها  $\mathbb{R}^*$  ; و  $h$  دالة متصلة على  $\mathbb{R}$  وبالخصوص على  $\mathbb{R}^*$  وبالتالي فإن  $f$  متصلة على  $\mathbb{R}^*$  ( لأنها مركب دالتين متصلتين على  $\mathbb{R}^*$  )

تطبيقي تمارين

...

- 1 باستعمال مركب دالتين ادرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة بمা�يلي :  $f(x) = \sin(x^3 - 3x + 2)$  على  $\mathbb{R}$
- 2 باستعمال مركب دالتين ادرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة بمা�يلي :  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$  على  $[-1, 1]$

نتائج

...

1 إذا كانت  $f$  دالة موجبة و متصلة على مجال  $I$  (أي  $\forall x \in I : f(x) \geq 0$ ) فإن الدالة :  $x \mapsto \sqrt{f}$  متصلة على المجال  $I$

2 إذا كانت الدالة  $f$  متصلة على مجال  $I$  فإن الدالة :  $x \mapsto \cos(f(x))$  متصلة على المجال  $I$

3 إذا كانت الدالة  $f$  متصلة على مجال  $I$  فإن الدالة :  $x \mapsto \sin(f(x))$  متصلة على المجال  $I$

تطبيقي ترين

...

1 ادرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة بعالي :  $f(x) = \sqrt{\frac{3x-1}{x-1}}$  على المجال  $[1, +\infty)$

2 ادرس اتصال الدالة  $f$  المعرفة بعالي :  $f(x) = \cos\left(\frac{x-1}{x^2+1}\right)$  على  $\mathbb{R}$

## 3 صورة مجال بدالة متصلة

### 1.3 صورة قطعة - صورة مجال

خاصية

خاصية مقبولة

...

• صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة

• صورة مجال بدالة متصلة هي مجال


ملاحظة

إذا كانت  $f$  دالة متصلة على مجال  $[a, b]$  فإن  $f([a, b]) = [m, M]$  حيث :  $m$  هي القيمة الدنيا لـ  $f$  على  $[a, b]$  ، و  $M$  هي القيمة القصوى للدالة  $f$  على  $[a, b]$

### 2.3 صورة مجال بدالة متصلة ورتيبة قطعا

لتكن  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال  $I$  لدينا النتائج التالية :

ال المجال	$f(I)$	ال المجال	$I$	رتابة الدالة $f$
$[f(a), f(b)]$	$[f(a), f(b)]$	$[a, b]$	$I$	١٣) تزايدية قطعا على $I$
$f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$	$[a, b[$			
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$	$]a, +\infty[$			
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$	$\mathbb{R}$	$[a, b]$	$I$	١٤) تناقصية قطعا على $I$
$[f(b), f(a)]$	$[a, b]$			
$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x), f(a)$	$[a, b[$			
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	$]a, +\infty[$	$\mathbb{R}$		
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$	$\mathbb{R}$			



## ٤ مبرهنة القيم الوسطية


لتكن  $f$  دالة عدديّة متصلة على مجال  $[a, b]$  بما أن  $f([a, b]) = [m, M]$  و ينتميان إلى القطعة  $[m, M]$  وكل عدد حقيقي  $k$  محصور بين  $f(a)$  و  $f(b)$  لدينا  $f(c) = k$  إذن : يوجد على الأقل عنصر  $c$  من  $[a, b]$  بحيث

مبرهنة القيم الوسطية

مبرهنة

لتكن  $f$  دالة متصلة على مجال  $I$  و  $a$  و  $b$  عنصرين من المجال  $I$  . كل عدد حقيقي  $k$  محصور بين  $f(a)$  و  $f(b)$  يوجد على الأقل عنصر  $c$  من  $[a, b]$  بحيث :

## نشاط



نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = x^3 - 3$  و ليكن  $(C_f)$  منحناها في معلم متعمد منظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  (أنظر الشكل جانبه).

**1** بين أن  $f$  تزايدية و متصلة على  $[0, 2]$

**2** أحسب  $f(0)$  و  $f(2)$  ثم استنتج  $f([0, 2])$

**3** بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلًا وحيدًا في المجال  $[0, 2]$

## ملاحظة

إذا كانت  $f$  دالة متصلة على مجال  $[a, b]$  بحيث  $f(a) < 0$  و  $f(b) > 0$  أو  $f(a) > 0$  و  $f(b) < 0$  فإن  $0$  محصور بين  $f(a)$  و  $f(b)$  و حسب مبرهنة القيمة الوسطية فإنه يوجد على الأقل عنصر  $c$  من  $[a, b]$  بحيث  $f(c) = 0$ . العدد  $c$  هو حل المعادلة  $f(x) = 0$ .

## نتيجة

...

- إذا كانت  $f$  دالة متصلة على مجال  $[a, b]$  بحيث  $f(a) \times f(b) < 0$  فإن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل على الأقل حل في  $[a, b]$
- إذا كانت  $f$  دالة متصلة و رتيبة قطعا على مجال  $[a, b]$  بحيث  $f(a) \times f(b) < 0$  فإن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل على الأقل حل في  $[a, b]$

## تطبيقي تربين

لتكون  $f$  الدالة العددية المعرفة بمجال  $: f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 1$  بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل على الأقل حل في  $[-1, 1]$

تطبيقي تمرن

لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة بعالي :  
 $f(x) = x^3 + x^2 + 4x - 1$  :  
 بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً في  $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$

## 5 طريقة التفرع الثنائي

نشاط

نعتبر الدالة العددية :  $f(x) = x^3 + x + 1$

- |  |  |
|--|--|
| $\alpha \in \left[\frac{5}{8}, \frac{3}{4}\right]$<br><b>5</b><br>أحسب $f\left(\frac{5}{8}\right)$ وتحقق أن                        | <b>1</b><br>بين أن $f$ متصلة على $[0, 1]$  |
| $\alpha \in \left[\frac{11}{16}, 1\right]$<br><b>6</b><br>أحسب $f\left(\frac{11}{16}\right)$ واستنتج تأطيراً للعدد $\alpha$        | <b>2</b><br>بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha$ مخصوصاً بين $0$ و $1$ |
| $\alpha \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$<br><b>7</b><br>أحسب $f(0,682)$ و $f(0,683)$ واستنتج تأطيراً للعدد $\alpha$ سعته $10^{-3}$ | <b>3</b><br>أحسب $f\left(\frac{1}{2}\right)$ وتحقق أن                                  |
|  | <b>4</b><br>أحسب $f\left(\frac{3}{4}\right)$ وتحقق أن                                  |

هناك بعض المعادلات من نوع  $f(x) = 0$  لا يمكن حلها جبرياً، لكن يمكن تحديد قيمة مقربة لحل هذه المعادلة وذلك باستعمال طريقة التفرع الثنائي.

طريقة

لتكن  $f$  دالة متصلة ورتبية قطعاً على  $[a, b]$  و  $f(a)f(b) < 0$  إذن يوجد عدد وحيد  $\alpha$  حل للمعادلة  $f(x) = 0$  في المجال  $[a, b]$ .

- إذا كان  $f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$  فإن  $a < \frac{a+b}{2} < b$  وهذا تأطير لـ  $\alpha$  سعته  $\frac{a+b}{2} - a$  ... نعيد هذه العملية بتعويض  $a$  بـ  $\frac{a+b}{2}$  فتحصل على تأطير سعته  $\frac{b-a}{4}$
- إذا كان  $f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$  فإن  $a < \frac{a+b}{2} < b$  وهذا تأطير لـ  $\alpha$  سعته  $\frac{a+b}{2} - a$  ... نعيد هذه العملية بتعويض  $b$  بـ  $\frac{a+b}{2}$  فتحصل على تأطير سعته  $\frac{b-a}{4}$

نعيد هذه العملية ككل إلى أن نحصل على التأطير المرغوب فيه

تطبيقي تمرن

بين أن المعادلة  $x^3 + x + 1 = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  في المجال  $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$ ؛ ثم حدد تأطيرًا للعدد  $\alpha$  سعته  $\frac{1}{8}$

## 6 الدالة العكسيّة لدالة متصلة

### 1.6 الدالة العكسيّة

#### نشاط

لتكن  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $[0, +\infty]$  بـ :

1 بين أن  $f$  تزايدية قطعاً على  $[0, +\infty]$

2 تحقق أن  $f([0, +\infty]) \subset [-1, +\infty)$

3 بين أن كل عنصر  $y$  من  $[-1, +\infty)$  يقبل سابق وحيد  $x$  من  $[0, +\infty)$  وأن  $x = \frac{1}{2}\sqrt{y+1}$

#### ملاحظة

...

• كل عنصر من  $[0, +\infty)$  له صورة وحيدة في  $[-1, +\infty)$  و كل عنصر من  $[-1, +\infty)$  له سابق وحيد في  $[0, +\infty)$

• نقول إن  $f$  تقابل من  $[0, +\infty)$  نحو  $[-1, +\infty)$

• توجد دالة وحيدة يرمز لها بـ  $f^{-1}$  معرفة على  $[-1, +\infty)$  بـ  $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x+1}$  وتسمى الدالة العكسيّة لدالة  $f$

#### خاصية

إذا كانت  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $I$  فإن لكل عنصر  $y$  من  $J = f(I)$  المعادلة  $y = f(x)$  تقبل حلًا وحيدًا في  $I$  نعبر عن هذا بقولنا  $f$  تقابل من  $I$  نحو  $J$

#### تعريف

لتكن  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $I$  و  $J$  مجال حيث  $J = f(I)$  ، الدالة التي تربط كل عنصر  $y$  بالعنصر الوحد  $x$  من  $I$  بحيث  $y = f(x)$  تسمى الدالة العكسيّة لدالة  $f$  نرمز لها بـ  $f^{-1}$

#### نتائج

لتكن  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعاً على مجال  $I$  و  $f^{-1}$  دالتها العكسيّة لدينا :

$$(\forall y \in J) (\exists! x \in I) : f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) \quad \bullet$$

$$(\forall x \in I) : (f^{-1} \circ f)(x) = x \quad \bullet$$

$$(\forall y \in J) : (f \circ f^{-1})(y) = y \quad \bullet$$

## تطبيقي تarin

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة بـ  $f(x) = \sqrt{x-1}$  :

1 بين أن  $f$  متصلة ورتيبة قطعا على  $[1, +\infty)$

2 استنتج أن  $f$  تقبل دالة عكسية معرفة على مجال  $J$  يجب تحديده

3 حدد  $f^{-1}(x)$  لكل  $x$  من  $J$

## تطبيقي تarin

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $[0, +\infty)$  بـ  $f(x) = x^2$

1 بين أن  $f$  تقابل من  $[0, +\infty)$  نحو  $I = [0, +\infty)$

2 حدد  $f^{-1}$  الدالة العكسية للدالة  $f$

3 أنشئ في نفس المعلم المتعامد المنظم  $(\vec{J}, \vec{i}, O)$  المستقيم  $y = x$  والمنحنيين  $(\Delta)$  و  $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ . ماذا تلاحظ؟

## 2.6 خصائص الدالة العكسية

### نشاط

لتكون  $f$  دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال  $I$  و  $f^{-1}$  دالتها العكسية :

• الدالة  $f^{-1}$  معرفة ومتصلة على  $J = f(I)$

• الدالة  $f^{-1}$  رتيبة قطعا على  $J = f(I)$  ولها نفس منحى تغير الدالة  $f$

• في المعلم المتعامد المنظم  $(\vec{J}, \vec{i}, O)$  منحى الدالة  $f^{-1}$  متماثل مع منحى الدالة  $f$  بالنسبة للمستقيم ذو المعادلة  $y = x$

## 7 دالة الجذر من الرتبة $n$

### خاصية

لتكون  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $I = [0, +\infty)$  بـ  $f(x) = x^n$   $n \in \mathbb{N}^*$ :

بين أن  $f$  تقبل دالة عكسية  $f^{-1}$  على مجال  $J$  يجب تحديده.

نعلم أن الدالة  $f(x) = x^n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) متصلة وتزايدية قطعا على  $I = [0, +\infty)$  إذن تقبل دالة عكسية  $f^{-1}$  معرفة على  $J = f(I) = [0, +\infty)$

## خاصية وتعريف

...

- الدالة العكسية  $f^{-1}$  تسمى دالة الجذر من الرتبة  $n$
- الدالة العكسية  $f^{-1}$  يرمز لها بـ  $\sqrt[n]{\cdot}$
- نكتب  $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$  أو أيضاً  $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$

## ملاحظة

...

- حالة  $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = x : n=1$
- حالة  $f^{-1}(x) = \sqrt[2]{x} = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} : n=2$  (الجذر مربع)
- حالة  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}} : n=3$  (الجذر مكعب)

## خاصية

...

- في معلم متعمد منظم  $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$  منحى الدالة  $f(x) = \sqrt[n]{x}$  مع  $(\mathcal{C}_f)$  منحى الدالة  $f(x) = x^n$  بالنسبة للنصف الأول ( $\Delta$ ) :  $y = x$
- $\sqrt[n]{1} = 1$  و  $\sqrt[n]{0} = 0$
- $(\sqrt[n]{x})^n = x$  و  $(\forall x \geq 0) \sqrt[n]{x^n} = x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x}^n = +\infty$

## نتائج

...

$$(\forall a \in \mathbb{R}^+) (\forall b \in \mathbb{R}^+) : \sqrt[n]{a} \leq \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a \leq b \quad \bullet$$

$$(\forall a \in \mathbb{R}^+) (\forall b \in \mathbb{R}^+) : \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a = b \quad \bullet$$

## مثال

$$\sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2 \quad ; \quad \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$$

## تطبيقي تarin

$$x^3 = -8 \quad x^4 = 81 \quad x^6 = -9 \quad x^3 = 5$$

خاصية

العمليات على الجذور من الرتبة  $n$

ليكن  $x$  و  $y$  عنصرين من  $\mathbb{R}^+$  و  $m$  و  $n$  عنصرين من  $\mathbb{N}^*$  لدينا :

$$(y \neq 0) : \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \quad \bullet$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{xy}} = \sqrt[mn]{xy} \quad \text{و} \quad \sqrt[n]{x} = \sqrt[mn]{x^m} \quad \bullet$$

$$\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy} \quad \bullet$$

$$(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[m]{x^m} \quad \bullet$$

تطبيقي ترين

$$A = \frac{\sqrt[15]{3^5} \times \sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{9^5}}{\sqrt[3]{3}} \quad \text{أحسب وبسط العدد } A \text{ حيث :}$$

## 1.7 القوة الجذرية لعدد حقيقي موجب

تعريف

ليكن  $x$  عدد حقيقي موجب قطعاً و  $r$  عدداً جذرياً غير منعدم حيث  $(p, q) \in \mathbb{N}^{*2}$   $r = \frac{p}{q}$   $x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$  هي العدد الحقيقي ذات الأساس  $x$  والرتبة  $p/q$  المعرفة بعاليٍ :

مثال

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}, \quad \sqrt{x^5} = x^{\frac{5}{2}}, \quad \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$$

خاصية

ليكن  $r$  و  $r'$  عددين جذريين و  $a$  و  $b$  عددين حقيقين موجبين قطعاً لدينا :

$$a^r a^{r'} = a^{r+r'} \quad \bullet$$

$$\frac{a^r}{b^{r'}} = a^{r-r'} \quad \bullet$$

$$(a^r)^{r'} = a^{rr'} \quad \bullet$$

$$\frac{a^r}{b^r} = \left(\frac{a}{b}\right)^r \quad \bullet$$

$$\frac{1}{a^r} = a^{-r} \quad \bullet$$

$$a^r b^r = (ab)^r \quad \bullet$$

تطبيقي ترين

$$B = \frac{\sqrt[3]{7} \times 7^{\frac{2}{3}}}{7^{-\frac{1}{4}}} \quad \text{و} \quad A = \left(2^{-\frac{1}{3}}\right)^5 \times \left(4^{-\frac{1}{2}}\right) \times \left(8^{\frac{2}{3}}\right)^5 \quad \text{بسط العددين } A \text{ و } B \text{ حيث :}$$