



نعتبر ، في الفضاء المنسوب لمعلم متعامد منظم مباشر $\{ \text{النقط} (0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) \text{ و } A(-2, 0, 1) \text{ و } B(1, -1, 2) \text{ و } C(-2, 2, 2) \}$

أ أحسب الجاء السلمي: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ و طولين AB و AC .

ب استنتاج: $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

ج استنتاج بأن النقط: A و B و C غير مستقيمية.

02 تحقق بأن معادلة ديكارتية للمستوى ABC هي: $2x - y + 2z + 2 = 0$

03 نعتبر المستويين: $(P_1): x - 2y + 6z = 0$ و $(P_2): x + y - 3z + 3 = 0$. بين أنهما يتقاطعان تبعاً للمستقيم ذي تمثيل

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = -1 + 3t \\ z = t \end{cases} \text{ بارامترى } t \in \mathbb{R}$$

04 بين أن (P) و (D) يتقاطعان في نقطة C يتم تحديدها.

05 نعتبر الفلكة (S) التي مركزها $(1, -3, 1)$ و شعاعها 3.

أ أعط معادلة ديكارتية للفلكة (S) .

ب أدرس تقاطع الفلكة (S) و المستقيم (D) .

ج بين أن المستوى ABC مماس للفلكة (S) .

نعتبر ، في الفضاء المنسوب لمعلم متعامد منظم مباشر $\{ \text{النقط} (0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) \text{ و } A(2, 1, 0) \text{ و } B(-4, 1, 0) \}$

01 ليكن (P) المستوى المار من النقطة A و $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ متجهة منظمية عليه. (0.5 ن)

بين أن: $0 = x + y - z - 3$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (P) .

02 لتكن (S) مجموعة النقط M من الفضاء التي تتحقق العلاقة $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

بين أن: (S) هي الفلكة التي مركزها النقطة $(-1, 1, 0)$ و شعاعها 3. (0.75 ن)

03 أ أحسب مسافة النقطة Ω عن المستوى (P) ثم استنتاج أن (P) يقطع (S) وفق دائرة (C) . (0.5 ن)

ب بين أن: مركز الدائرة (C) هو النقطة $H(0, 2, -1)$. (0.5 ن)

04 بين أن: $\overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$ ثم استنتاج مساحة المثلث OHB . (0.75 ن)

نعتبر ، في الفضاء المنسوب لمعلم متعامد منظم مباشر $\{ \text{النقط} (0, 0, 1) \text{ و } A(0, 0, 1) \}$ الذي معادله

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم فيزياء + 2 ع. ح. أ



الصفحة

تمارين : الهندسة الفضائية – دراسة تحليلية – (الجاء السلمي + الفلكة + الجاء المتجهي)

$$2x + y - 2z - 7 = 0 \quad \text{و الفلكة } (S) \text{ التي مركزها } (0, 3, -2) \quad \Omega \text{ و شعاعها } 3.$$

..... 01

أ- بين أن : تمثيل بارامטרי للمستقيم (Δ) المار من النقطة A و العمودي على (P) .

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

ب- تحقق أن : $H(-1, 2, 1)$ هي نقطة تقاطع المستوى (P) و المستقيم (Δ) .

..... 02

أ- بين أن : $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ حيث $\vec{A}\Omega \wedge \vec{u} = 3(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})$.

ب- بين أن : مسافة النقطة Ω عن المستقيم (Δ) تساوي 3.

ج- استنتج أن : المستقيم (Δ) مماس للفلكة (S) و تتحقق أن H هي نقطة تمسك المستقيم (Δ) و الفلكة (S) .

بـالـكـ 2015 الدـورـةـ العـادـيـةـ 04

نعتبر ، في الفضاء المنسوب لمعلم متعامد منظم مباشر (P) ، المستوى (P) الذي معادلته $x + y + z + 4 = 0$ ، المستوى (P) الذي معادلته $0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ و الفلكة (S) التي مركزها $(-1, -1, -1)$ و شعاعها $\sqrt{3}$.

..... 01

أ- أحسب المسافة (Ω, P) ثم استنتج أن المستوى (P) مماس للفلكة (S) .

ب- تتحقق أن : النقطة $H(0, -2, -2)$ هي نقطة تمسك المستوى (P) و الفلكة (S) .

ج- نعتبر النقطتين $A(1, 0, 1)$ و $B(2, 1, 1)$.

أ- تتحقق أن $\vec{k} - \vec{j} - \vec{i} = \vec{OA} \wedge \vec{OB}$ ثم استنتج أن : $x - y - z = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (OAB) .

ب- حدد تمثيلا بارامطريا للمستقيم (Δ) المار من Ω و العمودي على المستوى (OAB) .

ج- حدد مثلث إحداثيات كل نقطة من نقطي تقاطع المستقيم (Δ) و الفلكة (S) .

بـالـكـ 2015 الدـورـةـ الـاسـتـدـراـكـيـةـ 05

نعتبر ، في الفضاء المنسوب لمعلم متعامد منظم مباشر (P) ، المستوى (P) الذي معادلته $2x - z - 2 = 0$ و الفلكة (S) الذي معادلتها $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$.

أ- بين أن : مركز الفلكة (S) هو النقطة $(-1, 0, 1)$ و أن شعاعها هو 3.

..... 02

أ- أحسب مسافة النقطة Ω عن المستوى (P) .

ب- استنتج أن المستوى (P) يقطع الفلكة (S) وفق دائرة (Γ) .

ج- بين أن شعاع الدائرة (Γ) هو 2 و حدد مثلث إحداثيات النقطة H مركز الدائرة (Γ) .

في الفضاء المنسوب لمعلم متعامد منظم مباشر $(A, \vec{0}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(3,4,0)$ و $B(0,5,0)$ و $C(0,0,5)$ و نضع I

منتصف القطعة $[AB]$.

.01 أنشئ شكل حيث نضع النقط A و B و C و I في المعلم $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

.02 بين أن كل من المثلثين OAC و OBC هو قائم و متساوي الساقين ثم حدد طبيعة المثلث ABC .

.03 .نعتبر النقطة $H\left(\frac{15}{19}, \frac{45}{19}, \frac{45}{19}\right)$.

أ- بين أن : النقط H و C و I مستقيمية.

ب- بين أن : H هي المسقط العمودي ل O على المستوى ABC .

ج- استنتج معادلة ديكارتية للمستوى ABC .

.04 ...

أ- أحسب مساحة المثلث OAB . استنتج حجم رباعي الأوجه $OABC$.

ب- حدد المسافة للنقطة O عن المستوى ABC .

ج- أحسب مساحة المثلث ABC .

في الفضاء نختار وحدة الطول ثم نعتبر $ABCDEFGH$ متوازي المستويات قائم حيث $AB=1$ و $AD=2$ و $AE=1$ و النقطة I منتصف $[AD]$.


الفضاء مزود بالمعلم المتعامد المنظم $(A, \vec{AB}, \vec{AI}, \vec{AE})$.

.01 .حدد في هذا المعلم إحداثيات النقط F و G و H .

.02 .أ- بين أن : V حجم رباعي الأوجه $GFIH$ يساوي $\frac{1}{3}$.

ب- بين أن : المثلث FIH قائم في I ثم نعبر عن V بطريقة أخرى .

ج- أحسب المسافة d للنقطة G عن المستوى (FIH) .



.03 .نعتبر المتجهة $\vec{n}(2;1;-1)$.

أ- بين أن المتجهة \vec{n} منتظمة على المستوى (FIH) .

ب- استنتاج معادلة ديكارتية للمستوى (FIH) .

ج- أوجد بطريقة ثانية المسافة d للنقطة G عن المستوى (FIH) .

.04 .أ- هل المستقيم (AG) عمودي على المستوى (FIH) .

ب- أعط تمثيل بارامטרי للمستقيم (AG) .

ج- حدد إحداثيات النقطة K تقاطع المستقيم (AG) و المستوى (FIH) .

.05 .نعتبر (Γ) الفلكة حيث مركزها G و المارة من K . حدد طبيعة تقاطع الفلكة (Γ) و المستوى (FIH) .