


التماثل المركزي

(1) – مماثلة نقطة بالنسبة لنقطة :

أ - مثال :



A و O نقطتان مختلفتان من المستوى .

لنشئ A' بحيث تكون O منتصف القطعة [AA'] .

نسمي A' مماثلة A بالنسبة للنقطة O . و نقول كذلك : A' هي مماثلة A بالنسبة للتماثل المركزي الذي مركزه O . نلاحظ أن A هي كذلك مماثلة A' بالنسبة للنقطة O . نقول إذن : A و A' متماثلتان بالنسبة للنقطة O .

ب) - تعريف :

تكون A و A' نقطتين متماثلتين بالنسبة لنقطة O إذا كانت O منتصف القطعة [AA']

* ملاحظة هامة :


مماثلة النقطة O بالنسبة للنقطة O هي O نفسها .

(2) – الحفاظ على المسافة :

أ - مثال :

A و B نقطتان مختلفتان بحيث AB = 4 cm و O نقطة خارج المستقيم (AB) .

لنشئ A' و B' مماثلتى A و B على التوالي بالنسبة للنقطة O .



لحسب A'B' باستعمال المسطرة .

نلاحظ أن AB = A'B' = 4 cm . إذن : .


ب) - خاصية :

التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين

(3) - مماثلات بعض الأشكال :

أ) - مماثلات نقط مستقيمية :

• مثال :



لنشي النقاط A' , B' و C' مماثلات النقاط A , B و C بالنسبة للنقطة O .


نلاحظ أن A' , B' و C' هي كذلك نقاط مستقيمية.

• خاصية :

المماثل المركزي يحافظ على استقامة الخط

ب) - مماثل مستقيم :

• مثال :



لنشي (D') مماثل المستقيم (D) بالنسبة للنطة E .
من أجل هذا سنأخذ نقطتين مختلفتين تتنميان إلى المستقيم (D) ثم ننشي مماثلتهما بالنسبة للنقطة E .


نلاحظ أن المستقيم (D') يوازي المستقيم (D) .

• خاصية :

مماثل مستقيم بالنسبة لنقطة هو مستقيم يوازي

ج) - مماثل نصف مستقيم :

• مثال :




[AB] نصف مستقيم و I نقطة لا تنتمي إلى المستقيم [AB].
لنشي نصف المستقيم [A'B'] مماثل [AB] بالنسبة لنقطة I .
من أجل هذا سننشي A' و B' مماثلتي A و B على التوالي بالنسبة لنقطة I .

• خاصية :

مماثل نصف مستقيم [AB] بالنسبة لنقطة O هو نصف المستقيم [A'B'] بحيث A' و B' مماثلتي A و B على التوالي بالنسبة لنقطة O .

د) - مماثلة قطعة :

• مثال :




[AB] قطعة و M نقطة خارج المستقيم (AB) .
لنشي القطعة [A'B'] مماثلة القطعة [AB] بالنسبة لنقطة M .
من أجل هذا سننشي A' و B' مماثلتي A و B على التوالي بالنسبة لنقطة M .
سيكون لدينا $AB = A'B'$ (الحفاظ على المسافة) و منه نستنتج أن القطعتين [AB] و [A''B''] مقايسان .

• خاصية:

مماالة قطعة بالنسبة لنقطة هي قطعة تقابيسها

٥) - مماالة زاوية :

• مثال:



لتنشئ الزاوية $A' \hat{O}' B'$ مماالة الزاوية $A \hat{O} B$ بالنسبة لنقطة E .
من أجل هذا سننشئ A' , O' , B' ممالات A , O , B على التوالي
بالنسبة لنقطة E .

نلاحظ أن : $A \hat{O} B = A' \hat{O}' B'$

• خاصية:


مماالة زاوية بالنسبة لنقطة هي زاوية تقابيسها

و) - مماالة دائرة :

• مثال:

(C) دائرة مركزها O وشعاعها r ونقطة في المستوى E .
لتنشئ الدائرة (C') مماالة (C) بالنسبة لنقطة E .
من أجل هذا سنأخذ نقطة A تتتمى إلى الدائرة (C)
ثم ننشئ O' , A' بالنسبة لنقطة E . و الدائرة التي مركزها
 O' وتمر من A' هي مماالة (C) بالنسبة لنقطة E .

لنبين أن الدائريتين لهما نفس الشعاع r .



لدينا : $O'E = O'r$ مماالة O بالنسبة لنقطة E .

مماالة A بالنسبة لنقطة E .

إذن :

$OA = O'A'$ (الحفظ على المسافة).

و بما أن :

$O'A' = r$ فإن $OA = r$

و منه نستنتج أن للدائريتين (C) و (C') نفس الشعاع r .

• خاصية:

مماالة دائرة مركزها O وشعاعها r بالنسبة لنقطة E هي
دائرة مركزها O' مماالة O بالنسبة لنقطة E وشعاعها r

• تقنيات :

لرسم مماالة دائرة بالنسبة لنقطة نرسم ممايل المركز بالنسبة لهذه النقطة ثم نحتفظ بنفس الشعاع.


ز) - مركز تماثل شكل :

• خاصية :


نسمى نقطة O مركز تماثل شكل F إذا كان مماثل هذا الشكل بالنسبة للنقطة O هو الشكل F نفسه.

• مثال :

(2) – مركز تماثل قطعة :



مركز تماثل قطعة هو منتصفها



مركز تماثل دائرة هو مركزها