


التماثل المركزي

1 - مماثلة نقطة بالنسبة لنقطة :



(أ) - **مثال :** A و O نقطتان مختلفتان من المستوى .

لنشئ A' بحيث تكون O منتصف القطعة [AA'] .

نسمي A' مماثلة A بالنسبة لنقطة O . و نقول كذلك : A' هي مماثلة A بالنسبة للتماثل المركزي الذي مرکزه O .

نلاحظ أن A هي كذلك مماثلة A' بالنسبة لنقطة O . نقول إذن : A و A' متمااثلتان بالنسبة لنقطة O .

(ب) - **تعريف :**

تكون A و A' نقطتين متمااثلتين بالنسبة لنقطة O إذا كانت O منتصف القطعة [AA'] .

* **ملاحظة هامة :**


مماثلة النقطة O بالنسبة لنقطة O هي O نفسها .

(2) - الحفاظ على المسافة :

(أ) - **مثال :**

A و B نقطتان مختلفتان بحيث AB = 4 cm و O نقطة خارج المستقيم (AB) .

لنشئ A' و B' مماثلتي A و B على التوالي بالنسبة لنقطة O .



لنحسب $A'B'$ باستعمال المسطرة .

. $AB = A'B'$. إذن : $A'B' = 4 \text{ cm}$

ب) - خاصية :

التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين

3 – مماثلات بعض الأشكال :

(أ) – مماثلات نقط مستقيمية :

مثال :


. A و B و C نقط مستقيمية و O نقطة خارج المستقيم (AC)

لنشئ النقط A' و B' و C' مماثلات النقط A و B و C بالنسبة للنقطة O


نلاحظ أن A' و B' و C' هي كذلك نقط مستقيمية .

خاصية :

التماثل المركزي يحافظ على استقامة النقط



ب) – مماثل مستقيم :



(D) مستقيم و E نقطة لا تنتمي إليه .

لنشئ (D') مماثل المستقيم (D) بالنسبة للنقطة E .

من أجل هذا سنأخذ نقطتين مختلفتين تنتميان إلى المستقيم (D)

ثم ننشئ مماثلتيهما بالنسبة للنقطة E .

نلاحظ أن المستقيم (D') يوازي المستقيم (D) .

خاصية: مماثل مستقيم بالنسبة لنقطة هو مستقيم يوازيه

ج) - مماثل نصف مستقيم :


• **مثال :**

[AB] نصف مستقيم و I نقطة لا تنتمي إلى المستقيم (AB)

لنشئ نصف المستقيم (A'B') [AB] مماثل (AB) بالنسبة لنقطة I .

من أجل هذا سننشئ 'A' و 'B' مماثلتي A و B على التوالي

بالنسبة لنقطة I .




خاصية: مماثل نصف مستقيم (AB) بالنسبة لنقطة O هو نصف المستقيم (A'B') بحيث 'A' و 'B' مماثلتي A و B على التوالي بالنسبة لنقطة O .

د) - مماثلة قطعة :


• مثال :

قطعة $[AB]$ و نقطة M خارج المستقيم (AB) .
لنشي القطعة $[A'B']$ مماثلة القطعة $[AB]$ بالنسبة للنقطة M .
من أجل هذا سننشي A' و B' مماثلي A و B على التوالي بالنسبة للنقطة M .



سيكون لدينا $AB = A'B'$ (الحافظ على المسافة) و منه نستنتج أن القطعتين $[AB]$ و $[A'B']$ متقايسان.

• خاصية: مماثلة قطعة بالنسبة لنقطة هي قطعة تقابسها



ه) - مماثلة زاوية :

• مثال :

زاوية $\angle AOB$ و نقطة E في المستوى.
لنشي الزاوية $\angle A'OB'$ مماثلة الزاوية $\angle AOB$ بالنسبة للنقطة E .
من أجل هذا سننشي A' و B' مماثلات A و B على التوالي
بالنسبة للنقطة E .

نلاحظ أن : $\angle AOB = \angle A'OB'$

• خاصية: مماثلة زاوية بالنسبة لنقطة هي زاوية تقابسها

و) - مماثلة دائرة :


• مثال :

دائرة مركزها O و شعاعها r و نقطة E في المستوى (C) .
لنشي الدائرة (C') مماثلة (C) بالنسبة للنقطة E .
من أجل هذا سنأخذ نقطة A تتنمي إلى الدائرة (C)

ثم ننشئ 'O' و 'A'' بالنسبة للنقطة E . و الدائرة التي مركزها

O' و تمر من A' هي مماثلة (C) بالنسبة للنقطة E .

لنبين أن الدائرتين لهما نفس الشعاع r .



لدينا :

O' مماثلة O بالنسبة للنقطة E .

A' مماثلة A بالنسبة للنقطة E .

إذن :

OA = O'A' (الحفظ على المسافة) .

و بما أن :

$$O'A' = r \text{ فإن } OA = r$$

و منه نستنتج أن لل دائرتين (C) و (C') نفس الشعاع r .

خاصية: مماثلة دائرة مركزها O و شعاعها r بالنسبة لنقطة E هي دائرة

مركزها 'O' مماثل O بالنسبة لنقطة E و شعاعها r

• **تقنيات :**

لرسم مماثلة دائرة بالنسبة لنقطة نرسم مماثل المركز بالنسبة لهذه النقطة ثم نحتفظ بنفس الشعاع .

(ز) - مركز تماثل شكل :


• **خاصية :**

نسمى نقطة O مركز تماثل شكل F إذا كان مماثل هذا الشكل

بالنسبة للنقطة O هو الشكل F نفسه.

• مثال :

(1) – مركز تماثل دائرة : (2) – مركز تماثل قطعة :



مركز تماثل قطعة هو

مركز تماثل دائرة هو مركزها

M

منتصفها