


متوازي الأضلاع

متوازي الأضلاع :

(1) – مثال :

(D₁) و (D₂) مستقيمان متوازيان .

(L₁) و (L₂) مستقيمان متوازيان يقطعان (D₁) و (D₂) على التوالي في : A و B و C و D



نسمى الرباعي ABCD متوازي الأضلاع

(2) – تعريف :


متوازي الأضلاع هو رباعي حاملا كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين

خصائص :

(1) – خاصية القطريين :

أ) - الخاصية المباشرة :

ABCD متوازي الأضلاع قطراه يتقاطعان في O .



نلاحظ أن O منتصف القطريين $[AC]$ و $[BD]$.

نقول إذن :


إذا كان رباعي متوازي الأضلاع فإن قطريه نفس المنصف

* ملاحظة هامة : نسمي نقطة تقاطع قطرى متوازي الأضلاع مركزه.

(ب) - الخاصية العكسية :

أ و B و C و D نقط بحيث $[AC]$ و $[BD]$ لهما نفس المنصف O و حاملاهما

غير متعامدين :



لنبرهن أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع.

من أجل هذا سنبرهن أن (AB) يوازي (CD) و أن (AD) يوازي (BC) :

نعلم أن O مننصف $[AC]$ و $[BD]$ إذن :

A و C متماثلتين بالنسبة للنقطة O .

B و D متماثلتين بالنسبة للنقطة O .

إذن : المستقيمين (AB) و (CD) متماثلتين بالنسبة للنقطة O و كذلك المستقيمين (BC) و (AD) .

و منه فإن $(BC) \parallel (AD)$ و $(CD) \parallel (AB)$

و بالتالي فإن ABCD متوازي الأضلاع (حسب التعريف) مركزه النقطة O.

نقول إذن :

إذا كان رباعي قطران لهما نفس المنتصف فإنه يكون متوازي الأضلاع

*** تمرين تطبيقي :**


. [AC] مُنتَصِفٌ و I مُنتَصِفٌ لـ ABC

(1) – أنشئ D مماثلة B بالنسبة للنقطة I .

(2) – أثبت أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع .

الحل :

– الشكل : (1)



(2) – لنجرب أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع :

نعم أن :

I مُنتَصِفٌ لـ [AC].

و لدينا D مماثلة B بالنسبة للنقطة I .

إذن : I مُنتَصِفٌ لـ [BD].


من (1) و (2) نستنتج أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع . (حسب الخاصية العكسية للقطرتين) .

2 – خاصية الأضلاع المتقابلة :

أ) - الخاصية المباشرة :

ABCD متوازي الأضلاع مركزه O .

AD = BC و AB = CD : تبين



نعلم أن O مركز متوازي الأضلاع $ABCD$.

إذن O منتصف القطرين $[AC]$ و $[BD]$.

و منه نستنتج أن : A و C متماثلتين بالنسبة للنقطة O و كذلك B و D .

و وبالتالي فإن : $AD = BC$ و $AB = CD$ (حسب خاصية الحفاظ على المسافة بين نقطتين).

نقول إذن :

إذا كان رباعي متوازي الأضلاع فإن كل ضلعين متقابلين فيه متساوياً

ب) - الخاصية العكسية :


إذا كان رباعي كل ضلعين متساوياً فيهما متساوياً فإنه يكون متوازي الأضلاع

(3) - خاصية الزوايا المتقابلة :

أ) - الخاصية المباشرة :

إذا كان رباعي متوازي الأضلاع مركزه O .

لتبين أن $\hat{BAC} = \hat{BCD}$ و $\hat{ABC} = \hat{ADC}$.



نعلم أن $ABCD$ متوازي الأضلاع مركزه O .

إذن : O منتصف القطرين $[AC]$ و $[BD]$.

و منه فإن : A و C متماثلتين بالنسبة للنقطة O و كذلك B و D .

إذن الزاويتان $\hat{A}BC$ و $\hat{A}DC$ متماثلتان بالنسبة للنقطة O

و كذلك الزاويتين $\hat{B}CD$ و $\hat{B}AD$

و وبالتالي فإن : $\hat{B}\hat{C}\hat{D} = \hat{B}\hat{A}\hat{D}$ و $\hat{A}\hat{B}\hat{C} = \hat{A}\hat{D}\hat{C}$

نقول إذن :


إذا كان رباعي متوازي الأضلاع فإن كل زاويتين متقابلتين فيه مقايسن

ب) - الخاصية العكسية :

إذا كان رباعي كل زاويتين متقابلتين فيه مقايسن فإنه يكون متوازي الأضلاع

4 – ارتفاع متوازي الأضلاع :

متوازي الأضلاع ABCD و المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم . (CD)



نسمى AH ارتفاع متوازي الأضلاع . ABCD

(5) – خاصية إضافية :

إذا كان رباعي ضلعان متقابلان و حاملاهما متوازيين فإنه يكون متوازي الأضلاع