

LES ANGLES

I. SOMME DES ANGLES D'UN TRIANGLE :

Propriété : La somme des trois mesures des angles d'un triangle vaut 180° .

DEMONSTRATION

Traçons une droite (MN) parallèle à [BC] passant par le point A.

Considérons le point I milieu du segment [AB].

La symétrie centrale conserve les angles,

→ donc l'angle \widehat{BAM} est égal à l'angle \widehat{ABC} .

De même en considérant le point J milieu du segment [AC] :


→ l'angle \widehat{CAN} est égal à l'angle \widehat{ACB} .

Les points M, A, N sont alignés donc $\widehat{MAN} = 180^\circ$.

Ainsi : $\widehat{MAB} + \widehat{BAC} + \widehat{CAN} = 180^\circ$.

Or : $\widehat{MAB} = \widehat{ABC}$ et $\widehat{CAN} = \widehat{ACB}$.

Donc : $\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$: la somme des angles du triangle ABC vaut 180° .



II. TRIANGLES PARTICULIERS

1/ TRIANGLE RECTANGLE

Propriété : Si un triangle est rectangle, alors les deux angles adjacents à son hypoténuse sont complémentaires (leur somme vaut 90°).

Propriété : Si la somme de deux angles d'un triangle vaut 90° , alors ce triangle est rectangle.

2/ TRIANGLE ISOCÈLE


Définition : Un triangle est dit isocèle lorsqu'il possède deux côtés de même longueur. Le côté opposé à son sommet principal est appelé sa base.

Propriété : Si un triangle est isocèle, alors les deux angles adjacents à sa base ont même mesure.

Propriété : Si deux angles d'un triangle sont de même mesure, ce triangle est isocèle.

→ si on connaît la mesure d'un angle d'un triangle isocèle, on peut calculer tous ses angles.

Propriété : Si un triangle est isocèle, alors les trois droites remarquables issues de son sommet principal et la médiatrice de la base sont confondues (elles forment l'axe de symétrie de ce triangle).




3/ TRIANGLE ÉQUILATÉRAL

Définition : Un triangle est dit équilatéral lorsqu'il possède trois côtés de même longueur.

Propriété : Si un triangle est équilatéral, alors ses trois angles ont une mesure de 60° .

Propriété : Si les trois angles d'un triangle mesurent 60° , alors ce triangle est équilatéral.




Propriété : Si un triangle est équilatéral, alors **les trois droites remarquables issues de chaque sommet et la médiatrice du côté opposé sont confondues** (elles forment les trois axes de symétrie de ce triangle).

III. VOCABULAIRE DES ANGLES

1) Angles adjacents.

Définition : Deux angles sont **adjacents** lorsque :


- ils ont le même sommet ;
- ils ont un côté commun ;
- ils sont de part et d'autre de ce côté.



Propriété : Si deux angles \widehat{xOy} et \widehat{yOz} sont adjacents, alors $\widehat{xOz} = \widehat{xOy} + \widehat{yOz}$.

Exemple : On donne $\widehat{BAC} = 26^\circ$ et $\widehat{CAD} = 17^\circ$. Calculer \widehat{BAD} .

Les angles \widehat{BAC} et \widehat{CAD} sont adjacents, donc : $\widehat{BAD} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD}$
soit : $\widehat{BAD} = 26 + 17 = 43^\circ$



2) Angles complémentaires, angles supplémentaires

Deux angles sont **complémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90° .


Deux angles sont **supplémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180° .

3) Angles alternes-internes, angles correspondants

Deux droites coupées par une sécante forment avec cette sécante deux paires d'angles **alternes-internes** et quatre paires d'angles **correspondants**.


Deux angles sont **alternes-internes** lorsqu'ils sont situés :

- de part et d'autre de la droite Δ ;
- entre les droites d et d' .



Deux angles sont **correspondants** lorsqu'ils sont situés :


- d'un même côté de la droite Δ ;
- l'un entre les droites d et d' , l'autre pas.



4) Angles opposés par le sommet.

Deux angles **opposés par le sommet** sont deux angles :


- qui ont le même sommet ;
- dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre.



IV. PROPRIÉTÉS

1) Angles opposés par le sommet.


Propriété : Les angles opposés par le sommet sont égaux.



2) Angles alternes-internes.

Propriété


Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante alors les angles alternes-internes d'une même paire sont égaux.



3) Angles correspondants.

Propriété


Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante alors les angles correspondants d'une même paire sont égaux.



Cas particulier : Angles droits

Propriété

Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre.



Propriété

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles ont parallèles.