



نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمحظولين

I - نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمحظولين :

(1) - تعريف :

a' و b' و c' أعداد حقيقة غير منعدمة.

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

تسمى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمحظولين هما العددان الحقيقيان x و y .

(2) - مثال :

$$\begin{cases} 3x - 2y + 5 = 0 \\ x + 2y - 3 = 0 \end{cases}$$

نعتبر النظمة الآتية :

II - حل النظمة :

(1) - تعاريف :

* / حل نظمة هو تحديد الأزواج $(x; y)$ التي تحقق معادلتي هذه النظمة.

* / حل نظمة ينقسم إلى قسمين :

-- الحل الجبري ، وهو نوعان : طريقة التعويض و طريقة التالفة الخطية .

-- الحل المباني .

(2) - أمثلة :

أ) -- الحل الجيري لنظام معادلتين :

$$(E) \quad \begin{cases} (1) \quad 2x + y = 11 \\ (2) \quad x + 3y = 18 \end{cases}$$

لحل النظمة :

في المعادلة (1) نحسب y بدلالة x . إذن :

في المعادلة (2) نعرض y بالقيمة $11 - 2x$ ثم نحسب x . إذن :

$$x + 3(11 - 2x) = 18$$

$$x + 33 - 6x = 18$$

$$x - 6x = 18 - 33$$

$$-5x = -15$$

$$x = \frac{-15}{-5}$$

$$x = 3$$

و منه فإن :

$$y = 11 - 2 \times 3$$

$$y = 11 - 6$$

$$y = 5$$

و بالتالي الزوج $(3;5)$ هو حل هذه النظمة .

$$(F) : \begin{cases} (1) & 2x + 3y = 5 \\ (2) & 5x + 6y = 14 \end{cases} \quad \text{لحل النظمة :} \quad * / \text{طريقة التألفية الخطية :}$$

$$\begin{cases} -4x - 6y = -10 \\ 5x + 6y = 14 \end{cases} \quad \text{بضرب طرفي المعادلة (1) في العدد 2 - نحصل على النظمة :}$$

جمع المعادلتين المحصل عليهما طرف بطرف نحصل على :

$$-4x - 6y + 5x + 6y = -10 + 14$$

$$-4x + 5x - 6y + 6y = 4$$

$$x = 4$$

بضرب طرفي المعادلة (1) في العدد 5 و طرفي المعادلة (2) في العدد 2 - نحصل على النظمة :

$$\begin{cases} 10x + 15y = 25 \\ -10x - 12y = -28 \end{cases}$$

جمع المعادلتين المحصل عليهما طرف بطرف نحصل على :

$$10x + 15y - 10x - 12y = 25 - 28$$

$$10x - 10x + 15y - 12y = -3$$

$$3y = -3$$

$$y = \frac{-3}{3}$$

$$y = -1$$

و بالتالي الزوج $(-5;4)$ هو حل النظمة .

ب) -- الحل المباني لنظمة معادلتين :

$$(S) : \begin{cases} 4x - y - 2 = 0 \\ 2x - y + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{لحل النظمة :}$$

ليكن (D_1) المستقيم الذي معادلته : $4x - y - 2 = 0$

ليكن (D_2) المستقيم الذي معادلته : $2x - y + 2 = 0$

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

لنحدد المعادلة المختصر لكل من المستقيمين (D_1) و (D_2) .

$$\begin{cases} (D_1) : y = 4x - 2 \\ (D_2) : y = 2x + 2 \end{cases} \quad \text{لدينا :}$$

نلاحظ أن المستقيمين (D_2) و (D_1) ليس لهما نفس الميل ، إذن فهما مستقيمان متقاطعان.


و بالتالي للنظامة حلًا وحيدا هو زوج إحداثي نقطة تقاطع المستقيمين (D_1) و (D_2) .
لتكن $M(x_M; y_M)$ نقطة تقاطع المستقيمين (D_1) و (D_2) . لنحدد زوج إحداثي M .

نعتبر المستوى منسوبا إلى معلم متعادم منظم $(O; I; J)$.

لنشئ المستقيمين (D_2) و (D_1) .

	(D_2)
x	0
y	2
$M(x; y)$	$E(0; 2)$

	(D_1)
x	0
y	-2
$M(x; y)$	$A(0; -2)$



نلاحظ من خلال المبيان أن :

و بالتالي الزوج $(2; 6)$ هو حل النظمة (S) .

* / ملاحظة هامة :

- إذا كان للمستقيمين نفس الميل نقول أنهما متوازيان قطعا و أن النظمة ليس لها حل .
- إذا كان للمستقيمين نفس الميل و نفس الأرتب و عند الأصل نقول أنهما متوازيان منطبقان و أن ما لانهاية من الأزواج حول للنظمة .

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

III _ مسائل تؤول في حلها إلى نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين .

(1) – قاعدة :

- لحل مسألة تتبع المراحل التالية :
- اختيار المجهولين .
- صياغة النظمة .
- حل النظمة (جبرياً) .
- التحقق من الحل .
- الرجوع إلى المسألة .

(2) – مثال :

ساهمت مجموعة تتكون من 20 فرداً (أساتذة و تلاميذ)، في شراء مجموعة من الكتب لخزانة المدرسة بثمن 320 درهماً .

إذا علمت أن كل أستاذ ساهم ب 30 درهم وأن كل تلميذ ساهم ب 10 دراهم، فما هو إذن عدد الأساتذة وما هو عدد التلاميذ المساهمين ؟

(1) – اختيار المجهولين :

ليكن x هو عدد التلاميذ المساهمين و y هو عدد الأساتذة المساهمين .

(2) – صياغة النظمة :

عدد الأفراد الذين ساهموا هو 20 فرداً من بينهم أساتذة و تلاميذ ، إذن : $x + y = 20$.

ساهم كل أستاذ ب 30 درهم و ساهم كل تلميذ ب 10 دراهم بحيث مجموع مساهماتهم

يساوي 320 درهماً ، إذن : $10x + 30y = 320$.

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 10x + 30y = 320 \end{cases}$$

إذن النظمة هي :

(3) – حل النظمة :

باتباع إحدى الطريقيتين المذكرتين أعلاه نحصل على : $x = 14$ و $y = 6$.

(4) – التتحقق من الحل :

لدينا : $10 \times 14 + 30 \times 6 = 140 + 180 = 320$ و $14 + 6 = 20$

إذن الزوج $(14; 6)$ هو حل النظمة أعلاه .

(5) – الرجوع إلى المسألة :

عدد التلاميذ هو : 14 .

عدد الأساتذة هو : 6 .