

حل تمارين نظام معادلتين

حل التمرين الأول:

$$\begin{cases} x + 2y = 2 & (1) \\ 0,5x + y = 1 & (2) \end{cases}$$

نضرب المعادلة (2) في 2- نحصل على

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ -x - 2y = -2 \end{cases}$$

$$0x + 0y = 0$$

بجمع المعادلتين نحصل على

و بالتالي جميع القيم التي يمكن أن تأخذها x و y هي حلول للمعادلة
و بذلك هناك مالا نهاية له من الحلول

$$\begin{cases} x - y = -1 & (1) \\ 2x - 2y = -5 & (2) \end{cases}$$

نضرب المعادلة (1) في 2- نحصل على

$$\begin{cases} -2x + 2y = +2 \\ 2x - 2y = -5 \end{cases}$$

$$0x + 0y = -3$$

نجمع المعادلتين

و هذا غير ممكن لأن

و بالتالي لا يوجد هناك حل $S = \emptyset$

☞

$$\begin{cases} \frac{x}{y} = -3 & (1) \\ 5 + 2x = 3y & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -3y & (1) \\ 5 + 2x = 3y & (2) \end{cases}$$

بتعويض قيمة x في المعادلة (2) نحصل على :

$$5 + 2(-3y) = 3y$$

$$9y = 5$$

$$y = \frac{5}{9}$$

يعني

$$x = -3 \times \frac{5}{9} = -\frac{5}{3}$$

إذن

النظمة لها حل وحيد و هو الزوج

$$S = (-\frac{5}{3}, \frac{5}{9})$$

☞

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 - y^2 = -3 \end{cases}$$

$$0 \neq -3$$

لدينا

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 3(x - y) = -3$$

إذن

$$x - y = -1 \quad (1)$$

و

$$x + y = 3 \quad (2)$$

لدينا $x = -1 + y$ نعوضها في المعادلة (2)

$$-1 + y + y = 3 \implies 2y = 4 \implies y = 2$$

$$x = -1 + 2$$

إذن

$$S = (1, 2)$$

☞

$$\frac{x+3}{y+5} = 3$$

$$\frac{x+1}{y-3} = \frac{1}{2}$$

إذن

$$x + 3 = 3(y + 5) = 3y + 15$$

$$2(x + 1) = 1(y - 3)$$

$$x + 3 - 3y - 15 = 0$$

$$2x + 2 - y + 3 = 0$$

$$\begin{cases} 6x + 2y = 230 \\ -6x + 9y = 210 \end{cases} \quad \text{نحصل}$$

$$11y = 440 \quad \text{المجموع يعطي}$$

$$y = \frac{440}{11} = 40$$

إذن نعوض قيمة y في المعادلة (1)

$$3x = 115 - y = 75$$

$$x = \frac{75}{3} = 25$$

$$S = (25, 40)$$

إذن

2- حلول النظام

$$\begin{cases} 3x^2 + y^2 = 115 \\ 2x^2 - 3y^2 = -70 \end{cases}$$

لاحظ أن للنظمتين نفس المعاملات في المعادلتين

لذلك نضع $X = x^2$ و $Y = y^2$ نحصل على النظام الجديدة

$$(E) \begin{cases} 3X + Y = 115 \\ 2X - 3Y = -70 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 3y = 12 & (1) \\ 2x - y = -5 & (2) \end{cases}$$

حسب (1) لدينا $x = 3y + 12$ إذن بتعويضها في (2)

$$2(3y + 12) - y = -5$$

$$6y - y + 24 = -5$$

$$5y = -29$$

$$y = \frac{-29}{5}$$

$$x = 3\left(\frac{-29}{5}\right) + 12 = \frac{-87}{5} + 12$$

إذن

$$x = \frac{-27}{5}$$

$$S = \left(\frac{-27}{5}, \frac{-29}{5}\right)$$

إذن

حل التمرين الثاني

-1

$$(E) \begin{cases} 3x + y = 115 & (1) \\ 2x - 3y = -70 & (2) \end{cases}$$

نضرب المعادلة (1) في 2 و المعادلة (2) -3

حسب السؤال (1) لدينا $X = 25$ و $Y = 40$

لأن $(25, 40)$ هو حل النظام

وبالتالي $x^2 = X = 25$ و $y^2 = Y = 40$

إذن $x = 5$ أو $x = -5$ و $y = 2\sqrt{5}$ أو $y = -2\sqrt{5}$

وبالتالي مجموعة الحلول هي :

$$S = \{(-5, 2\sqrt{5}); (-5, -2\sqrt{5}); (5, 2\sqrt{5}); (5, -2\sqrt{5})\}$$

حل التمرين الثالث:

$$\begin{cases} mx + y = 1 & (1) \\ x + my = 1 & (2) \end{cases}$$

$m \in \mathbb{IN}$

من خلال المعادلة (2) لدينا $x = 1 - my$ ثم نعوض في المعادلة (1) نحصل على

$$m(1 - my) + y = 1$$

$$m - m^2y + y = 1$$

$$(1 - m^2)y = 1 - m$$

$$y = \frac{1 - m}{1 - m^2} \quad \text{إذا كان } 1 - m^2 \neq 0 \text{ فإن}$$

$$= \frac{1 - m}{(1 - m)(1 + m)} = \frac{1}{1 + m}$$

$$x = 1 - m \left(\frac{1}{1 + m} \right)$$

$$= \frac{1 + m - m}{1 + m}$$

$$= \frac{1}{1 + m}$$

$$S = \left\{ \left(\frac{1}{1 + m}, \frac{1}{1 + m} \right), m \in \mathbb{IN} \right\}$$

إذن مجموعة الحلول هي

إذا كان $1 - m^2 = 0$ و منه $m^2 = 1$ إذن $m = -1$ أو $m = 1$

أ - إذا كان $m = 1$ فإن النظام يصبح :

$$\begin{cases} -x + y = 1 & (3) \\ x - y = 1 & (4) \end{cases}$$

$$(3) + (4) \text{ تعطي } 0 = 2 \text{ وهذا غير ممكن إذن } S = \emptyset$$

ب - إذا كان $m = -1$ فإن النظام يصبح

$$\begin{cases} x + y = 1 & (5) \\ x + y = 1 & (6) \end{cases}$$

$$(5) - (6) \text{ تعطي } 0 \cdot x + 0 \cdot y = 0 \text{ وبالتالي يوجد ما لانهاية له من الحلول}$$

$$S = \{ (x, y); x + y = 1 \}$$

أي المستقيم الذي معادلة $x + y = 1$

حل التمرين الرابع:

$$4^n + 65 = p^2$$

$$y^2 - x^2 = p^2 - (2^n)^2 = p^2 - 2^{2n}$$

$$= p^2 - (2^2)^n = p^2 - 4^n = 65$$

$$(y - x)(y + x) = 65 = 13 \times 5$$

لدينا بما أن x و y هي أعداد صحيحة طبيعية

$$(-x < x \text{ لأن } x > 0) ; y - x < y + x \text{ و}$$

$$(S') \begin{cases} y - x = 1 & (3) \\ y + x = 65 & (4) \end{cases} \quad \text{أو} \quad (S) \begin{cases} y - x = 5 & (1) \\ y + x = 13 & (2) \end{cases}$$

2- لإيجاد n و p يكفي حل النظامين (S) و (S')

$$\text{لدينا } (1) + (2) \Rightarrow 2y = 18 \Rightarrow y = 9 \Rightarrow x = 4$$

$$2^n = x = 4 = 2^2$$

$$n = 2$$

$$p = y = 9$$

$$\text{إذن } n = 2 \text{ و } p = 9 \text{ تحقق المعادلة } 4^n + 65 = p^2$$

$$\text{في النظام } S' : (3) + (4) \Rightarrow 2y = 66 \Rightarrow y = 33$$

$$x = 65 - 33 = 32 = 2^5$$

حل التمرين الخامس:

1- المعادلة هي بداية لمتطابقة هامة :

$$x^2 - 6x + 7 = x^2 - 2 \times 3 \times x + 3^2 - 3^2 + 7$$

$$= (x - 3)^2 - 9 + 7$$

$$= (x - 3)^2 - 2$$

$$(x - 3)^2 - 2 = (x - 3 - \sqrt{2})(x - 3 + \sqrt{2}) \quad -2$$

$$x = 3 - \sqrt{2} \quad x = 3 + \sqrt{2} \quad \text{إذن}$$

$$\text{و بالتالي } S = \{3 - \sqrt{2}, 3 + \sqrt{2}\} \text{ هي المعادلة}$$

3- حلول النظام

$$\begin{cases} A + B = 6 & (1) \\ A^2 + B^2 = 22 & (2) \end{cases}$$

عند حل هذه النظام نذكر أن هذا مرتبط بالسؤال الثاني لذلك يجب أن تصبح النظام

عبارة عن معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد A و B

$$\text{لدينا } A = 6 - B \text{ ثم نعوض في (2)}$$

$$(6 - B)^2 + B^2 = 22$$

$$36 - 12B + B^2 + B^2 = 22$$

$$2B^2 - 12B + 14 = 0$$

$$B^2 - 6B + 7 = 0$$

و هذا مل أردنا الحصول عليه !

حسب السؤال (2) لدينا $3 - \sqrt{2}$ و $3 + \sqrt{2}$ هو حلول المعادلة

و بالتالي $B = 3 + \sqrt{2}$ أو $B = 3 - \sqrt{2}$

$$A = 6 - B = 6 - 3 - \sqrt{2} \quad A = 6 - B = 6 - 3 + \sqrt{2} = 3 + \sqrt{2}$$

$$S = \{(3 + \sqrt{2}, 3 - \sqrt{2}); (3 - \sqrt{2}, 3 + \sqrt{2})\}$$

حل التمرين السادس:

إذا كان x حل للمعادلة (E) فإن : $U + V = \sqrt{3} - 1$

و بالتالي (U , V) تحقق المعادلة الثانية من النظام

بقي الآن أن نبين أن (U , V) تحقق المعادلة الأولى أي

يجب أن نبرهن أن $U + V = \sqrt{3} + 1$

$$U + V = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}$$

$$= \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} \times \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}$$

$$= \frac{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}$$

$$= \frac{(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{x-1})^2}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}$$

$$= \frac{x+1 - (x-1)}{U+V}$$

$$U - V = \sqrt{3} - 1 \quad \text{لدينا}$$

$$= \frac{2}{U - V}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3} - 1} \times \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} + 1}$$

$$= \frac{2(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3})^2 - 1^2}$$

$$= \frac{2(\sqrt{3} + 1)}{2} = \sqrt{3} + 1$$

و بالتالي $U + V = \sqrt{3} + 1$ إذن الزوج (U , V) يحقق معادلتنا (S)

يعني يحقق النظام

$$\begin{cases} U + V = \sqrt{3} + 1 & (1) \\ U - V = \sqrt{3} - 1 & (2) \end{cases}$$

$$U = \sqrt{3} \quad \Leftrightarrow 2U = 2\sqrt{3} \quad \Leftrightarrow (1) + (2)$$

$$V = \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3} = 1$$

و بالتالي $S = (\sqrt{3}, 1)$ حل وحيد للنظمة S

3- وجدنا من خلال السؤال (2) $\sqrt{x+1} = U = \sqrt{3}$

$$\sqrt{x-1} = V = 1$$

إذن $x+1=3$ و $(x-1=1)$

إذن $(E) \quad x=2$

$$(1) \begin{cases} x+y=43 \\ 2x+5y=164 \end{cases}$$

نضرب (1) في -2

$$\begin{cases} -2x-2y=-86 \\ 2x+5y=164 \end{cases}$$

ثم نجمع: $3y=78 \Rightarrow y=26$ و $x=43-26=17$

إذن (17, 26) حل وحيد للنظمة

حل التمرين السابع:

2- لاحظ أنه يجب استعمال السؤال (1) لحل هذه المسألة

و بالتالي يجب تحليل المعطيات و كتابتها على شكل رياضي من أجل الوصول

إلى كتابة نظمة السؤال (1)

X عدد أوراق 20 درهم

Y عدد أوراق 50 درهم

لاحظ أن : 1460 د مكونة من

حسب المعطيات لدينا مجموع الأوراق هو 43 يعني :

$$X + Y = 43 \quad (1)$$

من جهة أخرى لدينا : 20 X هو المبلغ ضمن 1640 د

وكذلك 50 Y هو المبلغ المكون من أوراق 50 د

إذا أضعنا المبلغ 20 X و 50 Y نجد المبلغ الكلي 1640

و بالتالي $20X + 50Y + 1640$

إذا اختزلنا بالعدد 10 نجد $2X + 5Y = 164$ (2)

إذن نجد ما بحثنا عنه أي

$$\begin{cases} X + Y = 43 \\ 2X + 5Y = 164 \end{cases}$$

و حسب السؤال (1) لدينا $X = 17$ و $Y = 26$

إذن هناك 17 ورقة من فئة 20 درهم

كذلك 26 ورقة من فئة 50 درهم