



الدالة الخطية و الدالة التألفية

I - الدالة الخطية :

(1) - تعريف :

العلاقة f التي تربط كل عدد حقيقي x بالعدد الحقيقي ax عدد حقيقي معلوم a تسمى دالة خطية معاملها a و نكتب :
 $f : x \rightarrow ax$ أو $f(x) = ax$
العدد ax يسمى صورة x بالدالة الخطية f

(2) - أمثلة :

f و g و h دوال معرفة كما يلي :

$$h(x) = -\sqrt{5}x \quad g(x) = 0x \quad f(x) = \frac{x}{3}$$

إذن :

- f دالة خطية معاملها العدد $\frac{1}{3}$
- g دالة خطية معاملها العدد 0 .
- h دالة خطية معاملها العدد $-\sqrt{5}$

(3) - خاصية :

إذا كانت f دالة خطية و x عدد حقيقي غير منعدم فإن :

معامل الدالة f هو العدد الحقيقي : $\frac{f(x)}{x}$

* / تمرين تطبيقي :

$$f(-5) = \frac{2}{3} \quad f \text{ دالة خطية بحيث :}$$

حدد معامل الدالة f ثم حدد $f(x)$.

الحل :

لدينا :

$$a = f(-5) = \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{-5}{1} = \frac{-10}{3} \quad f \text{ دالة خطية إذن : } f(x) = ax \text{ و معاملها هو العدد الحقيقي :}$$

$$f(x) = \frac{-10}{3}x \quad \text{و منه فإن :}$$

4) التمثيل المباني لدالة خطية :

* / تعريف :

$(O; I; J)$ معلم متعامد في المستوى


تمثيل المباني لدالة خطية هو مستقيم يمر من أصل المعلم O .

* / مثال :

$f(x) = -2x$ دالة خطية معرفة كما يلي :

لنشرى التمثيل المباني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد منظم (J) .

لدينا :



إذن التمثيل المباني للدالة هو المستقيم من O و من النقطة $A(1, -2)$.

* / ملاحظة هامة :

-- إذا كانت $(x; y)$ نقطة تنتي إلى التمثيل المباني
دالة خطية f فإن : $f(x) = y$.

-- إذا كانت M نقطة تنتي إلى التمثيل المباني لدالة خطية f فإن :
 $M(x; f(x))$.

II _ الدالة التألفية :

1) - تعريف :

العلاقة f التي تربط كل عدد حقيقي x بالعدد الحقيقي $ax + b$
تسمى دالة تألفية معاملها a و نكتب :
 $f : x \rightarrow ax + b$ أو $f(x) = ax + b$
العدد $ax + b$ يسمى صورة x بالدالة الخطية

2) - أمثلة :

f و g دالتان معرفتان كما يلي :

$$g(x) = 5 \quad f(x) = -\frac{x}{7} + 11$$

-- f دالة تألفية معاملها $-\frac{1}{7}$

-- g دالة تألفية معاملها 0.

(3) - خاصية :

إذا كانت f دالة تألفية و x عدد حقيقي غير منعدم فإن :

معامل الدالة f هو العدد الحقيقي : $\frac{f(x) - f(x')}{x - x'}$ و $\neq 0$

* / تمرين تطبيقي :

f دالة تألفية بحيث : $f(1) = -3$ و $f(3) = 2$

حدد معامل الدالة f ثم حدد $f(x)$.

الحل :

لدينا دالة تألفية إذن : $f(x) = ax + b$ و معاملها هو العدد الحقيقي :

$$a = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{2 - (-3)}{3 - 1} = \frac{2 + 3}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\text{و منه فإن : } f(x) = \frac{5}{2}x + b$$

لنسكب العدد الحقيقي b .

$$\frac{5}{2} \times 1 + b = -3 \quad \text{يعني أن : } f(1) = -3$$

$$\frac{5}{2} + b = -6$$

$$5 + 2b = -6$$

$$2b = -6 - 5$$

$$b = \frac{-11}{2}$$

$$\text{وبالتالي فإن : } f(x) = \frac{5}{2}x - \frac{11}{2}$$

(4) - التمثيل المباني لدالة تألفية :

* / تعريف :


$(O; I; J)$ معلم متعدد في المستوى

تمثيل المباني لدالة خطية هو مستقيم يمر من نقطتين مختلفتين

$B(x'; f(x'))$ و $A(x; f(x))$

* / مثال :

لنشرى في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد مننظم $(O; I; J)$ ، الدالة التاليفية f بحيث : $f(x) = 2x + 4$ لدينا :



x	0	-2
$f(x)$	4	0

إذن التمثيل المباني للدالة هو المستقيم (AB) بحيث :

$$B(-2; 0) \text{ و } A(0; 4)$$

(5) - حالة خاصة :

الدالة f المعرفة المعرفة كما يلي : $f(x) = a$ تسمى دالة تاليفية معاملها a عدد حقيقي معلوم و تمثيلها المباني هو المستقيم المار من النقطة $A(0; a)$ و الموازي لمحور الأفاصيل .

* / مثال :

لنشرى في المستوى المنسوب إلى معلم متعمد مننظم $(O; I; J)$ ، الدالة التاليفية f بحيث :

$$f(x) = -2$$

