


(3) حدد جدول تغيرات الدالة

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | 0 |           |

(4) التمثيل المبياني للدالة  $f$  هو شلجم رأسه النقطة 0

رسم التمثيل المبياني للدالة  $f$

|        |                |    |                |   |                |    |                |
|--------|----------------|----|----------------|---|----------------|----|----------------|
| $x$    | -3             | -2 | -1             | 0 | 1              | 2  | 3              |
| $f(x)$ | $-\frac{9}{2}$ | -2 | $-\frac{1}{2}$ | 0 | $-\frac{1}{2}$ | -2 | $-\frac{9}{2}$ |



**تمرين 3 (6 نقاط)**

نعتبر الدوال  $f$  و  $g$ :  $f(x) = \frac{x-3}{2x+4}$  و  $g(x) = \frac{4x}{25x^2-4}$

- حدد مجموعة تعريف الدوال  $f$  و  $g$
- أدرس زوجية الدالة  $g$  واعط أويلا مبيانيا

(الجواب:1)  $f(x) = \frac{x-3}{2x+4}$  يعني  $D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2x+4 \neq 0\}$

$$D_f = \mathbb{R} - \{-2\} \text{ ومنه } x = -2 \text{ يعني } 2x = -4 \text{ يعني } 2x+4 = 0$$

$$D_g = \{x \in \mathbb{R} / 25x^2 - 4 \neq 0\} \text{ يعني } g(x) = \frac{4x}{25x^2 - 4}$$

$$25x^2 - 4 = 0 \text{ يعني } (5x-2)(5x+2) = 0 \text{ يعني } x = \frac{2}{5} \text{ أو } x = -\frac{2}{5}$$

$$D_g = \mathbb{R} - \left\{-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right\} \text{ ومنه } x = -\frac{2}{5} \text{ أو } x = \frac{2}{5}$$

(2) دراسة زوجية الدالة  $g$ :

$$\text{أ) لكل } x \text{ من } \mathbb{R} - \left\{-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right\} \text{ لدينا: } -x \text{ تنتمي إلى } \mathbb{R} - \left\{-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right\}$$

$$g(-x) = \frac{4(-x)}{25(-x)^2 - 4} = -\frac{4x}{25x^2 - 4} = -g(x) \text{ (ب) ومنه } g \text{ دالة فردية}$$

التأويل المبياني: أصل المعلم هو مركز تماثل لمنحنى الدالة  $g$

**تمرين 1: (6 نقاط)**

في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  نعتبر النقط:  $A(2;1)$  و  $B(3;3)$  و  $C(1;3)$ .


(1) أنشئ النقط (2) حدد إحداثيتي  $\overrightarrow{AB}$

(3) حدد إحداثيتي  $I$  منتصف القطعة  $[AB]$

(4) أحسب المسافة  $AB$

(5) بين أن المثلث  $ABC$  متساوي الساقين رأسه  $A$

(الجواب:1)



$$(1) \overrightarrow{AB} (x_B - x_A, y_B - y_A) \text{ أي أن } \overrightarrow{AB} (3-2, 3-1)$$

و بالتالي:  $\overrightarrow{AB} (1, 2)$

$$(3) I \left( \frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right) \text{ يعني } I \left( \frac{3+2}{2}, \frac{3+1}{2} \right) \text{ يعني } I \left( \frac{5}{2}, 2 \right)$$

$$(4) AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(3-2)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

$$(5) AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(1-2)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

ومنه المثلث  $ABC$  متساوي الساقين رأسه  $A$

**تمرين 2: (8 نقاط)**

لتكن  $f$  دالة معرفة ب:  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2$

(1) حدد  $D_f$  (2) أدرس رتبة الدالة  $f$  على المجالين  $[0; +\infty[$  و  $] -\infty; 0]$

(3) حدد جدول تغيرات الدالة  $f$ . أرسم  $(C_f)$

**أجوبة:1**  $D_f = \mathbb{R}$  لأنها دالة حدودية

(2) أ) دراسة رتبة الدالة  $f$  على المجال  $[0; +\infty[$ :

ليكن:  $x_1 \in [0; +\infty[$  و  $x_2 \in [0; +\infty[$  بحيث  $x_1 < x_2$

$$\text{اذن: } x_1^2 < x_2^2 \text{ ومنه } -\frac{1}{2}x_1^2 > -\frac{1}{2}x_2^2 \text{ أي } f(x_1) > f(x_2)$$

ومنه الدالة  $f$  تناقصية على  $[0; +\infty[$

(ب) دراسة رتبة الدالة  $f$  على المجال  $] -\infty; 0]$ :

ليكن:  $x_1 \in ] -\infty; 0]$  و  $x_2 \in ] -\infty; 0]$  بحيث  $x_1 < x_2$

$$\text{اذن: } x_1^2 > x_2^2 \text{ ومنه } -\frac{1}{2}x_1^2 < -\frac{1}{2}x_2^2 \text{ أي } f(x_1) < f(x_2)$$

ومنه الدالة  $f$  تزايدية على  $] -\infty; 0]$