

تمارين حول المستقيم في المستوى

تمرين 1

في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، نعتبر النقط $A(1; 2)$ و $B(-3; -1)$ و $C(3; -2)$ ، و متجهتين $\vec{u}(-2; 3)$ و $\vec{v}(4; 2)$.

1- أنشئ النقط A و B و C و المتجهتين \vec{u} و \vec{v}

2- حدد زوج إحداثي كل من $2\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{v}$ و \overrightarrow{AC} و \overrightarrow{AB}

3- حدد زوج إحداثي D حيث $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD}$

4- حدد زوج إحداثي I منتصف $[AB]$

تمرين 2

في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، نعتبر النقط $A\left(\frac{1}{2}; 3\right)$ و $B(-2; -2)$ و $C(1; 4)$ ، و متجهة $\vec{u}(1; 3)$

1- أنشئ النقط A و B و C و المتجهة \vec{u}

2- حدد x حيث $\vec{u} = (x - 2; 5)$ و $\vec{v}(x - 2; 5)$ مستقيمتان

3- بين أن النقط A و B و C مستقيمية

تمرين 3

في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، نعتبر النقط $A(-2; 1)$ و $C(1; 4)$ و متجهة

$\vec{u}(-2; 3)$

لتكن $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ تمثيلا بارامتريا لمستقيم (Δ)

1- أنشئ المستقيم (Δ) المار من A و الموجه بـ \vec{u} و المستقيم (Δ)

2- حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم (Δ)

3- حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم (AC)

تمرين 4

ليكن ABC مثلثا و I و J و K نقط حيث I منتصف $[BC]$ و J منتصف $[AC]$ و K منتصف $[AB]$

ننسب المستوى إلى معلم $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$

1- حدد إحداثيات النقط I و J و K

2- أدرس استقامية النقط I و J و K

3- حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم (IJ) ثم حدد معادلة ديكارتية له.

تمرين 5

في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، نعتبر النقطة $A(-2; 1)$ و $B(6; 4)$.

لتكن $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ معادلة ديكارتية لمستقيم (D) و تمثيل بارامترية لمستقيم (D')

(D')

1- حدد معادلة ديكارتية لمستقيم (Δ) مار من A و موجه بـ \vec{u}

2- حدد معادلة ديكارتية لمستقيم (D') . أنشئ الشكل.

3- بين أن (Δ) و (D) منفصلان

4- تأكد أن (D) و (D') يتقاطعان و حدد تقاطعهما

تمرين 6

في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$

$$\text{نعتبر النقطة } (\Delta) : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \text{ و } A(-2; 1)$$

1- حدد المعادلة المختزلة للمستقيم (D) المار من A و معامله الموجة $\frac{-1}{2}$.

2- حدد المعامل الموجة للمستقيم (Δ) ثم معادلته المختزلة

تمرين 7

في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$

$$\text{نعتبر } (D) \text{ معرف بارا متريا بـ } \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \text{ و } (D') \text{ مستقيم معرف بالمعادلة } 2x - 3y + 2 = 0$$

1- حدد معادلة ديكارتية للمستقيم (Δ) المار من $A(1; 2)$ و الموازي للمستقيم (D) .

2- حدد معادلة ديكارتية للمستقيم (D) .

3- بين أن (D) و (D') متتقاطعان و حدد تقاطعهما.

تمرين 8

في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، نعتبر النقطتين $A(-2; 1)$ و $B(2; 4)$ و $\vec{u}(5; 2)$

$$(D_m) : (m-1)x - 2my + 3 = 0 \quad (D) : 2x - 3y + 1 = 0$$

1- حدد معادلة ديكارتية للمستقيم (Δ) المار من A و الموجة بالتجهيز \vec{u} .

2- تأكد أن (D) و (Δ) متتقاطعان و حدد تقاطعهما.

3- أ- حدد m حيث $(D) \parallel (D_m)$

ب- حدد m حيث $(D) \perp (D_m)$

4- أ- أنشئ المستقيمات (D_2) ; (D_1) ; (D_0)

ب- بين أن جميع المستقيمات (D_m) تمر من النقطة $C\left(3; \frac{3}{2}\right)$

تمرين 9

نعتبر $C(0; 2)$; $B(6.7)$; $A(10; 3)$

1- حدد معادلة ديكارتية لكل متوسط للمثلث ABC

حدد زوج إحداثي G مركز ثقل ABC .

2- حدد معادلة واسط $[AB]$