

نعتبر  $f$  و  $g$  دالتي عدديتين لمتغير حقيقي حيث

- 1 - حدد مجموعة تعريف الدالة  $g$
- 2 - أعط جدول تغيرات لكل دالة من الدالتي  $f$  و  $g$
- 3 - أ) أنقل الجدول التالي و أتممه

$x$	-1	$\frac{-1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$	3
$f(x)$					
$g(x)$					

ب) حدد تقاطع  $C_f$  و محور الأفاسيل

ج) أنشئ المنحنيين  $C_f$  و  $C_g$  في نفس المعلم المتعامد الممنظم

الجواب


$$f(x) = x^2 - 2x \quad ; \quad g(x) = \frac{-2x-1}{-2x+1}$$

- 1 - حدد مجموعة تعريف الدالة  $g$


$$D_f = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\} \quad \text{إذن} \quad x \neq \frac{1}{2} \quad \text{ـ تكافئ} \quad -2x+1 \neq 0 \quad \text{ليكن} \quad x \in \mathbb{R}$$

- 2 - نعطي جدول تغيرات لكل دالة من الدالتي  $f$  و  $g$

$$\text{جدول تغيرات } f \quad \frac{-b}{2a} = 1 \quad a = 1$$



$$\text{جدول تغيرات } g \quad \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -4 \quad \text{لدينا}$$



- 3 - أ) نتمم الجدول

$x$	-1	$\frac{-1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$	3
$f(x)$	3	$\frac{5}{4}$	0	$\frac{5}{4}$	3
$g(x)$	$\frac{1}{3}$	0	-1	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{5}$

ب) حدد تقاطع  $C_f$  و محور الأفاسيل  
ليكن  $x \in \mathbb{R}$


$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \quad ou \quad x = 2$$

إذن  $C_f$  يقطع محور الأفاسيل في النقاطين ذات الأفاسيل 0 و 2 على التوالي

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

ج ) إنشاء المنحنيين  $C_f$  و  $C_g$  في نفس المعلم المتعامد الممنظم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$



## تمرين 2

لتكن  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفتين بـ

$$g(x) = x^2 - 3|x| \quad f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$$

وليكن  $C_f$  و  $C_g$  منحنيهما على التوالي في معلم متعامد ممنظم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- أ- حدد  $D_f$  -1

ب- أحسب  $g(4)$  و  $f\left(\frac{1}{2}\right)$  و  $g(2)$  و  $f(2)$

ج - أدرس زوجية  $g$  -3  
د - أعط جدول تغيرات  $f$

ب- بين أن  $g$  تناصصية على  $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right]$  و تزايدية على  $\left[0; \frac{3}{2}\right]$

د- أعط جدول تغيرات  $g$  على  $\mathbb{R}$

ج - حدد تقاطع  $C_g$  و محور الأفاسيل

5 - أ- أنشئ  $C_g$  و  $C_f$

ب- حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة  $f(x) = g(x)$

ج - حل مبيانيا المتراجحة  $x^2 - 3|x| \geq 0$

**الجواب**

$$g(x) = x^2 - 3|x| \quad f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$$

- أ- نحدد  $D_f$  -2

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

لتكن  $x \in \mathbb{R}$

$x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \in D_f$

تكافئ  $x \neq 1$

إذن  $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$

بـ نحسب  $f(2) \text{ و } g(2) \text{ و } f(4) \text{ و } g(4)$

$$g(4) = 16 - 12 = 4 \quad ; \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \quad ; \quad g(2) = 4 - 6 = -2 \quad ; \quad f(2) = \frac{4-1}{2-1} = 3$$

ـ نحدد تغيرات  $f$  -2

$$\text{لدينا } f \text{ تناقصية على كل من } ]-\infty; 1[ \text{ و } ]1; +\infty[ \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

جدول تغيرات  $f$

$x$	$-\infty$	$1$	$+\infty$
$f$			

ـ أـ ندرس زوجية  $g$  -3

لكل  $x \in \mathbb{R}$  لدينا  $x \in \mathbb{R}$

$$g(-x) = (-x)^2 - 3|-x| = x^2 - 3|x| = g(x)$$

ـ دالة زوجية  $g$

ـ بـ بين أن  $g$  تناقصية على  $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right]$  و تزايدية على  $\left[0; \frac{3}{2}\right]$

لدينا  $g(x) = x^2 - 3x$  لـ كل  $x$  من  $[0; +\infty[$

$$\frac{-b}{2a} = \frac{3}{2} \quad c = 0 \quad b = -3 \quad a = 1$$

معامل  $x^2$  هو العدد الموجب 1 و منه الدالة  $x^2 - 3x \rightarrow$  تزايدية و تناقصية على  $\left[-\infty; \frac{3}{2}\right]$

ـ اذن  $g$  تناقصية على  $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right]$  و تزايدية على  $\left[0; \frac{3}{2}\right]$

ـ دـ نعطي جدول تغيرات  $g$  على  $\mathbb{R}$

لدينا  $g$  تناقصية على  $\left[\frac{3}{2}; +\infty\right]$  و تزايدية على  $\left[0; \frac{3}{2}\right]$

ـ و حيث أن  $g$  زوجية فـ ان  $g$  تزايدية على  $\left[-\infty; -\frac{3}{2}\right]$  و تناقصية على  $\left[-\frac{3}{2}; 0\right]$

ـ جدول تغيرات  $g$

$x$	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$0$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$g$					

ـ 4ـ نحدد تقاطع  $C_g$  و محور الأفاصيل

ـ بما أن  $g$  زوجية فـ انه يكفي تحديد تقاطع  $C_g$  و محور الأفاصيل على  $\mathbb{R}^+$  و استنتاج التقاطع على  $\mathbb{R}^-$


$$x^2 - 3x = 0 \quad \text{تكافئ} \quad g(x) = 0 \quad : x \in \mathbb{R}^+$$

ـ تكافئ  $x = 0$  او  $x = 3$

# هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

إذن  $C_g$  و محور الأفاصيل يتقاطعان في النقط ذات الأفاصيل 0 و 3 و -3 على التوالي

5 - أ- ننشئ  $C_g$  و  $C_f$



ب- نحدد مبيانيا عدد حلول المعادلة  $f(x) = g(x)$

من خلال التمثيل المبيانى نلاحظ أن  $C_g$  و  $C_f$  يتقاطعان في ثلاثة نقاط

ومنه للمعادلة  $f(x) = g(x)$  ثلاثة حلول

ج - نحل مبيانيا المتراجحة  $x^2 - 3|x| \geq 0$

$x^2 - 3|x| \geq 0$  تكافئ  $g(x) \geq 0$  فوق محور الأفاصيل

من خلال التمثيل المبيانى يتضح أن  $C_g$  فوق محور الأفاصيل أو ينطبقان في  $\{0\} \cup [3; +\infty[ \cup ]-\infty; -3]$

إذن  $S = \{0\} \cup [3; +\infty[ \cup ]-\infty; -3]$

## تمرين 3

لتكن  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفتين بـ

$$g(x) = \frac{2|x|-1}{|x|-1} \quad f(x) = x^2 - x$$

وليكن  $C_f$  و  $C_g$  منحنيهما على التوالي في معلم متعمد منمنظم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

3 - أ- حدد  $D_g$

ب- أحسب  $f(2)$  و  $g(0)$  و  $g(2)$  و  $f\left(\frac{1}{2}\right)$

2 - أ- أعط جدول تغيرات  $f$

ب- حدد طبيعته المنحنى  $C_f$

3 - أ- بين أن  $g$  دالة زوجية

ب- حدد تغيرات  $g$  و أعط جدول تغيراتها

- أ- أنشئ  $C_g$  و  $C_f$  -4

ب- حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة  $f(x) = g(x)$

الجواب

$$g(x) = \frac{2|x|-1}{|x|-1} \quad f(x) = x^2 - x$$

- أ- نحدد  $D_g$  -4  
ليكن  $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} |x|-1 &\neq 0 \quad \text{تكافئ } x \in D_g \\ |x| &\neq 1 \quad \text{تكافئ} \\ x &\neq -1 \quad \text{و } x \neq 1 \quad \text{تكافئ} \\ D_g &= \mathbb{R} - \{1; -1\} \quad \text{إذن} \end{aligned}$$

ب- نحسب  $g\left(\frac{1}{2}\right)$  و  $g(0)$  و  $f\left(\frac{1}{2}\right)$  و  $g(2)$  و  $f(2)$

$$g(2) = \frac{2 \times 2 - 1}{2 - 1} = 3 \quad ; \quad f(2) = 2^2 - 2 = 4 - 2 = 2$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2 \times \frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2} - 1} = 0 \quad ; \quad g(0) = \frac{2 \times 0 - 1}{0 - 1} = 1 \quad ; \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{-1}{4}$$

- أ- نعطي جدول تغيرات  $f$

$$\frac{-b}{2a} = \frac{1}{2} \quad \text{و } a = 1 \quad \text{أي } f(x) = x^2 - x$$

ومنه جدول تغيرات  $f$

$x$	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f$		$\frac{-1}{4}$	

ب- حدد طبيعته المنحني  $C_f$

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{و محور تماثلة المستقيم ذا المعادلة } A\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right) \quad \text{شلجم رأسه } C_f$$

- أ- نبين أن  $g$  دالة زوجية  
لكل  $x \in \mathbb{R} - \{1; -1\}$  لدينا  $-x \in \mathbb{R} - \{1; -1\}$

$$g(-x) = \frac{2|-x|-1}{|-x|-1} = \frac{2|x|-1}{|x|-1} = g(x) \quad \text{ل يكن } \{x\}$$

إذن  $g$  دالة زوجية

ب- نحدد تغيرات  $g$  و نعطي جدول تغيراتها


$$g(x) = \frac{2x-1}{x-1} \quad \text{و منه } |x| = x \quad : \quad \text{لكل } x \text{ من } [0; 1[ \cup ]1; +\infty[$$

$$\text{و حيث } 0 \prec 1 \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \quad \text{فإن } g \text{ تناقصية على كل من } [0; 1[ \cup ]1; +\infty[$$

وبما أن  $g$  دالة زوجية فإن  $g$  تزايدية على كل من  $[-\infty; -1[$  و  $]1; +\infty[$

$x$	$-\infty$	$-1$	$0$	$1$	$+\infty$
$g$					

أ- ننشئ  $C_g$  و  $C_f$  بما أن  $g$  زوجية فان  $C_g$  متماثل بالنسبة لمحور الأرتب  $B$  جزء منحنى  $C_g$  على  $[0;1[ \cup ]1;+\infty[$  هو جزء من هذلول مرکزه  $(1;2)$  ومقارباه  $(\Delta_1) : y = 2$   $(\Delta_2) : x = 1$   $A\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$  شلجم رأسه  $C_f$



ب- نحدد مبيانيا عدد حلول المعادلة  $f(x) = g(x)$  من خلال التمثيل المبياني نلاحظ أن  $C_g$  و  $C_f$  يتقاطعان في أربع نقاط ومنه المعادلة  $f(x) = g(x)$  تقبل أربعة حلول

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma : تمارين حول الدوال

## تمرين 1

نعتبر  $f$  دالة عددية معرفة على  $\mathbb{R}$  بـ

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{2}x^2 & x \leq 2 \\ f(x) = \frac{4}{x} & x > 2 \end{cases}$$

-1- حدد  $D_f$  ثم أعط جدول تغيرات الدالة  $f$

-2- أنشئ  $(C_f)$  في مستوى منسوب إلى م.م.م  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

## تمرين 2

نعتبر  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين لمتغير حقيقي معرفتين بـ

-1- أعط جدول تغيرات كل من  $f$  و  $g$

-2- حدد تقاطع  $(C_g)$  و  $(C_f)$

-3- أنشئ  $(C_g)$  و  $(C_f)$  في نفس المستوى المنسوب إلى م.م.م  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

-4- حل مبيانيا المتراجحة  $f(x) \geq g(x)$

## تمرين 3

نعتبر  $f$  دالة عددية معرفة بـ

-1- حدد  $D_f$  و تأكد أن  $f$  دالة زوجية

-2- أنشئ  $(C_f)$

-3- أعط جدول تغيرات  $f$

## تمرين 4

نعتبر  $f$  دالة عددية معرفة بـ

-1- بين أن  $f$  دالة فردية

-2- حدد جدول تغيرات  $f$  على  $\mathbb{R}$

-3- أنشئ  $(C_f)$

## تمرين 5

نعتبر  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين لمتغير حقيقي معرفتين بـ

-1- حدد  $D_g$  و  $D_f$

-2- حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة  $2x^2 + x - 3 = 0$

ب- حدد تقاطع  $(C_g)$  و  $(C_f)$

-3- أنشئ  $(C_g)$  و  $(C_f)$  في نفس المعلم.م.م  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

-4- حل مبيانيا المتراجحة  $g(x) \geq 2x + 1$

## تمرين 6

نعتبر  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين لمتغير حقيقي معرفتين بـ

$$g(x) = 2x - 1 \quad f(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

-1- بين أن  $(C_f)$  شلجمـا محددا رأسه ثم أعط جدول تغيرات  $f$

-2- حدد تقاطع  $(C_f)$  و محور الأفاصيل

ب- حدد تقاطع  $(C_g)$  و  $(C_f)$

-3- أنشئ  $(C_g)$  و  $(C_f)$  في نفس المعلم.م.م  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

-4 حل مبيانا  $0 > f(x) - g(x)$

## تمرين 7

نعتبر  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين لمتغير حقيقي معرفتين بـ

$$g(x) = \frac{x+1}{x-3} \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$$

-1- اعط جدول تغيرات  $f$

ب- اعط جدول تغيرات  $g$

-2- أ- حدد تقاطع  $(C_g)$  و  $(C_f)$

ب- أنشئ  $(C_g)$  و  $(C_f)$

-3 حل مبيانا  $f(x) \geq g(x)$

## تمرين 8

لتكن  $f$  دالة عددية لمتغير حقيقي معرفة بـ

$$f(x) = \frac{2x-1}{-x+2}$$

-1- أ- حدد  $D_f$

$$f(x) = -2 - \frac{3}{x-2} \quad D_f$$

-2- بين أن  $(C_f)$  صورة المنحنى  $(C)$  ذو المعادلة  $y = \frac{-3}{x}$  بالإزاحة ذو المتوجه

$$g(x) = \frac{2|x|-1}{-|x|+2}$$

-3- نعتبر  $g$  دالة عددية لمتغير حقيقي معرفة بـ

أ- حدد  $D_g$  و بين أن  $g$  دالة زوجية

ب- أنشئ  $(C_g)$  في المعلم.م.م

## تمرين 9

نعتبر  $f$  دالة عددية معرفة على  $\mathbb{R}$  بـ

-1- أوجد  $a$  و  $b$  إذا علمت أن  $(C_f)$  تمر من النقاطين  $A(1;5)$  و  $B(-1;1)$  نضع  $a = b = 2$

$$\left] -\infty; -\frac{1}{2} \right] \cup \left[ -\frac{1}{2}; +\infty \right]$$

أ- أدرس رتابة  $f$  على

ب- أنشئ  $(C_f)$  في مستوى منسوب إلى م.م.م

ج- حدد تقاطع  $(C_f)$  و المستقيم  $(D)$ :  $y = 2x + 3$

ح- حل مبيانا  $f(x) \geq 2x + 3$

## تمرين 10

لتكن  $f$  دالة عددية لمتغير حقيقي معرفة بـ

-1- بين أن  $f$  دالة فردية

-2- أ- بين لكل عنصرين مختلفين  $x$  و  $y$  من  $[0; +\infty[$

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = x + y - 2$$

ب- أدرس رتابة  $f$  على كل من  $[0; 1[$  و  $1; +\infty[$

ثم أعط جدول تغيرات  $f$  على  $\mathbb{R}$

-3- أنشئ  $(C_f)$

-4- حدد مبيانا حسب قيم  $m$  عدد حلول المعادلة

## تمرين 11

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

نعتبر  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين لمتغير حقيقي معرفتين بـ

$$g(x) = \frac{x+2}{x-1} \quad f(x) = \frac{x-1}{x+2}$$

لتكن  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  نقطتين من مستوى منسوب إلى م.م.م  $\Omega_1$  و  $\Omega_2$

-1- أدرس تغيرات  $f$  و  $g$

-2- أ- حدد تقاطع  $(C_g)$  و  $(C_f)$

ب- أنشئ  $(C_g)$  و  $(C_f)$

-3- حل مبيانا  $f(x) \geq g(x)$

## تمرين 11

نعتبر  $f$  و  $g$  الدالتين العدديتين لمتغير حقيقي معرفتين بـ

$$g(x) = x^2 - 1 \quad f(x) = \frac{2x}{x-1}$$

$(O; \vec{i}; \vec{j})$  منحنيان  $f$  و  $g$  في م.م.م

-1- أ- حدد  $D_f$

$$f(x) = 2 + \frac{2}{x-1} \quad D_f$$

-2- بين أن  $(C_f)$  صورة المنحنى  $(C)$  ذا المعادلة  $y = \frac{2}{x}$  بالإزاحة ذا المتوجه  $\vec{u}(1; 2)$

-3- أنشئ  $(C_g)$  و  $(C_f)$

-4- حدد مبيانا عدد حلول المعادلة  $x^3 - x^2 - 3x + 1 = 0$

## تمرين 12

لتكن  $f$  دالة عددية لمتغير حقيقي معرفة بـ

$(O; \vec{i}; \vec{j})$  منحنى  $f$  في م.م.م

-1- بين أن  $f$  زوجية

-2- أ- لتكن  $x$  و  $y$  من  $\mathbb{R}^+$  حيث  $y \neq x$ . أحسب معدل تغير الدالة  $f$  بين  $x$  و  $y$

-3- أدرس رتابة  $f$  على كل من  $[0; 3]$  و  $[3; +\infty)$  وأعط جدول تغيرات  $f$  على  $\mathbb{R}$

-3- أنشئ  $(C_f)$