


## الحساب المثلثي - الجزء 2

الدورة الثانية	الدرس الأول	القدرات المنتظرة التمكن من تمثيل وقراءة حلول معادلة أو متراجحة مثلثية على الدائرة المثلثية
عدد الساعات: 15		



### I- المعادلات المثلثية

#### 1- المعادلة

$$x \in \mathbb{R} \quad \cos x = \frac{1}{2} \quad \text{حل مثال 1}$$

لدينا المستقيم  $\Delta$ :  $x = \frac{1}{2}$  يقطع الدائرة المثلثية في نقطتين  $M$  و  $'M$  أقصوليهما المنحنيين الرئيسيين على التوالي هما  $\frac{\pi}{3}$  و  $-\frac{\pi}{3}$ .

بما أن  $\pi + 2k\pi$  حيث  $k \in \mathbb{Z}$  هي الأفاسيل المنحنية للنقطة  $M$  و  $\pi + 2k\pi$  حيث  $k \in \mathbb{Z}$  هي الأفاسيل المنحنية للنقطة  $'M$

$$k \in \mathbb{Z} \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{حيث } \cos x = \frac{1}{2} \quad \text{إذن نستنتج أن}$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \quad \text{إذن}$$

$$x \in [-2\pi; 2\pi] \quad \cos x = \frac{1}{2} \quad \text{حل مثال 2}$$

نتبع نفس الخطوات السابقة فنحصل على

$$k \in \mathbb{Z} \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{حيث } \cos x = \frac{1}{2}$$

وحيث أننا نحل المعادلة في المجال  $[-2\pi; 2\pi]$

$$-2\pi \leq -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 2\pi \quad \text{أو} \quad -2\pi \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 2\pi$$

$$k = 0 \quad k = -1 \quad \text{أو} \quad -\frac{7}{6} \leq k \leq \frac{5}{6} \quad \text{نكافئ} \quad -2\pi \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 2\pi \quad \text{لدينا}$$

$$x = -\frac{5\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ومنه}$$

$$k = 0 \quad k = 1 \quad \text{نكافئ} \quad -\frac{5}{6} \leq k \leq \frac{7}{6} \quad \text{لدينا} \quad -2\pi \leq -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 2\pi$$

$$x = \frac{5\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = -\frac{\pi}{3} \quad \text{ومنه}$$

$$S = \left\{ -\frac{5\pi}{3}; -\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\} \quad \text{إذن}$$

\* المعادلة  $\cos x = a$  لا تقبل حلا إذا كان  $a < -1$  **خلاصة**

$k \in \mathbb{Z} / x = 2k\pi$  إذا وفقط إذا كان  $x \in \mathbb{R}$   $\cos x = 1$  \*

$k \in \mathbb{Z} / x = \pi + 2k\pi$  إذا وفقط إذا كان  $x \in \mathbb{R}$   $\cos x = -1$  \*

$\cos x = a$  إذا كان  $-1 < a < 1$  فإن يوجد عنصر  $\alpha$  من  $[0; \pi]$  حيث \*

و بالتالي حلول المعادلة  $\cos x = a$  في  $\mathbb{R}$  هي  $x = \alpha + 2k\pi$  أو  $x = -\alpha + 2k\pi$  حيث

$$S = \left\{ \alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

**تمرين حل المعادلات**

$$x \in \mathbb{R} \quad \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos(2x) \quad x \in ]-\pi; 3\pi] \quad \cos\left(2x - \frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x \in [\pi; 2\pi[ \quad 2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$$

**الحل**

$$x \in \mathbb{R} \quad \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos(2x) \quad * \text{ نحل}$$

$k \in \mathbb{Z}$  حيث  $2x = -x - \frac{\pi}{3} + 2k\pi$  أو  $2x = x + \frac{\pi}{3} + 2k\pi$  تكافئ  $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos(2x)$

$k \in \mathbb{Z}$  حيث  $3x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$  أو  $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$  تكافئ

$k \in \mathbb{Z}$  حيث  $x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi$  أو  $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$  تكافئ

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \quad \text{إذن}$$

$$x \in ]-\pi; 3\pi] \quad \cos\left(2x - \frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad * \text{ نحل}$$

$\cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  ومنه  $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$  نعلم أن

$k \in \mathbb{Z}$  حيث  $2x - \frac{3\pi}{4} = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$  أو  $2x - \frac{3\pi}{4} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$  تكافئ  $\cos\left(2x - \frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  وبالتالي

$k \in \mathbb{Z}$  حيث  $2x = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi$  أو  $2x = \frac{19\pi}{12} + 2k\pi$  تكافئ

$k \in \mathbb{Z}$  حيث  $x = -\frac{\pi}{24} + k\pi$  أو  $x = \frac{19\pi}{24} + k\pi$  تكافئ

و حيث  $x \in ]-\pi; 3\pi]$  فإن

$$-1 < \frac{19}{24} + k \leq 3 \quad \text{أي} \quad -\pi < \frac{19\pi}{24} + k\pi \leq 3\pi \quad x = \frac{19\pi}{24} + k\pi \quad \text{من أجل}$$

$$-\frac{43}{24} < k \leq \frac{53}{24} \quad \text{و منه}$$

و حيث  $K = 2$  فإن  $k = 1$  أو  $k = 0$  أو  $k = -1$   $k \in \mathbb{Z}$

$$x = \frac{19\pi}{24} + 2\pi = \frac{67\pi}{24} \quad \text{أو} \quad x = \frac{19\pi}{24} + \pi = \frac{43\pi}{24} \quad \text{أو} \quad x = \frac{19\pi}{24} - \pi = -\frac{5\pi}{24} \quad \text{إذن}$$

$$-1 < -\frac{1}{24} + k \leq 3 \quad \text{أي} \quad -\pi < -\frac{\pi}{24} + k\pi \leq 3\pi \quad x = -\frac{\pi}{24} + k\pi \quad \text{من أجل}$$

$$-\frac{23}{24} < k \leq \frac{73}{24} \quad \text{و منه}$$

و حيث  $K = 2$  فإن  $k = 0$  أو  $k = 1$  أو  $k = 2$   $k \in \mathbb{Z}$

$$x = -\frac{\pi}{24} + 3\pi = \frac{71\pi}{24} \quad \text{أو} \quad x = -\frac{\pi}{24} + 2\pi = \frac{47\pi}{24} \quad \text{أو} \quad x = -\frac{\pi}{24} + \pi = \frac{23\pi}{24} \quad \text{أو} \quad x = -\frac{\pi}{24} + 0 \cdot \pi = -\frac{\pi}{24} \quad \text{إذن}$$

$$S = \left\{ -\frac{5\pi}{24}, -\frac{\pi}{24}, \frac{19\pi}{24}, \frac{23\pi}{24}, \frac{43\pi}{24}, \frac{47\pi}{24}, \frac{67\pi}{24}, \frac{71\pi}{24} \right\} \quad \text{إذن}$$

$$x \in [\pi; 2\pi[ \quad 2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0 \quad * \text{ نحل}$$

$$2X^2 + 3X + 1 = 0 \quad \text{المعادلة تصبح} \quad \cos x = X \quad \text{نضع} \\ \Delta \text{ مميز المعادلة} \quad \text{ليكن}$$

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1$$

$$X = \frac{-3-1}{4} = -1 \quad \text{أو} \quad X = \frac{-3+1}{4} = -\frac{1}{2} \quad \text{ومنه}$$

$$\cos x = -1 \quad \text{أو} \quad \cos x = -\frac{1}{2}$$

لدينا  $\cos x = -1$  تكافئ  $x = \pi + 2k\pi$

وحيث  $x \in [\pi; 2\pi]$  فان  $0 \leq k < \frac{1}{2}$  أي  $\pi \leq x < 2\pi$  ومنه  $k = 0$  اذن

$$\cos x = \cos \frac{2\pi}{3} \quad \text{أي} \quad \cos x = -\frac{1}{2}$$

$$x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{أو} \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$$

وحيث  $x \in [\pi; 2\pi]$  فان

$$k = 1 \quad \frac{5}{6} \leq k < \frac{4}{3} \quad \text{أي} \quad \pi \leq -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi < 2\pi \quad \text{لدينا} \quad x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{4\pi}{3} \quad \text{إذن}$$

من أجل  $\frac{1}{6} \leq k < \frac{2}{3}$  أي  $\pi \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi < 2\pi$  لدينا  $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$  لا يوجد عدد صحيح نسبي

يحقق المتفاوتة الأخيرة

$$S = \left\{ \pi; \frac{4\pi}{3} \right\} \quad \text{إذن}$$

## 2- المعادلة

$$x \in \mathbb{R} \quad \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{حل 1 مثال}$$

لدينا المستقيم  $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$  يقطع الدائرة المثلثية

في نقطتين  $M$  و  $M'$  أقصوليهما المنحنيين الرئيسيين على التوالي هما  $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$  و  $\frac{\pi}{3}$

بما أن  $\pi + 2k\pi$  هي الأفاسيل المنحنية

للنقطة  $M$  و  $M'$  حيث  $k \in \mathbb{Z}$  هي الأفاسيل

المنحنية للنقطة  $M'$  فإننا نستنتج أن

$$k \in \mathbb{Z} \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \quad \text{إذن}$$

$$x \in [-2\pi; 3\pi] \quad \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{حل 2 مثال}$$

نتبع نفس الخطوات السابقة فنحصل على

$$k \in \mathbb{Z} \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

وحيث أننا نحل المعادلة في المجال  $[-2\pi; 3\pi]$

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

$$-2\pi \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq 3\pi \quad \text{أو} \quad -2\pi \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 3\pi \quad \text{فإن}$$

$$-\frac{7}{6} \leq k \leq \frac{8}{6} \quad \text{تكافئ} \quad -2\pi \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 3\pi \quad \text{لدينا}$$

$$k = 1 \quad \text{أو} \quad k = 0 \quad \text{أو} \quad k = -1 \quad \text{تكافئ}$$

$$x = -\frac{5\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{7\pi}{3} \quad \text{ومنه}$$

$$-\frac{8}{6} \leq k \leq \frac{7}{6} \quad \text{تكافئ} \quad -2\pi \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq 3\pi \quad \text{لدينا} \quad \text{لدينا}$$

$$k = 1 \quad \text{أو} \quad k = 0 \quad \text{أو} \quad k = -1 \quad \text{تكافئ}$$

$$x = -\frac{4\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{2\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{8\pi}{3} \quad \text{ومنه}$$

$$S = \left\{ \frac{-5\pi}{3}, \frac{-4\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{8\pi}{3} \right\} \quad \text{إذن}$$

**خلاصة** المعادلة  $a < -1 \vee a > 1$  لا تقبل حلًا إذا كان  $\sin x = a$

$$k \in \mathbb{Z} / \quad x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \quad \sin x = 1$$

$$k \in \mathbb{Z} / \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \quad \sin x = -1$$

إذا كان  $1 < a < -1$  فان يوجد عنصر  $\alpha$  من  $\left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right]$  حيث

حلول المعادلة  $x = \pi - \alpha + 2k\pi$  في  $\mathbb{R}$  هي  $\sin x = a$  حيث  $k \in \mathbb{Z}$

مجموعة حلول المعادلة  $S = \{\alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\pi - \alpha + 2k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$

**تمرين** حل المعادلات  $x \in \mathbb{R}$   $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos(3x)$

$$x \in ]-\pi; 2\pi] \quad \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2}$$

**الحل**

$$x \in \mathbb{R} \quad \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos(3x) \quad \text{نحل}$$

$$\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) \quad \text{تكافئ} \quad \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos(3x)$$

$$k \in \mathbb{Z} \quad 2x + \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{2} + 3x + 2k\pi \quad \text{أو} \quad 2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} - 3x + 2k\pi$$

$$k \in \mathbb{Z} \quad -x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{أو} \quad 5x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{تكافئ}$$

$$k \in \mathbb{Z} \quad x = -\frac{\pi}{6} + 2(-k)\pi \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{30} + \frac{2}{5}k\pi \quad \text{تكافئ}$$

$$S = \left\{ \frac{\pi}{30} + \frac{2}{5}k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{6} + 2(-k)\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \quad \text{إذن}$$

$$x \in ]-\pi; 2\pi] \quad \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2} \quad \text{نحل}$$

$$\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \quad \text{تكافئ} \quad \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$k \in \mathbb{Z} \quad 2x - \frac{\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{أو} \quad 2x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{تكافئ}$$

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

$$k \in \mathbb{Z} \text{ حيث } 2x = \frac{17\pi}{12} + 2k\pi \text{ أو } 2x = \frac{\pi}{12} + 2k\pi \text{ تكافئ}$$

$$k \in \mathbb{Z} \text{ حيث } x = \frac{17\pi}{24} + k\pi \text{ أو } x = \frac{\pi}{24} + k\pi \text{ تكافئ}$$

و حيث أن  $x \in ]-\pi; 2\pi]$  فان

$$k=1 \text{ أو } k=0 \text{ أو } k=-1 \text{ و منه } -\frac{25}{24} < k \leq \frac{47}{24} \text{ أي } -\pi < \frac{\pi}{24} + k\pi \leq 2\pi \text{ لدينا } x = \frac{\pi}{24} + k\pi \text{ من أجل}$$


$$x = \frac{\pi}{24} + \pi = \frac{25\pi}{24} \text{ أو } x = \frac{\pi}{24} \text{ أو } x = \frac{\pi}{24} - \pi = -\frac{23\pi}{24} \text{ إذن}$$

$$k=1 \text{ أو } k=0 \text{ أو } k=-1 \text{ و منه } -\frac{41}{24} < k \leq \frac{31}{24} \text{ ومنه } -\pi < \frac{17\pi}{24} + k\pi \leq 2\pi \text{ من أجل لدينا}$$

$$x = \frac{17\pi}{24} + \pi = \frac{41\pi}{24} \text{ أو } x = \frac{17\pi}{24} \text{ أو } x = \frac{17\pi}{24} - \pi = -\frac{7\pi}{24} \text{ إذن}$$

$$S = \left\{ -\frac{23\pi}{24}, -\frac{7\pi}{24}, \frac{\pi}{24}, \frac{17\pi}{24}, \frac{25\pi}{24}, \frac{41\pi}{24} \right\} \text{ ومنه}$$

$\Delta$



### -3- المعادلة

حل المعادلة  $\tan x = a$

نعتبر  $\Delta$  المماس الدائرة المثلثية ( $C$ ) في أصلها  $I$  ،  
نأخذ النقطة  $T$  من  $\Delta$  حيث  $\Delta$  أقصول  $T$  في المحور  $\Delta$

المستقيم ( $OT$ ) يقطع الدائرة المثلثية ( $C$ )

$$\tan(-\frac{\pi}{4}) = -1 \text{ نعلم أن } M \text{ و } M' \text{ نعثر على }$$

و بالتالي  $-\frac{\pi}{4}$  - أقصول منحني للنقطة  $M$

$$x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \text{ لـ } \tan(x + k\pi) = \tan x \text{ وبما أن}$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \text{ فإن حلول المعادلة هي}$$

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\} \text{ إذن}$$

**خاصة**

$$\boxed{\left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right] \text{ في حل للمعادلة } \tan x = a \text{ حيث } \alpha \text{ حل للمعادلة } \tan x = a \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi / k \in \mathbb{Z}}$$

تمرين حل المعادلتين

$$x \in [0; 3\pi] \quad \tan 2x = \sqrt{3}$$


$$x \in \mathbb{R} \quad \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -\tan x$$

## II- المراجحات المثلثية مثال 1

$$x \in ]-\pi; \pi] \quad \cos x \geq \frac{1}{2} \text{ حل}$$

$$x \in ]-\pi; \pi] \quad \cos x = \frac{1}{2} \text{ نحل أولاً المعادلة}$$

باتباع خطوات حل المعادلات نحصل على




$$x = -\frac{\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} \quad \text{تكافئ} \quad x \in [-\pi; \pi] \quad \cos x = \frac{1}{2}$$

لتكن  $M\left(-\frac{\pi}{3}\right)$  و  $M'\left(\frac{\pi}{3}\right)$  نقطتين من الدائرة المثلثية

مجموعة حلول المتراجحة هي مجموعة الأفاسيل  $\widehat{M'MI}$  في  $[-\pi; \pi]$  التي تنتمي إلى القوس  $(C)$

$$S = \left[ \frac{-\pi}{3}; \frac{\pi}{3} \right] \quad \text{وهذه المجموعة هي}$$



$$x \in [0; 3\pi] \quad \cos x \geq \frac{1}{2} \quad \text{مثال 2 حل}$$

$$x \in [0; 3\pi] \quad \cos x = \frac{1}{2} \quad \text{نحل أولاً المعادلة}$$

$$x = \frac{5\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{7\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} \quad \text{تكافئ} \quad x \in [0; 3\pi] \quad \cos x = \frac{1}{2}$$

$\frac{7\pi}{3}$  و  $\frac{\pi}{3}$  أقصولين منحنيين لنفس النقطة  $M$  ،

نعتبر  $\frac{5\pi}{3}$  أقصول منحني لنقطة  $M'$

مجموعة حلول المتراجحة هي مجموعة الأفاسيل المنحنية لنقطة  $(C)$

التي تنتمي إلى القوس  $\widehat{M'MI}$

$$S = \left[ 0; \frac{\pi}{3} \right] \cup \left[ \frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3} \right] \quad \text{وهذه المجموعة هي}$$

مثال 3


$$x \in [0; 2\pi] \quad \tan x \geq \sqrt{3} \quad \text{حل}$$

$$x \in [0; 2\pi] \quad \tan x = \sqrt{3} \quad \text{نحل المعادلة}$$

$$x = \frac{4\pi}{3} \quad \text{أو} \quad x = \frac{\pi}{3} \quad \text{تكافئ} \quad x \in [0; 2\pi] \quad \tan x = \sqrt{3}$$

نعتبر  $\frac{\pi}{3}$  أقصول منحني لنقطة  $A$

و  $\frac{4\pi}{3}$  أقصول منحني لنقطة  $B$



مجموعة حلول المتراجحة هي مجموعة الأفاسيل المنحنية للنقطة  $(C)$  التي تنتمي إلى اتحاد القوسين  $\widehat{BJ}$  و  $\widehat{AJ}$  في  $[0; 2\pi]$

$$S = \left[ \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[ \frac{4\pi}{3}; \frac{3\pi}{2} \right] \quad \text{وهذه المجموعة هي}$$

تمرين

$$x \in [-\pi; \pi] \quad \sin x > \frac{-1}{2} \quad \text{حل}$$

$$x \in [0; 4\pi] \quad \sin x > \frac{-1}{2}$$

$$x \in [0; 2\pi] \quad \tan x < 1$$

$$x \in [-\pi; \pi] \quad \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{1}{2}$$

$$x \in [0; \pi] \quad \tan 3x > \sqrt{3}$$

$$x \in ]-\pi; \pi] \quad 4\cos^2 x - 2(1 + \sqrt{2})\cos x + \sqrt{2} \leq 0$$

$$x \in ]-\pi; \pi] \quad \frac{1 + \tan x}{\sin 2x} \geq 0$$

## III- الزوايا المحيطية – الرباعيات الدائرية

### 1- تعريف

- **الزاوية المركزية**: هي زاوية رأسها مركز الدائرة
- **الزاوية المحيطية**: هي زاوية ينتمي رأسها للدائرة وتحصر بين ضلعيها قوساً من هذه الدائرة

## 2- خصائص نشاط 1

لتكن  $(C)$  دائرة مركزها  $O$  نعتبر  $A$  و  $B$  نقطتين مختلفتين من  $(C)$  غير متقابلتين قطرياً

و  $M$  نقطة من  $(C)$  بحيث  $\widehat{AMB}$  و  $\widehat{AOB}$  تحصران نفس القوس  $[\widehat{AB}]$


1- بين أن  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$  في الحالات التالية

أ/ و  $O$  و  $M$  و  $A$  مستقيمية

ب/ و  $O$  و  $M$  و  $A$  غير مستقيمية

يمكن اعتبار نقطة  $N$  من  $(C)$  حيث  $N$  و  $O$  و  $M$  مستقيمية  
وابستعمال أ/ مرتين بين المطلوب

2- نعتبر  $(AT)$  المماس للدائرة  $(C)$ . الزاوية  $\widehat{BAT}$  محيطية تحصر نفس القوس التي تحصره الالزاوية



المركزية  $\widehat{AOB}$

بين أن  $\widehat{AOB} = 2\widehat{TAB}$

الحل

أ/ و  $O$  و  $M$  و  $A$  مستقيمية

المثلث  $OBM$  متساوي الساقين في الرأس  $O$

ومنه  $\widehat{BOM} = \pi - 2\widehat{BMO}$

و حيث  $\widehat{BOM} = \pi - \widehat{AOB}$  لأن  $O$  و  $M$  و  $A$  مستقيمية

فإن  $\widehat{AOB} = 2\widehat{BMO}$

اذن  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$

ب/ و  $O$  و  $M$  و  $A$  غير مستقيمية

من  $(C)$  حيث  $N$  و  $O$  و  $M$  مستقيمية

حسب أ/ لدينا  $\widehat{NOB} = 2\widehat{NMB}$


لدينا  $OAM$  مثلث متساوي الساقين في الرأس  $O$


و منه  $\widehat{AOM} = \pi - 2\widehat{AMO}$

لدينا  $\widehat{AOB} = \pi - (\widehat{NOB} + \widehat{AOM})$

و منه  $\widehat{AOB} = \pi - (2\widehat{NMB} + \pi - 2\widehat{AMO})$

$\widehat{AOB} = 2(\widehat{AMO} - \widehat{NMB})$





إذن  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$

/2 بين أن  $\widehat{AOB} = 2\widehat{TAB}$

$\widehat{OAB} = \frac{\pi}{2} - \widehat{BAT}$  ومنه (AT) المماس للدائرة (C) ومنه

لدينا  $\widehat{OAB}$  متساوي الساقين في الرأس O

ومنه  $\widehat{OAB} = \pi - 2\widehat{OAB}$

و بالتالي  $\widehat{OAB} = \pi - 2\left(\frac{\pi}{2} - \widehat{BAT}\right)$

إذن  $\widehat{AOB} = 2\widehat{TAB}$

## خاصية 1

قياس زاوية مركزية في دائرة هو ضعف قياس زاوية محيطية تحصر نفس القوس التي تحصره هذه الزاوية المركزية

## نشاط 2

لتكن A و B و C و D نقاط مختلفة من دائرة (C) مركزها O

بين أن  $\widehat{ABC} = \widehat{ADC}$  أو  $\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = \pi$

## خاصية 2

A و B و C ثلات نقاط من دائرة (C) و D نقطة مختلفة من المستوى

تكون D من الدائرة (C) إذا و فقط إذا كان  $\widehat{ABC} = \widehat{ADC}$  أو  $\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = \pi$

## 3- علاقات الجيب في مثلث

### نشاط 3

ليكن ABC مثلثا و R شعاع الدائرة المحاطة بالمثلث

$\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = \frac{AC}{\sin \widehat{B}} = \frac{AB}{\sin \widehat{C}} = 2R$  في الحالات التالية

أ/ قائم الزاوية في A

ب/ جميع زوايا المثلث ABC حادة

ج/ إحدى زوايا المثلث ABC منفرجة

## الجواب

أ/ قائم الزاوية في A

$\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = BC = 2R$  ومنه  $\sin \widehat{A} = \sin \frac{\pi}{2} = 1$

$\frac{AC}{\sin \widehat{B}} = 2R$  ومنه  $\sin \widehat{B} = \frac{AC}{BC} = \frac{BC}{2R}$

$\frac{AB}{\sin \widehat{C}} = 2R$  ومنه  $\sin \widehat{C} = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{2R}$

إذن  $\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = \frac{AC}{\sin \widehat{B}} = \frac{AB}{\sin \widehat{C}} = 2R$



ب/ جميع زوايا المثلث ABC حادة

نعتبر D نقطة مقابلة قطريا مع C

قائم الزاوية في B

لدينا  $\widehat{D} \equiv \widehat{A}$  زاويتان محطيتين تحصران نفس القوس

$\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = 2R$  إذن  $\frac{BC}{\sin \widehat{D}} = 2R$  ومنه  $\sin \widehat{D} = \frac{BC}{DC} = \frac{BC}{2R}$



لدينا قائم الزاوية في  $A$

زاویتان محیطیتان تحصران نفس القوس  $\widehat{CDA} \equiv \widehat{B}$

$$\frac{AC}{\sin \widehat{B}} = 2R \quad \text{إذن} \quad \sin \widehat{B} = \frac{AC}{2R} \quad \text{ومنه} \quad \sin \widehat{CDA} = \frac{AC}{DC} = \frac{AC}{2R}$$

بالمثل تعتبر نقطة مقابلة قطریا مع  $A$  و نبین  $R$  بالمثل

$$\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = \frac{AC}{\sin \widehat{B}} = \frac{AB}{\sin \widehat{C}} = 2R \quad \text{إذن}$$

ج/ إحدى زوايا المثلث  $ABC$  منفرجة  
لنفترض أن  $\widehat{A}$  منفرجة

نعتبر  $D$  نقطة مقابلة قطریا مع  $C$

$$\sin \widehat{D} = \sin \widehat{A} \quad \text{و} \quad \widehat{D} \text{ متكاملتان ومن} \quad \widehat{A}$$

$$\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = 2R \quad \text{إذن} \quad \frac{BC}{\sin \widehat{D}} = 2R \quad \text{ومنه} \quad \sin \widehat{D} = \frac{BC}{DC} = \frac{BC}{2R}$$

الزواویتان  $\widehat{B}$  و  $\widehat{C}$  حادتان

$$\frac{AC}{\sin \widehat{B}} = 2R \quad \text{و} \quad \frac{AB}{\sin \widehat{C}} = 2R \quad \text{حسب ب/ نحصل على}$$

$$\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = \frac{AC}{\sin \widehat{B}} = \frac{AB}{\sin \widehat{C}} = 2R \quad \text{إذن}$$

### خاصية

ليكن  $ABC$  مثلثا و  $R$  شعاع الدائرة المحیطة به

$$\frac{BC}{\sin \widehat{A}} = \frac{AC}{\sin \widehat{B}} = \frac{AB}{\sin \widehat{C}} = 2R$$

## 4- علاقات في المثلث (المساحة - المحیط) نشاط

ليكن  $ABC$  مثلثا و  $H$  المسقط العمودی لـ  $A$  على  $(BC)$  و  $S$  مساحته

$$1- \text{ بين أن } S = \frac{1}{2} (BC \times AC \times \sin \widehat{C})$$

2- ليكن  $r$  شعاع الدائرة المحاطة بالمثلث  $ABC$  و  $O$  مركزها  
أ/ أحسب مساحة  $AOC$  بدلالة  $r$  و  $AC$

$$\text{ب/ بين أن } S = \frac{1}{2} p \times r \quad \text{حيث } p \text{ محیط المثلث } ABC$$

### خاصية

ليكن  $ABC$  مثلثا و  $r$  شعاع الدائرة المحاطة به و  $S$  مساحته  $p$  محیطه

$$S = \frac{1}{2} (BC \times AC \times \sin \widehat{C})$$

$$S = \frac{1}{2} p \times r$$