

## التجاذب الكوني La gravitation universelle


### I - قوى التجاذب الكوني

لقد استنتج **نيوتن Newton** أن حركة الكواكب ترجع إلى وجود تأثيرات بينية سماها **قانون التجاذب الكوني**، الذي يعتبر قاعدة أساساً للميكانيك الكلاسيكية.

تجاذب الأجسام بسبب كتلها فيطبق بعضها على بعض قوى تأثير تجاذبي.

#### 1 - قانون نيوتن للتجاذب الكوني

جسمان نقطيان A و B كتلتهما على التوالي  $m_A$  و  $m_B$  و تفصل بينهما المسافة  $d = AB$  يطبق أحدهما على الآخر قوى التجاذب عن بعد تسمى **قوة التجاذب الكوني**.



للقوتين: \*

\* نفس خط التأثير؛

\* من حيث متعاكسان؛

\* نفس الشدة:

$$F_{A/B} = F_{B/A} = F = G \cdot \frac{m_A \cdot m_B}{d^2}$$

$G$  : ثابتة التجاذب الكوني قيمتها:  $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.Kg}^{-2} \cdot \text{m}^2$

#### 2 - قوياً التأثير البيني الجاذبي لجسمين غير نقطيين

نعتبر جسمين A و B لهما توزيع كروي لكتلة في تأثير بيني تجاذبي، الشدة المشتركة  $F$  لقوى التجاذب الكوني هي:


$$F = G \cdot \frac{m_A \cdot m_B}{d^2}$$

#### 3 - القوة المطبقة من طرف الأرض على جسم نقطي

نعتبر جسماً نقطياً A كتلته  $m$  يوجد على ارتفاع  $h$  من سطح الأرض، نعبر عن الشدة المشتركة لقوة التجاذب الكوني بالعلاقة:

$$F = G \cdot \frac{M_T \cdot m}{(R_T + h)^2}$$

حيث:  $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$  شعاع الأرض و  $R_T = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$  كتلتها.



#### تطبيق:

تمثل كتلة القمر  $M_L$   $\frac{1}{83}$  من كتلة الأرض  $M_T$  ، وتتغير المسافة بينهما بين القيمتين 356375Km و 406720Km .

احسب شدة قوة التجاذب الكوني للأرض المطبقة على القمر في الحالتين:

أ - اعتبار أصغر مسافة بين الأرض والقمر

ب - اعتبار أكبر مسافة بينهما.

نعطي:  $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ SI}$  و  $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ Km}$

#### 4 - وزن الجسم: Poids d'un corps

يُخضع جسم S كتلته  $m$  موجود على سطح الأرض لقوة التجاذب الكوني  $\vec{F}$  المسلطة من طرف الأرض، وبتطبيق قانون نيوتن للتجاذب الكوني فإن شدة هذه القوة هي:

$$F = m \cdot \frac{G \cdot M_T}{R_T^2} \quad (2) \quad \text{أو} \quad F = G \cdot \frac{M_T \cdot m}{R_T^2} \quad (1)$$

نحسب:  $\frac{G.M_T}{R_T^2} = 9,81 N.Kg^{-1}$  فجده:  $\frac{G.M_T}{R_T^2}$   
 يسمى المقدار  $\frac{G.M_T}{R_T^2}$  شدة الثقالة على سطح الأرض ونرمز له بـ  $g_0$  وحدته  $N.Kg^{-1}$ .  
 تصبح العلاقة (2) :  $F = m.g_0$

تطابق  $\vec{F}$  وزن الجسم  $\vec{P} = m.\vec{g}_0$  فنكتب:

تعبر شدة الثقالة  $g$  عن ارتفاع  $h$  من سطح الأرض:  
 تقص  $g$  حسب الارتفاع (أي كلما ابتعدنا عن سطح الأرض) وهكذا يمكن إعطاء علاقة تقريبية ناتجة عن قانون نيوتن للتجاذب الكوني:

$$g = g_0 \cdot \frac{R^2}{(R_T + h)^2}$$

عندما تكون  $h = 0$  فإن:  $g = g_0 = 9,8 N.Kg^{-1}$

$G_0$  : شدة الثقالة عند سطح الأرض ( $h = 0$ )

$R_T$  : شعاع الأرض

$G$  : شدة الثقالة عند الارتفاع  $h$ .

تتغير قيمة شدة الثقالة  $g$  مع خط العرض والعلو:

## II - سلم المسافات في الكون والذرة

وحدة المسافات في النظام العالمي للوحدات المتر  $m$

نسمي العدد  $10^n$  رتبة قدر الكمية المعنية

1 - مضاعفات المتر:

✓ الكيلومتر :  $1Km = 10^3 m$

✓ الميكامتر :  $1Mm = 10^6 m$

✓ الجيغامتر :  $1Gm = 10^9 m$

✓ التيرامتر :  $1Tm = 10^{12} m$

- شعاع الأرض:  $R = 6378 Km = 6,378 \cdot 10^6 m$

- المسافة بين الأرض والقمر:  $D = 3,84 \cdot 10^5 Km = 3,84 \cdot 10^8 m$

مثال:

بصفة عامة: نكتب قيمة كمية ما على شكل  $a \cdot 10^n$  باعتبار  $a \leq 1$ , بحيث  $10^n$  رتبة قدر الكمية المعنية.

2 - أجزاء المتر

✓ المليمتر :  $1mm = 10^{-3} m$

✓ الميكرومتر :  $1\mu m = 10^{-6} m$

✓ النانومتر :  $1nm = 10^{-9} m$

✓ البيكومتر :  $1pm = 10^{-12} m$

نستعمل سلماً مُدرج بالأس عشرة لترتيب المسافات في الكون والذرة بنفس الوحدة :

