

## Le mouvement الحركة

### (I) نسبية الحركة relativity du mouvement

#### 1 - نشاط

نعتبر ثلاثة أشخاص ، الشخص 1 والشخص 2 في إحدى عربات القطار الذي يوجد في حركة ، بينما الشخص 3 يقف على الرصيف .

أ - كيف يلاحظ الشخص 2 الشخص 1؟ و مادا يمكن أن نقول ؟

ب - كيف يلاحظ الشخص 3 الشخص 1؟ و مادا يمكن أن نقول ؟

ج - مادا تستنتج ؟

#### استثمار


أ - الشخص 2 يلاحظ الشخص 1 في حالة سكون . نقول إن الشخص 1 في حالة سكون بالنسبة للشخص 2

ب - الشخص 3 يلاحظ الشخص 1 في حركة ، نقول إن الشخص 1 في حركة بالنسبة للشخص 3 .

ج - نستنتج أن مفهومي الحركة والسكن نسيان أي يتعلق بالمرجع الذي يدرس فيه هذان المفهومان . نقول إن جسما يتحرك بالنسبة لجسم آخر اختيار كسم مرجعي ، إذا انتقل و تغير موضعه بالنسبة لهذا الجسم .

### 2 - معلم الفضاء repère d'espace

الجسم المرجعي هو عبارة عن جسم صلب غير قابل للتلويمه بثلا : الأرض ، الشمس ، المختبر ، ... لتحديد موضع المتحرك نقرن الجسم المرجعي بمعلم متعامد منظم  $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  يسمى معلم الفضاء .



نسقط  $\overrightarrow{OM}$  على  $(\bar{O}, \bar{i})$  فنحصل على  $\overrightarrow{OA} = x\bar{k}$

نسقط  $\overrightarrow{OM}$  على  $(\bar{O}, \bar{j})$  فنحصل على  $\overrightarrow{OB} = y\bar{k}$

نسقط  $\overrightarrow{OM}$  على  $(\bar{O}, \bar{k})$  فنحصل على  $\overrightarrow{OC} = z\bar{k}$

حسب علاقة شال  $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$

نستنتج تعبير المتجهة  $\overrightarrow{OM} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k}$  و التي تسمى متوجهة الموضع Vecteur position

الإحداثيات الديكارتية مع الزمن و نسمى الدوال  $x = f(t)$  ،  $y = g(t)$  و  $z = h(t)$


المعادلات الزمنية للحركة .

### 3 - معلم الزمن Repère du temps

نعرف معلم الزمن باللحظة أو التاريخ  $t = 0$  لحظة توقيت النقطة المتحركة في موضع معين و تسمى هذه اللحظة أصل معلم الزمن أو أصل التواريخ . وحدة الزمن في النظام العالمي للوحدات هي الثانية seconde و نرمز لها ب s . الوحدات المضاعفة هي  $1 \text{ mn} = 60 \text{ s}$   $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$  . المدة الزمنية هي مقدار موجب  $\Delta t = t_2 - t_1$  حيث  $t_1$  هو تاريخ بداية الحدث و  $t_2$  تاريخ نهاية الحدث .

#### نشاط تجريب

نرسل حاملا ذاتيا فوق منضدة هوائية أفقية و نسجل حركة إحدى نقطه M ، أثناء مدد زمنية متتالية و متساوية  $40\text{ms} = \tau$  فنحصل على التسجيل التالي :



ا - أملء الجدول التالي و الذي يسمى : مبقات الحركة

نختار لحظة تسجيل  $M_2$  أصلًا للتاريخ و  $M_1$  أصلًا لمعلم الفضاء  $(\bar{O}, \bar{i})$

M <sub>8</sub>	M <sub>7</sub>	M <sub>6</sub>	M <sub>5</sub>	M <sub>4</sub>	M <sub>3</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>0</sub>	الموضع
									التاريخ t (s)
									الأقصول x (m)

ب - ما طبيعة المسار ؟

#### استثمار

-

M <sub>8</sub>	M <sub>7</sub>	M <sub>6</sub>	M <sub>5</sub>	M <sub>4</sub>	M <sub>3</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>0</sub>	الموضع
التاريخ t (s)									الأقصول x (m)
0,24	0,2	0,16	0,12	0,08	0,04	0	-0,04	-0,08	t (s)
0,105	0,09	0,075	0,06	0,045	0,03	0,015	0	-0,015	x (m)

ب - المسار مستقيم

### 4 - المسار la trajectoire

هو مجموعة المواقع التي تحتلها النقطة المتحركة أثناء حركتها .

إذا كان المسار مستقيمي ، نقول بأن لدينا حركة مستقيمية .

إذا كان المسار منحني ، نقول بأن لدينا حركة منحنية .

إذا كان المسار دائري ، نقول بأن لدينا حركة دائيرية .

## 5 - حركة الإزاحة mouvement de translation

يكون جسم صلب في حركة إزاحة إذا كان لكل نقطة من نقطه نفس المسار . و الإزاحة تكون إما مستقيمية أو منحنية .

### II ) سرعة نقطة من جسم صلب في حركة إزاحة vitesse d'un point d'un solide en mouvement de translation

#### 1 - السرعة المتوسطة vitesse moyenne

السرعة المتوسطة  $V$  لنقطة من جسم صلب في حركة هي خارج قسمة المسافة المقطوعة  $d$  على المدة الزمنية  $\Delta t$  اللازمة لقطع هذه

$$\text{المسافة} \quad V_m = \frac{d}{\Delta t} \quad \text{وحدتها} \quad m.s^{-1}$$

$$V_m = \frac{\vec{M_1 M_2}}{t_2 - t_1} \quad \text{في حالة حركة منحنية} \quad V_m = \frac{\| \vec{M_1 M_2} \|}{t_2 - t_1} = \frac{M_1 M_2}{t_2 - t_1}$$

#### تمرين تطبيقي

قطع سيارة مسافة 120km في ظرف 80mn . أحسب بالوحدتين  $m.s^{-1}$  و  $km.h^{-1}$  سرعة السيارة .

#### الحل

$$V_m = \frac{25m}{s} = \frac{25.3600m}{3600s} = \frac{90000m}{h} = 90km.h^{-1} \quad V_m = \frac{d}{\Delta t} = \frac{120000}{80.60} = 25m.s^{-1}$$

#### 2 - السرعة الحالية vitesse instantanée

##### A - مفهوم السرعة الحالية

السرعة الحالية للنقطة  $M$  عند التاريخ  $t$  هي قيمة سرعتها المتوسطة بين تاريخين  $t_1$  و  $t_2$  جداً متقاربان و يُطران التاريخ  $t$ .

$$V = \frac{d}{t_2 - t_1} \quad \text{مع} \quad t_1 < t < t_2 \quad \text{و} \quad \delta t = t_2 - t_1 \quad \text{مدقورة}$$

##### B - متجهة السرعة

السرعة تتميز باتجاه ز منحني و قيمة معينة إذن السرعة مقدار متجهي نرمز له بالمتجهة  $\bar{V}$  .

مميزات متجهة السرعة  $\bar{V}$  عند النقطة  $M$  .

- الاتجاه : المستقيم المماسي للمسار عند النقطة  $M$  .


- المنحى : منحى الحركة

- المنظم : قيمة السرعة الحالية عند النقطة  $M$  .

#### ج - نشاط تجريبي

##### • محاولة 1

نرسل خيلاً فوق نضد هوائي و نسجل حركة إحدى نقطه  $M$  ، أثناء مدد زمنية متتالية و متساوية  $\tau = 40ms$  فنحصل على التسجيل التالي :



► باستعمال طريقة التأطير ، أحسب سرعة الخيال عند النقط  $M_1$  ،  $M_4$  ،  $M_7$  و  $M_9$  .


► باستعمال سلم مناسب مثل عند النقط  $M_1$  ،  $M_4$  و  $M_7$  متجهات السرعة  $\bar{V}_1$  ،  $\bar{V}_4$  و  $\bar{V}_7$  .

► ما طبيعة الحركة؟

#### استئمار

$$V_1 = \frac{M_0 M_2}{t_2 - t_0} = \frac{M_0 M_2}{2\tau} = \frac{4.10^{-2}}{2.40.10^{-3}} = 0,5m.s^{-1} \quad >$$

>




► السرعة ثابتة و المسار مستقيمي إذن يأخذ الخيال حركة مستقيمية منتظمة .

##### • محاولة 2

نرسل حاملا ذاتيا فوق منضدة هوائية أفقية و نسجل أثناء مدد زمنية متتالية و متساوية  $\tau = 40\text{ms}$  حركة إحدى نقط M التي تتنمي لمحيط الحامل الذاتي فنحصل على التسجيل التالي :

- باستعمال طريقة التأطير ، أحسب سرعة الخيال عند النقط M<sub>5</sub> و M<sub>8</sub>.
- باستعمال سلم مناسب مثل عند النقط M<sub>5</sub> و M<sub>8</sub> متجهات السرعة  $\vec{V}_5$  و  $\vec{V}_8$ .
- ما طبيعة الحركة؟



### استئمار

$$V_8 = \frac{\hat{M}_7 M_9}{2\tau} \approx \frac{M_7 M_9}{2\tau} = \frac{1,4 \cdot 10^{-2}}{80 \cdot 10^{-3}} = 0,175 \text{ m.s}^{-1}$$

$$V_5 = \frac{\hat{M}_4 M_6}{2\tau} \approx \frac{M_4 M_6}{2\tau} = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{80 \cdot 10^{-3}} = 0,25 \text{ m.s}^{-1}$$

حركة منحنية

### II ) الحركة المستقيمية المنتظمة mouvement rectiligne uniforme

#### 1 - تعريف

تكون حركة نقطة من جسم صلب مستقيمية منتظمة إذا كانت متجهة سرعتها ثابتة .


#### 2 - خصيات الحركة المستقيمية المنتظمة

- المسار مستقيم

- السرعة ثابتة في كل لحظة.

#### 3 - المعادلة الزمنية للحركة

نعتبر معلم الفضاء ( $\vec{R}(O, \vec{i})$



نختار لحظة توجد النقطة المتحركة ب M<sub>0</sub> أصل للتواريخ .

تعبر السرعة  $V = v_x = \frac{M_0 M}{t - t_0} = \frac{x - x_0}{t - t_0}$  و منه نستنتج المعادلة الزمنية للحركة

نسمي  $v_x$  إحداثية السرعة  $\vec{V} = v_x \vec{i}$  و نسمى  $x_0$  الأصول عند أصل التواريخ

إذا كانت  $v_x$  موجبة أي  $v_x = V$  فإن  $\vec{V}$  و  $\vec{i}$  نفس المنحى .

إذا كانت  $v_x$  سالبة أي  $v_x = -V$  فإن  $\vec{V}$  و  $\vec{i}$  منحى متعاكسان .

#### تمرين تطبيقي

نعتبر سيارتين (A) و (B) في حركة منتظمة على جزء مستقيمي من طريق سيار و في نفس المنحى . حيث  $V_A = 72 \text{ km/h}$  و  $V_B = 108 \text{ km/h}$  . في اللحظة  $t = 0$  أصل التواريخ توجد السيارة (B) على بعد 300m وراء السيارة (A) . نختار الموضع O للسيارة (A) عند اللحظة  $t = 0$  أصل للأفاصيل .

1 - أحسب بالوحدة  $\text{m.s}^{-1}$  السرعة  $V_A$  و  $V_B$  للسيارتين (A) و (B) .

2 - أعط المعادلتين الزمنيتين لحركة السيارتين (A) و (B) .

3 - حدد موضع و تاريخ التحاق السيارة (B) بالسيارة (A) .

#### 4 - نشاط تجاريبي

باعتبار المناولة 1 في النشاط التجاريبي السابق أكتب المعادلة الزمنية للحركة . نعتبر لحظة تسجيل النقطة M<sub>2</sub> أصل للتواريخ M<sub>1</sub> أصل للأفاصيل .

### استئمار

$$x_0 = M_1 M_2 = 0,02 \text{ m}$$

$$v_x = V = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$$

$$x = 0,5t + 0,02$$

إذن المعادلة الزمنية للحركة

## III ) الحركة الدائرية المنتظمة mouvement circulaire uniforme

### 1 - تعريف

تكون نقطة M من جسم في حركة دائيرية منتظمة، إذا كان مسارها دائريا ، وكانت سرعتها ثابتة .

2 - الدور و التردد

أ - الدور : هو المدة الزمنية T التي تستغرقها النقطة M لإنجاز دورة كاملة . وحدته الثانية و نرمز لها ب s .

ب - التردد : هو عدد الدورات في الثانية نرمز له ب N وحدته هيرتز Hertz و نرمز لها ب Hz