

توازن جسم صلب خاضع لقوتين

Equilibre d'un corps solide soumis à deux forces

الدرس






المحور الثالث :
توازن جسم صلب

الوحدة 5
3 س

توازن جسم صلب خاضع لقوتين Equilibre d'un corps solide soumis à deux forces

1- تذكير بشروطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين :



عندما يكون جسم صلب في توازن تحت تأثير قوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ فإن :

⊕ المجموع المتجهي للقوتين منعدم $\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ ، وهذا

الشرط لازم لسكون مركز قصوره .

⊕ للقوتين نفس خط التأثير ، وهذا الشرط ضروري لغياب دوران الجسم

في حالة تحقيق الشرط الأول .

ملحوظة :

هذان الشرطان لازمان للحصول على توازن جسم صلب خاضع لقوتين ، لكنهما غير كافيين إذ يمكن أن يتحقق الشرطان ويكون مركز قصور الجسم الصلب في حركة مستقيمة منتظمة طبقاً لمبدأ القصور .

لدراسة توازن جسم صلب (S) يجب :

✎ تحديد المجموعة المدروسة .


✎ جرد القوى المطبقة على المجموعة المدروسة .

✎ تطبيق شرطي التوازن .

2- القوة المطبقة من طرف النابض :

1-2- نشاط :

نربط أحد طرفي نابض ذي لفات غير متصلة وكتلة مهمة بحامل ، بحيث تشير المشيرة إلى التدريجة صفر لمسطرة رأسية مدرجة وهو يوافق الطول البدئي l_0 للنابض . نعلق بالطرف الآخر للنابض كتلة معلمة (S) ذات كتلة m ونقيس في كل مرة الطول النهائي l للنابض فنحصل على النتائج التالية :



$m(g)$	40	35	30	25	20	15	10	5	0
$l(cm)$	13,9	13,4	12,9	12,5	12,0	11,5	10,9	10,5	10,0
$T(N)$	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05	0
$\Delta l(cm)$	3,9	3,4	2,9	2,5	2,0	1,5	0,9	0,5	0

أ- بدراسة توازن الكتلة المعلمة (S) المعلقة في طرف النابض ، استنتج العلاقة بين P شدة وزن الجسم الصلب و T شدة توتر النابض .

المجموعة المدروسة : { الكتلة المعلمة (S) } .

جرد القوى : $\vec{P}$ وزنها و $\vec{T}$ توتر النابض .


الكتلة المعلمة (S) في توازن ، إذن $\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$ أي $\vec{T} = -\vec{P}$ وبالتالي $T = P = mg$.

ب- حدد الطول البدئي l_0 للنابض وأتمم ملاء الجدول . بحيث عند تطبيق قوى مختلفة على النابض يتغير

طوله نسمي الفرق بين الطول النهائي l و الطول البدئي l_0 إطالة النابض هي $\Delta l = |l - l_0|$.

نعطي $g = 10 N.kg^{-1}$.

من خلال الجدول نجد أن $l_0 = 10,0 cm$.



ج- مثل تغيرات T بدلالة Δl .

انظر جانبه .

د- أوجد العلاقة بين شدة توتر النابض T و إطالة النابض Δl .

منحنى تغيرات T بدلالة Δl عبارة عن دالة خطية تكتب على شكل $T = K \cdot \Delta l$ حيث K يمثل المعامل الموجه للمستقيم مع

$$K = \frac{T}{\Delta l} = \frac{0,05}{0,005} = 10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

هـ- علام نحصل عند استبدال تدريج المسطرة بالنيوتن بدل السنتيمتر ؟
نحصل على دينامومتر بتدريج المسطرة المقرونة بالنابض بالنيوتن .

2-2- توازن جسم صلب معلق بنابض :

ندرس توازن جسم صلب (S) كتلته معلق بنابض ذي لفات غير متصلة و كتلته مهملة .

المجموعة المدروسة : { الكتلة المعلمة (S) } .

جرد القوى : $\vec{P}$ وزنها و $\vec{T}$ توتر النابض .

الجسم (S) في توازن إذن $\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$ أي $\vec{T} = -\vec{P}$ وبالتالي $T = P = mg$.

2-3- العلاقة بين توتر النابض وإطالته :

عندما نمثل الدالة $T = (\Delta l)$ نحصل على خط مستقيمي يمر من أصل المحورين . فنستنتج أن توتر النابض T يتناسب اطرادا مع إطالته $\Delta l = |l - l_0|$ و يعبر عن هذا التناسب بالعلاقة التالية :

$T = K \cdot \Delta l$ حيث K صلابة النابض و هو مقدار يميز النابض و يعبر عنه بالوحدة $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$.

نحدد قيمة K مبيانيا و تساوي قيمة المعامل الموجه للمستقيم .

تبقى العلاقة $T = K \cdot \Delta l$ صالحة عندما يكون النابض مطالا $\Delta l = l - l_0 > 0$ أو مكبسا

$\Delta l = l_0 - l > 0$. يسعى النابض إلى الرجوع إلى شكله الأصلي بتطبيق قوة تصنف بأنها قوة ارتداد .

اعتمادا على المنحنى $T = f(\Delta l)$ نحصل على دينامومتر و ذلك بتدريج المسطرة المقرونة بالنابض بالنيوتن .


3- دافعة أرخميدس :

1-3- الكتلة الحجمية :

الكتلة الحجمية لجسم مائع (سائل أو غاز) هي خارج قسمة كتلة كمية من المائع على الحجم الموافق لها :

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \leftarrow \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

2-3- نشاط :



■ نضع قطعة (S) من خشب على شكل متوازي المستطيلات في حوض به ماء ، فنلاحظ أنها تطفو على سطح الماء وهي في توازن .


أ- اجرد القوى المطبقة على القطعة (S) (نهمل تأثير الهواء) .

المجموعة المدروسة : { القطعة (S) } .

جرد القوى : $\vec{P}$ وزنها و $\vec{F}_a$ دافعة أرخميدس .

ب- حدد اتجاه ومنحنى دافعة أرخميدس (القوى المطبقة من طرف الماء) .

القطعة (S) في توازن إذن $\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{F}_a = \vec{0}$ أي $\vec{F}_a = -\vec{P}$ وبالتالي اتجاه $\vec{F}_a$ رأسي ومنحنى $\vec{F}_a$ نحو الأعلى .



■ نعلق قطعة عجينة مطاوع (S) بواسطة خيط في دينامومتر .

أ- قس وزن قطعة عجينة مطاوع (S) بواسطة دينامومتر .

المجموعة المدروسة : { قطعة عجينة مطاوع (S) } .

جـرد القوى : $\vec{P}$ وزنها و $\vec{T}_1$ توتر الخيط .

القطعة (S) في توازن إذن $\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{T}_1 = \vec{0}$

أي $\vec{P} = -\vec{T}_1$ وبالتالي $P = T_1 = 1,5N$.

ب- نغمر القطعة (S) المعلقة بالدينامومتر كلياً في الماء دون أن تلمس جوانب وقعر المخبر ، قس حجم الماء المزاح .

حجم الماء المزاح من طرف القطعة (S) هو $V = V_2 - V_1 = 410 - 290 = 120mL$.


ج- اعتماداً على إشارتي الدينامومتر ، استنتج شدة دافعة أرخميدس .

شدة دافعة أرخميدس هي : $F_a = T_1 - T_2 = 1,5 - 0,3 = 1,2N$.

د- قارن شدة دافعة أرخميدس مع شدة وزن الماء المزاح . مع $\rho = 1g.mL^{-1}$ و $g = 9,8N.kg^{-1}$.

وزن الماء المزاح هو : $P_L = m.g = \rho.V.g = 1 \times 120.10^{-3} \times 9,8 = 1,18N$.

نلاحظ أن $F_a \approx P_L = \rho.V.g$.



■ نغمر جسماً (S) معلقاً بدينامومتر جزئياً ثم

كلياً في كأس تحتوي على ماء ونسجل

القيم التي يشير إليها الدينامومتر .


أ- ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟

نلاحظ تناقص القيمة التي يشير إليها الدينامومتر

كلما ازداد الحجم المغمور من الجسم (S) .

فنستنتج أن شدة دافعة أرخميدس تزداد كلما ازداد

الحجم المغمور من الجسم .



■ نأخذ أجساماً من مواد مختلفة ولها نفس

الحجم ، ثم نسجل القيم التي يشير إليها

الدينامومتر عندما يكون الجسم (S) في

الهواء وعندما يكون مغموراً كلياً في نفس

السائل (الماء) .

أ- هل تغيرت شدة دافعة أرخميدس بتغير المادة

المكونة للجسم المغمور ؟ وماذا تستنتج ؟

نلاحظ أن شدة دافعة أرخميدس لم تتغير بتغير مادة

الجسم $F_a = T_1 - T_2 = 1,3N$. فنستنتج

أن شدة دافعة أرخميدس لا تتعلق بطبيعة الجسم .

■ نغمر نفس الجسم بالتتابع ، في سوائل


مختلفة .

أ- ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟

نلاحظ أن شدة دافعة أرخميدس تتغير بتغير

طبيعة السائل . فنستنتج أن شدة دافعة أرخميدس

تتعلق بطبيعة المائع أي كتلته الحجمية .



3-3- دافعة أرخميدس :

تسمى قوة التماس الموزعة المطبقة من **طرف مائع** (سائل أو غاز) على الأجسام المغمورة فيه **كلياً** أو **جزئياً بدافعة أرخميدس** . وتتعلق شدتها **بحجم الجزء المغمور** من الجسم و **بطبيعة المائع** و تساوي شدتها **شدة وزن المائع المزاح** .

مميزات دافعة أرخميدس :

✚ **نقطة التأثير** : مركز الدفع أي مركز ثقل المائع المزاح .

✚ **خط التأثير** : المستقيم الرأسى المار من مركز الدفع .

✚ **المنحى** : من الأسفل نحو الأعلى .

✚ **الشدة** : $F_a = \rho . V . g$

مع :

ρ : الكتلة الحجمية للمائع وحدتها $kg.m^{-3}$.

V : حجم الجزء المغمور من الجسم في المائع و يساوي حجم المائع المزاح وحدته m^3 .

g : شدة الثقالة وحدتها $N.kg^{-1}$.

