

تصحيح تمارين حول النوع الكيميائي

التمرين 1

- 1 – عرف النوع الكيميائي العضوي .
- 2 – عرف النوع الكيميائي الطبيعي .
- 3 – تحمل لصيقة منتوج استهلاكي المعلومات التالية :
ماء – مواد ذهنية – مواد حافظة – ملونات – نكهات – ملح .
أجرد الأنواع الكيميائية الطبيعية والمصنعة .

الحل

1 – النوع الكيميائي العضوي هي التي تتكون جزيئاتها أساساً من الكربون والهيدروجين وما تبقى من الأنواع فهي غير عضوية .

امثلة : البوتان : نوع كيميائي عضوي
كبريتات النحاس II نوع كيميائي غير عضوي .
3 – جرد الأنواع الكيميائية الطبيعية والمصنعة :
الأنواع الكيميائية الطبيعية : الماء – المواد الذهنية – ملح
النوع الكيميائي المصنعة : مواد حافظة – ملونات – نكهات

التمرين 2

نقرأ على لصيقة تعريفية لأحد المشروبات الغازية المعلومات التالية :
حمض الستريك – فيتامين C – ماء – الغليكوز – ليمونين .

- 1 – حدد الأنواع الكيميائية الممكن التعرف عليها بواسطة الحواس .
- 2 – هل المشروب حمضي أم قاعدي ؟ كيف يمكن التتحقق من ذلك ؟
- 3 – كيف يمكن إبراز مادة الغليكوز في المشروب ؟
- 4 – أذكر رائزاً يكشف عن وجود الماء في المشروب ؟
- 5 – علماً أن الغاز المذاب في المشروب ثانوي أوكسيد الكربون ، صف بإيجاز كيف تتحقق من طبيعة هذا الغاز

الحل

1 – الأنواع الكيميائية الممكن التعرف عليها بواسطة الحواس :
لا يمكن لأي من هذه الأنواع التعرف عليه بواسطة الحواس . مثلاً حمض الستريك والليمونين يمكن أن نشم رائحة الليمون ولكن لا يمكن التعرف على حمض الستريك والليمونين . نفس الشيء بالنسبة للسكريات يمكن التعرف عليها بالدوقي ولكن لا يمكن التعرف على الغليكوز .

2 – المشروب حمضي لأنه يحتوي على حمض الستريك ويمكن التتحقق من ذلك بإضافة كائف الملون أزرق البروموتيمول .

- 3 – يمكن إبراز النوع الكيميائي الغليكوز والذي ينتمي إلى السكريات بوسطة محلول فهلين والذي يأخذ لون أحمر أحوري .
- 4 – للكشف عن وجود الماء في المشروب نضيف مادة كبريتات النحاس اللامائي حيث يأخذ لوناً أزرق
- 5 – للتحقق من وجود ثنائي أوكسيد الكربون في المشروب :
- نضيف إلى المشروب ماء الجير وبوجود الماء يتغير هذا الأخير .

التمرين 3



السيكلوهكسان C_6H_{12}
 $M=84,16\text{g/mol}$
 $P.E=80^\circ\text{C}$
 $P.F=6,5^\circ\text{C}$
 $d=0,78$
99%

- نجد على لصيقة قنينة السيكلوهكسان ، وهو مذيب عضوي ، المعلومات جانبه :
- ما الاحتياطات اللازم اتخاذها أثناء استعمال السيكلوهكسان ؟
 - حدد الحالة الفيزيائية التي يوجد عليها السيكلوهكسان عند درجة الحرارة 25°C وتحت الضغط الجوي .
 - علام تدل المعلومة 99%
 - حجم السيكلوهكسان الموجود في القنينة هو $1l = V$. أحسب كتلته عند درجة 25°C .

الحل

- العلامة التي تحملها الأصقة تدل على أن مادة السيكلوهكسان قابلة للاشتعال لذا يجب إبعادها عن النار
- الحالة التي يوجد عليها السيكلوهكسان عند درجة الحرارة 25°C الحالة السائلة . لكون أن هذه القيمة محصورة بين درجة حرارة نقطة التبخر ونقطة التصلب .
- تمثل النسبة 99% نسبة السيكلوهكسان الخالص في محلول . يمكن أن نعبر عنها كنسبة كتليلية أي 99g في 100g من محلول .
- حساب الكتلة عند درجة الحرارة 25°C هي :
كتلة 1 لتر من السيكلوهكسان الموجود في القنينة غير خالص ك محلول هو :
نعلم أن الكثافة d للسيكلوهكسان بالنسبة للماء هي :

$$d_{cyclo} = \frac{\rho_{cyclo}}{\rho_{eau}}$$

$$\rho_{cyclo} = d \cdot \rho_{eau}$$

ولدينا كذلك أن :

$$\rho_{cyclo} = \frac{m_{cyclo}}{V}$$

أي أن

$$m_{cyclo} = d \cdot \rho_{eau} \cdot V$$

نعلم أن $100g$ من محلول السيكلوهكسان + الماء التي تحتوي عليه القنية يحتوي على $99g$ من السيكلوهيكسان
الخاص
كتلة 1 لتر من السيكلوهيكسان والتي تكافئ حسب العلاقة السابقة $d.\rho_{eau.V}$ الموجود في القنية تحتوي
على M كتلة السيكلوهكسان الخاص أي أن :

$$\frac{99}{100} = \frac{M}{d.\rho_{eau}.V}$$

$$M = 0,99.d.\rho_{eau}.V$$

عديا : $\rho_{eau} = 1g/ml$ و $d = 0,78$ و $V = 1l$

$$M = 0,99.0,78.10^3 = 772,2g$$