


## La projection dans le plan

### I) La projection sur une droite parallèlement à une autre droite



#### 1) Définition

Soient  $(D)$  et  $(\Delta)$  deux droites sécantes en un point  $A$ , et soit  $M$  un point du plan. La droite qui passe par  $M$  et parallèle à  $(\Delta)$  coupe  $(D)$  en un point  $M'$ . Le point  $M'$  s'appelle la projection du point  $M$  sur  $(D)$  parallèlement à  $(\Delta)$  ou le projeté  $M$  sur  $(D)$  parallèlement à  $(\Delta)$  ou l'image du point  $M$  par la projection  $P_{(D;\Delta)}$  sur  $(D)$  parallèlement à  $(\Delta)$  et on écrit :  $P_{(D;\Delta)}(M) = M'$  ou  $P(M) = M'$


la droite  $(\Delta)$  s'appelle la direction de la projection

$P(M) = M'$  :  $M'$  l'image du point  $M$  par la projection  $P$

si  $B \in (D)$  alors  $P(B) = B$  on dit alors que le point  $B$  est invariant par la projection  $P$

#### 2. Propriétés

- Chaque point de  $(D)$  est confondu avec sa projection
- Est tout point confondu avec sa projection est un point de  $(D)$
- On dit que la droite  $(D)$  est invariante par la projection sur  $(D)$  parallèlement à  $(\Delta)$



#### Cas particulier

Si les droites  $(D)$  et  $(\Delta)$  sont perpendiculaires (on dit aussi orthogonales) on dit que  $M'$  est la projection orthogonale de  $M$  sur  $(D)$

**Exercice1** : Soit  $ABC$  est un triangle et  $M$  le milieu de  $[AB]$

1) Soit  $P_1$  la projection sur  $(BC)$  parallèlement à  $(AC)$

Déterminer :  $P_1(A)$  ;  $P_1(C)$  ,  $P_1(B)$  ,  $P_1(M)$  ,

2) Soit  $P_2$  la projection sur  $(AC)$  parallèlement à  $(BC)$

Déterminer :  $P_2(A)$  ,  $P_2(C)$  ,  $P_2(B)$  ,  $P_2(M)$

**Réponse** : 1) soit  $P_1$  la projection sur  $(BC)$  parallèlement à  $(AC)$

On a  $A \in (AC)$  et  $(AC) \cap (BC) = \{C\}$  donc

$P_1(A) = C$

On a  $B \in (BC)$  donc  $B$  est invariante par la projection

$P_1$  donc  $P_1(B) = B$

On a  $C \in (BC)$  donc  $C$  est invariante par la projection

$P_1$  donc  $P_1(C) = C$

Soit  $M' = P_1(M)$  on a  $M$  le milieu de  $[AB]$

La parallèle à  $(AC)$  passant par  $M$  passe forcément par le milieu de  $[BC]$  donc  $M'$  est le milieu de  $[BC]$

1) soit:  $P_2$  la projection sur  $(AC)$  parallèlement à  $(BC)$

On a  $A \in (AC)$  donc  $P_2(A) = A$

On a  $C \in (AC)$  donc C est invariante par la projection

$P_2$  donc  $P_2(C) = C$

On a  $B \in (BC)$  et  $(AC) \cap (BC) = \{C\}$  donc

$P_2(B) = C$

On a M le milieu de [AB] donc la parallèle à (BC) passant par M coupe [AC] en son milieu

soit:  $M''$  ce milieu donc  $P_2(M) = M''$

### 3. La projection d'un segment et de son milieu sur une droite parallèlement à une autre droite


Soi A et B deux points du plan et A' et B' sont respectivement leur projection  $P$  sur la droite (D) parallèlement à ( $\Delta$ )

**Propriété 1 :** L'image du segment [AB] par la projection  $P$  est le segment  $[A'B']$  et on écrit :

$$P([AB]) = [A'B']$$

**Propriété 2 :** Si I est le milieu de [AB] alors

$$P(I) = I'$$
 est le milieu du segment  $[A'B']$




**Remarque :**

on a :  $P([AB]) = [A'B']$  donc pour tout point M du segment [AB] :  $P(M) = M' \in [A'B']$

## II) Théorème de Thales et son théorème réciproque

### 1) Théorème de Thales :

Soient (D) et ( $\Delta$ ) deux droites sécantes en un point, et soient A ; B ; C trois points alignés du plan tel que ( $AB$ ) et ( $\Delta$ ) ne sont pas parallèles



soient  $A' ; B' ; C'$  respectivement les projetés des points A ; B ; C sur (D) parallèlement à ( $\Delta$ )

$$\text{Alors : } \frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}$$

### 2) Théorème de Thales avec les vecteurs :

Soient  $A' ; B' ; C'$  respectivement les projetés des points A ; B ; C sur droite (D) parallèlement à ( $\Delta$ )

$$\text{Si } \overrightarrow{AB} = k \overrightarrow{AC} \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{R} \quad \text{Alors :} \\ \overrightarrow{A'B'} = k \overrightarrow{A'C'}$$

On dit que la projection conserve le coefficient d'alignement de trois points

**Exercice 2 :** Soient ABC est un triangle et M un point défini par :  $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$

1) Construire le point  $M'$  le projeté de M sur la droite ( $AC$ ) parallèlement à ( $BC$ )

2) Montrer que  $\overrightarrow{AM'} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$  et en déduire que

$$\overrightarrow{MM'} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BC}$$

**Réponse :** 1) soit:  $P$  la projection sur ( $AC$ )

parallèlement à ( $BC$ )

On a  $A \in (AC)$  donc A est invariante par la projection

$P$  donc  $P(A) = A$

On a  $C \in (BC)$  donc C est invariante par la projection  $P$

donc  $P(C) = C$

On a aussi :  $P(B) = C$

Et puisque  $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$  et la projection conserve le coefficient d'alignement de trois points

Alors :  $\overrightarrow{AM'} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$

On a

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AM'} = -\frac{2}{3} \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} (-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{2}{3} \overrightarrow{BC}$$


### 3) le théorème réciproque de Thales

Soient  $(D)$  et  $(D')$  deux droites non parallèles à une troisième  $(\Delta)$ , et soient  $A ; B$  deux points de la droite  $(D)$  tel que  $A'$  et  $B'$  respectivement les projetés des points  $A ; B$  sur  $(D')$  parallèlement à  $(\Delta)$


Si  $C$  un point de la droite  $(D)$  et  $C'$  un point de la droite  $(D')$  tel que  $\frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}$

Et les points  $A ; B$  et  $C$  sont dans le même ordre sur la droite  $(D)$  que les points  $A' ; B'$  et  $C'$  sur la droite  $(D')$

Alors : le point  $C'$  est la projection de  $C$  sur la droite  $(D')$  parallèlement à  $(\Delta)$  et on a  $(AA') \parallel (BB') \parallel (CC')$



Propriété : soit  $P = P_{(D;\Delta)}$



Si :  $\overrightarrow{AB} = k \overrightarrow{EF}$  et  $P(B) = B'$  ;  $P(A) = A'$  ;  $P(E) = E'$  et  $P(F) = F'$

Alors :  $\overrightarrow{A'B'} = k \overrightarrow{E'F'}$

On dit que la projection conserve le coefficient de colinéarité de deux vecteurs

Soient  $(\Delta)$  et  $(\Delta')$  deux droites sécantes et  $A ; B ; C ; D$  des points distinctes et  $k \in \mathbb{R}$  tel que  $\overrightarrow{AB} = k \overrightarrow{CD}$  ET si  $A' ; B' ; C'$  et  $D'$  respectivement les projetés des points  $A ; B ; C$  et  $D$  sur la droite  $(\Delta)$  parallèlement à  $(\Delta')$


Alors :  $\overrightarrow{A'B'} = k \overrightarrow{C'D'}$

On dit que la projection conserve le coefficient de colinéarité de deux vecteurs

### Exercice3 : (réciproque de Thales):

Soient  $ABC$  est un triangle et  $I$  et  $I'$  deux points tel que :  $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$

$$\text{et } \overrightarrow{AI'} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$$



1) Montrer que  $I'$  est par la projection de  $I$  sur la droite  $(AB)$  parallèlement à  $(BC)$

2) soit  $M$  est le milieu de

$[BC]$  ; la droite  $(AM)$  coupe la droite  $(II')$  en  $G$

$$\text{Montrer que } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AM}$$

Réponse : 1) On a  $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$  donc  $\|\overrightarrow{AI}\| = \left\| \frac{2}{3} \overrightarrow{AC} \right\|$

$$\text{donc } AI = \frac{2}{3} AC \text{ donc } \frac{AI}{AC} = \frac{2}{3} \quad (1)$$

Et on a :  $\overrightarrow{AI'} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$  donc  $\|\overrightarrow{AI'}\| = \left\| \frac{2}{3} \overrightarrow{AB} \right\|$  donc

$$AI' = \frac{2}{3} AB \text{ donc } \frac{AI'}{AB} = \frac{2}{3} \quad (2)$$

D'après (1) et (2) on a  $\frac{AI}{AC} = \frac{AI'}{AB}$  et d'après

la réciproque de Thales :  $(II') \parallel (BC)$

Et puisque  $(AB)$  coupe  $(II')$  en  $I'$  donc  $I'$  est la projection de  $I$  sur la droite  $(AB)$  parallèlement à  $(BC)$

2) On a  $I'$  est la projection de  $I$  sur la droite  $(AB)$  parallèlement à  $(BC)$  et  $M$  est le milieu

$$\text{de } [BC] \text{ Mq : } \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AM} ???$$

On considère  $P$  la projection sur  $(AM)$

Parallèlement à (BC)

On a  $A \in (AM)$  donc A est invariante par la projection

$P$  donc  $P(A) = A$  ①

la parallèle à (BC) passant par C est (BC) elle coupe  $(AM)$  en M donc  $P(C) = M$  ②

la parallèle à (BC) passant par I est  $(II')$  elle coupe  $(AM)$  en G donc  $P(I) = G$  ③

Et on a en plus  $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AC}$  ④ donc D'après ① et ②

et ③ et ④ on a  $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AM}$  car la projection


conserve le coefficient d'alignement de trois points

**Exercice4 :** Soient ABC est un triangle et I le milieu de  $[AC]$ . E un point de  $(AC)$  tel que :

$$\overrightarrow{IE} = \frac{1}{3} \overrightarrow{IC} \text{ et } P_{((AB);(IB))}(E) = F$$

Faire une figure et montrer que :  $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$

**Solution :**



On a :  $\overrightarrow{IE} = \frac{1}{3} \overrightarrow{IC}$  et I le milieu de  $[AC]$

Donc :  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$  donc :  $\overrightarrow{IE} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AI}$

Et on a :  $P_{((AB);(IB))}(E) = F$  et  $P_{((AB);(IB))}(I) = B$

et  $P_{((AB);(IB))}(A) = A$

Et puisque la projection conserve le coefficient d'alignement de trois points alors :

$$\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$$

**Exercice5 :** Soient ABC est un triangle et I le milieu de  $[AC]$

E un point tel que :  $\overrightarrow{BC} = 4 \overrightarrow{BE}$

La droite qui passe par E et parallèle à (IB) coupe  $(AC)$  en J


1) montrer que  $\overrightarrow{IC} = 4 \overrightarrow{IJ}$  et en déduire que :

$$\overrightarrow{AJ} = 5 \overrightarrow{IJ}$$

2) si  $(IB) \cap (AE) = \{K\}$  montrer que :

$$\overrightarrow{AE} = 5 \overrightarrow{KE}$$

**Solution :** 1) soit  $P_{((AC);(IB))}$  la projection sur  $(AC)$  parallèlement à  $(IB)$



On a :  $\overrightarrow{BC} = 4 \overrightarrow{BE}$  et  $P_{((AC);(IB))}(B) = I$  et

$P_{((AC);(IB))}(E) = J$  et  $P_{((AC);(IB))}(C) = K$  et puisque la projection conserve le coefficient d'alignement de trois points alors :  $\overrightarrow{IC} = 4 \overrightarrow{IJ}$



La déduction :

On a  $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ}$  et I le milieu de  $[AC]$

Donc :  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$  et par suite :

$$\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IJ} = 4 \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{IJ} = 5 \overrightarrow{IJ}$$

2) soit  $P_{((AE);(IB))}$  la projection sur  $(AE)$  parallèlement à  $(IB)$

On a :  $\overrightarrow{AJ} = 5 \overrightarrow{IJ}$  et  $P_{((AE);(IB))}(A) = A$  et  $P_{((AE);(IB))}(I) = K$  et  $P_{((AE);(IB))}(J) = E$

et puisque la projection conserve le coefficient d'alignement de trois points alors :  $\overrightarrow{AE} = 5 \overrightarrow{KE}$

C'est en forgeant que l'on devient forgeron » Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices

Que l'on devient un mathématicien

