


### 1. توجيه المستوى:



لتكن  $(C)$  دائرة من المستوى  $(P)$  مركزها  $O$ ، ولتكن  $I$  و  $M$  نقطتين من  $(C)$ . لدينا منحنين للوصول إلى النقطة  $M$  انطلاقا من  $I$ . أحدهما موجب والآخر سالب. لقد تم اختيار المنحني الموجب هو المنحني المضاد لحركة عقرب الساعة (المنحني  $+$  المشار إليه في الشكل) و يسمى المنحني المثلثي.

- عندما نختار هذا المنحني نقول بأننا وجهنا الدائرة  $(C)$  توجيهها موجبا أو مباشرا.
- بتوجيه جميع دوائر المستوى  $(P)$  توجيهها موجبا نقول بأننا وجهنا المستوى  $(P)$  توجيهها موجبا أو مباشرا.

### 2. الدائرة المثلثية:

الدائرة المثلثية هي كل دائرة شعاعها 1 مزودة بأصل و موجهة توجيهها موجبا.

#### 3- وحدات قياس الزوايا

لقياس الزوايا هناك ثلاث وحدات هي الدرجة و الغراد و الراديان.

##### تعريف الرadian

الراديان هو قياس زاوية مركبة، في دائرة شعاعها  $R$  ، تحصر قوسا دائريا طولها  $R$  .

نرمز لها بـ  $rad$  أو  $rd$

(  $gr$  : يرمز للغراد )  $\pi rad = 200gr = 180^\circ$

##### ملاحظة

##### نتيجة

إذا كان  $x$  قياس زاوية بالراديان و  $y$  قياسها بالدرجة و  $z$  قياسها بالغراد فان

\*\* تمرين تطبيقي : (02 - س)

### 4. الأوصيل المنحني لنقطة من دائرة مثلثية:

#### a - الأوصول المنحني الرئيسي لنقطة على الدائرة المثلثية

##### خاصية و تعريف

لتكن  $(C)$  دائرة مثلثية أصلها  $I$ .

كل نقطة  $M$  من  $(C)$  تمثل عدد وحيد  $\alpha$  من  $[-\pi, \pi]$  وكل عدد  $\alpha$  من  $[-\pi, \pi]$  يمثل نقطة وحيدة  $M$  من  $(C)$ . العدد  $\alpha$  يسمى الأوصول المنحني الرئيسي لـ  $M$

ملاحظة قياس الزاوية الهندسية  $[IOM]$  هو  $|\alpha|$  رadians

\*\* تمرين تطبيقي : (03 - س)

#### b - الأوصيل المنحني لنقطة على الدائرة المثلثية

##### تعريف

لتكن  $M$  نقطة من دائرة مثلثية  $(C)$  أصلها  $I$ . ولتكن  $\alpha$

أوصولها المنحني الرئيسي

كل عدد يكتب على الشكل  $\alpha + 2k\pi$  بحيث  $k$  عنصر من  $\mathbb{Z}$  يسمى أوصولا منحنيا للنقطة  $M$ .


**خاصية** - إذا كان  $x$  و  $y$  أوصولين منحنيين للنقطة  $M$  فإنه يوجد عنصر  $\lambda$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث

$x - y = 2\lambda\pi$  و نكتب  $[2\pi]x \equiv y$  و نقرأ  $x$  يساوي  $y$  بتردد  $2\pi$ .

- إذا كان  $x$  أوصول منحني للنقطة  $M$  فإن جميع الأوصول المنحني للنقطة  $M$  تكتب على شكل  $x + 2k\pi$  حيث  $k \in \mathbb{Z}$ .

\*\* تمرين تطبيقي : (04 - س)

### خاصية وتعريف



\*كل زوج  $(OA, OB)$  من نصفى مستقيم يحدد الزاوية الموجهة المرموز اليها بـ  $\hat{OA, OB}$  . انظر الشكل.

\*ليكن  $\alpha$  و  $\beta$  أقصولين منحنيين للنقاطين  $A$  و  $B$  على التوالي. الأعداد الحقيقة  $\beta - \alpha + 2k\pi$  حيث  $k \in \mathbb{Z}$  هي قياسات للزاوية الموجهة  $\hat{OA, OB}$  و نكتب:  $\hat{OA, OB} \equiv \beta - \alpha [2\pi]$ .

\*الزاوية الموجهة  $\hat{OA, OB}$  قياس وحيد في المجال  $[\pi, -\pi]$  يسمى القياس الرئيسي للزاوية.

### \*\* تمارين تطبيقي:

1 - ما هو القياس الرئيسي لزاوية موجهة قياسها أحد القياسات  $47\pi$  ;  $-\frac{25\pi}{3}$  ;  $\frac{52\pi}{5}$  ;  $-36\pi$  ;

2 - أنشئ زاوية موجهة  $\hat{Ox; Oy}$  قياسها  $\frac{-234\pi}{5}$  .

### 5. الزاوية الموجهة لمتجهتين:

#### تعريف

لتكن  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتين غير منعدمتين:  $\hat{u, v} = \hat{OA, OB}$  و منه  $\hat{u, v} = \hat{OA, OB}$

خاصيات: لتكن  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$  ثلث متجهات من المستوى.

$\hat{u, v} + \hat{v, w} \equiv \hat{u, w}$  [2π] و  $\hat{u, v} \equiv -\hat{v, u}$  [2π] و  $\hat{u, u} \equiv 0$  [2π]

### \*\* تمارين تطبيقي :

لتكن  $(C)$  دائرة مثلثية مركزها  $O$  وأصلها  $I$ . نعتبر على  $(C)$  النقط التالية المعرفة بأفاصيلها

$F\left(\frac{-17\pi}{3}\right)$   $E\left(\frac{23\pi}{4}\right)$   $B\left(\frac{3\pi}{2}\right)$   $A(\pi)$  المنحنيات

أعط قياساً لكل من الزوايا التالية ، ثم حدد القياس الرئيسي لكل منها

$\hat{OE; OF}$  ;  $\hat{OA; OE}$  ;  $\hat{OB; OA}$  ;  $\hat{OA; OA}$


### 6. النسب المثلثية لعدد حقيقي:

#### a- المعلم المتعامد الممنظم المرتبط بالدائرة المثلثية


لتكن  $(C)$  دائرة مثلثية مركزها  $O$  وأصلها  $I$  .

ولتكن  $J$  من  $(C)$  بحيث  $\hat{OI; OJ}$  زاوية قائمة موجبة المعلم  $(O; \vec{OI}; \vec{OJ})$  يسمى المعلم المتعامد الممنظم المباشر المرتبط بالدائرة المثلثية  $(C)$ .

لتكن  $J'$  من  $(C)$  بحيث  $\hat{OI; OJ'}$  زاوية قائمة سالبة المعلم  $(O; \vec{OI}; \vec{OJ'})$  يسمى المعلم المتعامد الممنظم الغير المباشر المرتبط بالدائرة المثلثية  $(C)$ .



لتكن  $(C)$  دائرة مثلثية و  $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$  المعلم المتعامد الممنظم المرتبط بها. لتكن  $M$  نقطة من  $(C)$  و  $x$  أقصولاً منحنياً لها . نعتبر  $C$  المسقط العمودي لـ  $M$  على  $(OI)$  و  $S$  المسقط العمودي لـ  $M$  على  $(OJ)$




- \* العدد الحقيقي أقصول النقطة  $M$  في المعلم  $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$  يسمى جيب تمام العدد الحقيقي  $x$  نرمز له بـ  $\cos x$
- \* العدد الحقيقي أرتوب النقطة  $M$  في المعلم  $(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$  يسمى جيب العدد الحقيقي  $x$  . نرمز له بـ  $\sin x$
- \* ليكن  $\Delta$  المماس لـ  $(C)$  عند  $I$  و النقطة  $T$  لتكن  $T$  نقطة تقاطع  $(OM)$  و  $\Delta$  أي

$$k \in \mathbb{Z} \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

العدد الحقيقي أقصول  $T$  في المعلم  $(I; P)$  يسمى ظل العدد الحقيقي  $x$  نرمز له بـ  $\tan x$

خاصيات:



لكل $x$ من $\mathbb{R}$	$-1 \leq \sin x \leq 1$	$-1 \leq \cos x \leq 1$
لكل $x$ من $\mathbb{R}$	$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$	
لكل $x$ من $\mathbb{R}$	$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$	$k \in \mathbb{Z}$
الدالة $\cos$ زوجية: $\cos(-x) = \cos x$		
الدالة $\sin$ فردية: $\sin(-x) = -\sin x$		
لكل $x$ من $\mathbb{R}$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ لدينا:	$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$	
		$\tan(x + k\pi) = \tan x$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad \text{لكل } x \text{ من } \mathbb{R}$$


$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \text{لكل } x \text{ من } \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$$

\*\* تمرين تطبيقي : (2-4 - س) (05 - س)

\*\* تمرين تطبيقي : (3 - س) (10 - س)

c. العلاقة بين النسب المثلثية لعدد:

- بنظرية الدائرة المثلثية نحصل على



	$-x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} + x$
$\cos x$	$\cos x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\sin x$
$\sin x$	$-\sin x$	$\sin x$	$-\sin x$	$\cos x$	$\cos x$
$\tan x$	$-\tan x$	$-\tan x$	$\tan x$	$\frac{1}{\tan x}$	$-\frac{1}{\tan x}$

\*\* تمرين تطبيقي : (1-5 - س) (7 - س)

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\pi$
sinx	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
cosx	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
tanx	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	غير معرف	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

\*\* تمرين تطبيقي : (6 - س)

