


تمرين 1 (6 ن)

1- موضع مركز القصور للمجموعة و تمثله على الشكل .

$$= \frac{m_2 \cdot G_1 G_2}{3 \cdot m_2} = \frac{1}{3} G_1 G_2 \cdot \overrightarrow{G_1 G} = \frac{m_1 \cdot G_1 G_1 + m_2 \cdot G_1 G_2}{m_1 + m_2}$$



1.2 نص مبدأ القصور .

عندما يكون جسم صلب معزولا ميكانيكيا أو شبه معزول في معلم غاليلي ، يكون مركز قصوره G في حركة مستقيمية منتظمة $(\bar{V}_G = cte)$ أو في سكون $(\bar{V}_G = 0)$.

2.2 يتميز مركز قصور الجسم بحركة مستقيمية لدى النقطة B هي التي تمثل مركز قصور الجسم

2.3 سرعة مركز قصور المجموعة .

في الموضع 4	في الموضع 2
$V_2 = \frac{M_1 M_3}{2 \cdot \tau} = 0,175m/s$	$V_2 = \frac{M_1 M_3}{2 \cdot \tau} = 0,175m/s$

2.4 طبيعة التماس بين المجموعة و السطح .

من خلال السؤال السابق $V_4 = V_2$ حركة مستقيمية غير منتظمة ، و حسب مبدأ القصور الجسم شبه معزول ← التماس بين المجموعة و السطح بدون احتكاك

3- لا يمكن اعتباره المعلم المرتبط بالنقطة A غاليليا لأن حركة مركز القصور بالنسبة لهذا المعلم لن تكون مستقيمية

تمرين 2 (7 ن)

1- حركة G مركز قصور الحامل الذاتي (S) ؟

حركة مستقيمية منتظمة لأن المسار مستقيم و المسافات المقطوعة خلال نفس المدة τ تبقى ثابتة

2- السرعة المتوسطة V لحركة مركز قصور الحامل الذاتي (S) خلال حركته

$$\text{من الموضع } M_1 \text{ إلى } M_9 = \frac{M_1 M_9}{8 \tau} : M_9$$

3- مميزات متجهة السرعة و تمثلها على الشكل بالسلم . $0,2m/s \rightarrow 1cm$


التمثيل	عند الموضع M_3
M_3	$\overrightarrow{V_3}$
الاتجاه : المستقيم المسار	M_3 : الاصل
المنحي : وفق منحي الحركة	الشدة : $= 0,5m/s V_3 = \frac{M_2 M_4}{2 \cdot \tau}$

4- ملء الجدول .

M_1 أصلًا للأصاليل و M_2 أصلًا للتواريخ

M_6	M_5	M_4	M_3	M_2	M_1	M_0	M_i
160	120	80	40	0	-40	-80	$t (ms)$
10	8	6	4	2	0	-2	$x (cm)$


4-2- منحنى تغير الأقصول x بدلالة الزمن t .



4-3- انطلاقا من المنحنى المعادلة الزمنية لحركة الحامل الذاتي (S) .

$$x(t) = 0,5 \cdot t + 2 \cdot 10^{-2} \text{ (m)}$$

4-4 مبيانيا تاريخ و موضع التحاق الحامل الذاتي (S) بالحامل الذاتي (S') هي نقطة تقاطع المنحنيين



تمرين 3 (ن 7)

1- ملء الجدول.

$^{27}_{13}Al^{3+}$	$^{17}_8O^{2-}$	1_1H	$^{35}_{17}Cl$
13	8	1	17
14	9	0	18
$(K)^2(L)^8$	$(K)^2(L)^8$	$(K)^1$	$(K)^2(L)^8(M)^7$

1- الشحنة الإجمالية للكترونات . بما ان الذرة محایدة كهربائيا :

$$nq = -C^{18} - 2,08 \cdot 10$$

2- عدد الكترونات ذرة العنصر الكيميائي ، X_Z ،

$$Z=13 \quad n=-2,08 \cdot 10^{-18} / -1,6 \cdot 10^{-19} = 13$$

الذرة هي $^{28}_{13}Al$ و رمزها

3-2- العنصر الكيميائي X_Z يمثل نظير

4-2- الكتلة التقريرية لذرة هذا العنصر الكيميائي X_Z .

$$m(\text{ }^{28}_{13}Al) = 28 \cdot m_p = 46,76 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$$

5- عدد الذرات الموجودة في عينة كتلتها تساوي 20 g

$$N = m / m(\text{ }^{28}_{13}Al) = 4,27 \cdot 10^{23}$$