





عبدالاله القصور Principe d'inertie

1- مفعول القوة على حركة جسم صلب :
1-1- نشاط:

شكل 4 : حركة المفتر المركي A لحامل ذاتي فوق منضدة أفقية	شكل 3 : سقوط شلجمي لكرة القدم	شكل 2 : سقوط رأسى لكرة الكولف رأسى لكرة القدم	شكل 1 : حركة القمر حول الأرض
			

أ- اعط تعبير $\sum \vec{F}$ مجموع متجهات القوى المطبقة على الجسم المتحرك في كل شكل.

بالنسبة للشكل 1: $\sum \vec{F} = \vec{F}$ وبالنسبة للشكليين 2 و 3: $\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{R}$ وبالنسبة للشكل 4: $\sum \vec{F} = \vec{P}$

ب- بمقارنتك لاتجاهي \vec{V} و $\sum \vec{F}$ في الأشكال 1 و 2 و 3 ، استنتج متى تكون حركة الجسم : مستقيمية - منحنية - دائرية ؟

تكون حركة الجسم مستقيمية إذا كان $\vec{F} \parallel \vec{V}$ و $\sum \vec{F} \parallel \vec{V}$ نفس الاتجاه (أي $\sum \vec{F} \parallel \vec{V}$).

تكون حركة الجسم دائرية إذا كانت \vec{F} عمودية على \vec{V} (أي $\sum \vec{F} \perp \vec{V}$).

تكون حركة الجسم منحنية إذا كانت الزاوية α التي تشكلها \vec{V} و $\sum \vec{F}$ تتحقق $\alpha \neq k \cdot \frac{\pi}{2}$ $k \in \mathbb{Z}$.


ج- في أي حالة يكون الجسم شبه معزول ميكانيكيًا (أي $\sum \vec{F} = \vec{0}$) ، استنتاج طبيعة حركة الجسم .

الحمل الذاتي في الشكل 4 شبه معزول ميكانيكيًا وهو في حركة مستقيمية منتظمة .

د- هل يمكن لجسم أن يكون في حركة في غياب وجود قوة ؟

نعم ، يمكن للجسم أن يكون في حركة في غياب وجود قوة .

1-2- خلاصة :



يعمل اللاعبان على مسح الطريق
 أمام الرمية المتحركة حتى تحافظ
 على حركتها

يمكن للقوة أن تغير مسار حركة جسم أو سرعته أو هما معا .
اعتقد أرسطو أن القوة ضرورية للحفاظ على ثبات سرعة جسم متحرك على مستوى أفقى ، إلى أن جاء غاليليو غاليلي وأثبت أن حركة جسم على مستوى أفقى أملس (احتكاكات مهملة) ليست في حاجة إلى قوة لتبقى مستقيمية منتظمة .
بالنسبة للجسم المرجعي الأرضي ، إذا كان جسم صلب يخضع لقوى متوافرنة (أي $\sum \vec{F} = \vec{0}$) فهذا لا يعني بالضرورة غياب الحركة ، إذ يمكن للجسم أن يكون في إحدى الحالتين :


الجسم في سكون أي $\vec{V} = \vec{0}$.

الجسم في حركة إزاحة مستقيمية منتظمة أي $\vec{V} = \vec{Cte}$.

ملحوظة :

إذا كان لمتجهة القوى المطبقة على جسم ولمتجهة سرعته اتجاهان متعامدان فإن حركته تكون دائرية .

إذا كان لمتجهة القوى المطبقة على جسم ولمتجهة سرعته نفس الاتجاه فإن حركته تكون مستقيمية .



2- مركز قصور جسم صلب :

2-1- نشاط :


نرسل دائريا حاملا ذاتيا على منضدة هوائية أفقية مزودا بمفجرين أحدهما مثبت في نقطة B من جانب الحامل الذاتي والآخر في نقطة A من محور تماثله الرأسي ، فنحصل على التسجيل التالي :

$B_0 \ B_1 \ B_2 \ B_3 \dots$
 $A_0 \ A_2 \ A_4 \dots$

أ- قارن بين مسارين النقطتين A و B
 مسار **النقطة B** منحني بينما مسار **النقطة A** مستقيم .

ب- ما طبيعة الحركة A ؟ استنتج طبيعة حركة نقط محور التماثل الرأسي للحامل الذاتي المار من A .
 بما أن المسار مستقيم والمسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية متناسبة فإن حركة النقطة A مستقيمة وينطبق هذا على جميع النقط التي تنتمي إلى محور التماثل الرأسي للحامل الذاتي المار من A .


ج- إذا تصورنا حاملا ذاتيا بإمكانه التحرك على مختلف الأوجه فوق منضدة هوائية أفقية فإنه عندما يتحرك الحامل الذاتي على الوجه EF تكون حركة نقط تماثله الرأسي (Δ_1) مستقيمية متنسبة وعندما يتحرك الحامل الذاتي على الوجه FM تكون حركة نقط تماثله الرأسي (Δ_2) مستقيمية متنسبة .
 نلاحظ أن نقطة تقاطع المحورين (Δ_1) و (Δ_2) هي النقطة الوحيدة التي تكون حركتها دائمة مستقيمية متنسبة كيما كان الوجه الذي يتحرك عليه الحامل الذاتي و تسمى هذه النقطة **مركز قصور الحامل الذاتي** و نرمز له بالحرف G .




2-2- خلاصة :

يتتوفر كل جسم صلب على نقطة **خاصة ووحيدة** تتفرق عن باقي نقطه **حركة خاصة** وهي نقطة تقاطع محاوره التماثلية وتسمى **مركز قصور الجسم** ويرمز لها بـ G .
 عندما يكون هذا الجسم شبه معزول ميكانيكيًا بالنسبة للمرجع الأرضي فإن مركز قصورة G ينفرد **حركة مستقيمية متنسبة** .

أمثلة لمراكل قصور بعض الأجسام:






3- مبدأ القصور أو القانون الأول لنيوتن :

1- نشاط:

فحصل على التسجيل التالي:



- أ- قارن بين حركتي النقطتين A و B . ما طبيعة حركة G مركز قصور الحامل الذاتي ؟

حركتي النقطتين A و B مستقيمية منتظمة . وحركة مركز القصور G للحامل الذاتي هي أيضاً مستقيمية منتظمة لأن G ينتمي إلى محور التماثل الرأسى للحامل الذاتي المار من A وبالتالي $\vec{V}_G = \vec{cte}$.

ب- اجرد القوى المطبقة على الحامل الذاتي أثناء حركته . حدد المجموع المتجهي لهذه القوى ؟

المجموعة المدرosa : {الحامل الذاتي}

جرد القوى: \vec{P} وزن الحامل الذاتي و \vec{R} : القوة المطبقة من طرف المنضدة .
 القوتان \vec{P} و \vec{R} تتواءزان أي $\vec{P} = -\vec{R}$ أي $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$ ، نقول أن الحامل الذاتي شبه مغزول ميكانيكي لأن مجموع متتجهة القوى المسلطة عليه منعدم .

ج- إذا تم اختيار الجسم المرجعي المرتبط بالنقطة B ، هل يتحقق الشرطان $\sum \vec{F} = \vec{0}$ و $\vec{V}_G = \overline{cte}$. حركة G بالنسبة لـ B هي حركة دائرية منتظمة إذن $\vec{V}_G \neq \overline{cte}$ وبالتالي $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$

3-2-نص مبدأ القصور:

في معلم غاليلي ، عندما يكون جسم صلب ممزولاً ميكانيكياً (لا يخضع لأي قوة) أو شبه ممزول ميكانيكياً (أي $\vec{V}_c = \vec{cte}$) فإن $\sum \vec{F} = \vec{0}$ أي أن مركز قصور الجسم إما:

• $\vec{V}_G = \vec{0}$ في سكون

• في حركة مستقيمية منتظمة

ملحوظة:

نسمى معلماً غاليليا كل معلم يتحقق فيه مبدأ القصور

لا يتحقق مبدأ القصور إلا بالنسبة لمعالم غاليلية ، ويعتبر المرجع الأرضي معلما غاليليا إذا كانت مدة الحركة قصيرة ، كما يعتبر كل جسم مرجعي ساكن أو في حركة إزاحة مستقيمية منتظمة بالنسبة للمرجع الأرضي معلما غاليليا .

نسمى حركة مركز قصور الجسم بالنسبة لمعلم غاليلي الحركة الإجمالية ، ونسمى حركة النقط الأخرى للجسم بالنسبة لمركز القصور الحركة الخاصة .

٤- العلاقة المرجحية:

١-٤ مركز الكتلة :

نسمى مركز الكتلة C لمجموعة مادية مكونة من نقط مادية ذات كتلة m_i مرجح هذه النقط بحيث:

$$\sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{CA}_i = m_1 \overrightarrow{CA}_1 + m_2 \overrightarrow{CA}_2 + m_3 \overrightarrow{CA}_3 + \cdots + m_n \overrightarrow{CA}_n = \overrightarrow{0}$$

ملاحظة:

يتطابق مركز الكتلة C لمجموعة مادية مركز قصورها G وبالتالي نكتب: $\sum_{i=1}^n m_i \vec{GA}_i = \vec{0}$ بالنسبة للأجسام الصلبة المتجانسة (قضيب ، عارضة ...) ، ينطبق مركز قصورها مع مركز ثقلها .

2-4. العلاقة المرجحية:

ينطبق مركز الكتلة لمجموعة أجسام صلبة مع مركز قصورها G و هو في نفس الوقت مرجح مراكز الكتلة G_1, G_2, \dots, G_n لكل من الأجسام المكونة لهذه المجموعة.

و بالنسبة لمعلم (O, \vec{r}) يعبر عن هذه العلاقة المرجحية كما يلي :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum(m_i \cdot \overrightarrow{OG}_i)}{(\sum m_i)} \quad \text{أو} \quad (\sum m_i) \cdot \overrightarrow{OG} = \sum(m_i \cdot \overrightarrow{OG}_i)$$

تطبيق :

نربط أسطوانتين (1) و (2) على التوالي كالتالى $m_1 = 100g$ و $m_2 = 200g$ برابطة متينة كتلتها مهملة و طولها $L = 12cm$.

نعتبر أن طرفي الرابطة متطابقين مع G_1 و G_2 مركزي قصور الأسطوانتين.

نطبق العلاقة المرجحية على المجموعة ونعتبر أن G هو مركز قصور المجموعة :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum(m_i \cdot \overrightarrow{OG}_i)}{(\sum m_i)} = \frac{m_1 \overrightarrow{OG}_1 + m_2 \overrightarrow{OG}_2}{m_1 + m_2}$$

نختار O منطبق مع G_2 أي $\overrightarrow{OG}_2 = \vec{0}$

$$\overrightarrow{G_2G} = \frac{m_1 \overrightarrow{G_2G}_1}{3m_1} = \frac{\overrightarrow{G_2G}_1}{3}$$

$$G_2G = \frac{L}{3} \quad \text{إذن}$$

