


## مبدأ القصور Principe d'inertie

### I- مفعول قوة على حركة جسم :

- ✓ تتعلق طبيعة الحركة لجسم صلب بمجموع متجهات القوى المطبقة عليه .
- ✓ يمكن للقوى المطبقة على جسم صلب أن تغير مساره أو سرعته أو هما معا .
- ✓ إذا كان مجموع متجهات القوى منعدما ، فإن حركة الجسم مستقيمية منتظمة . هذا يعني أن وجود قوة ليس ضروري للحفاظ على حركة مستقيمية منتظمة .


### I- الإبراز التجاري لمركز القصور :

#### 1- تجربة رقم 1 :



نستعمل حاملًا ذاتيًا يتوفّر على مفجرين أحدهما  $A$  مثبت في محور تماثله والثاني في نقطة  $M$  من جانب سطحه السفلي .

نرسل الحامل الذاتي فوق منضدة أفقية بحيث ينزلق دون احتكاك ودون دوران ونسجل حركة المفجرين  $A$  و  $M$  أثناء مدد زمنية متتالية ومتّساوية  $\tau = 40 \text{ ms}$  فنحصل على التسجيل التالي :




- ماذا تلاحظ ؟
  - ماذا تستنتج ؟
- استثمار :


- المسافات التي تقطعها كل من النقطتين  $A$  و  $M$  خلال مدد زمنية ومتّساوية ، متّساوية كما أن مسار كل من  $A$  و  $M$  مستقيميان ومتوازيان .
- نستنتج أن حركة كل من النقطتين  $A$  و  $M$  مستقيمية منتظمة .

## 2-تجربة رقم 2

نرسل الحامل الذاتي فوق المنضدة الأفقية بحيث ينزاح ويدور حول نفسه في آن واحد فنحصل على التسجيل التالي :



- ماذا تلاحظ ؟
  - ماذا يمكن القول بشأن حركة محور التماثل ( $\Delta$ ) المار من النقطة  $A$  .
  - ماذا يمكن القول إذا كان بإمكان الحامل الذاتي أن يتحرك على عدة أوجه ؟
- استثمار :



- للنقطة  $A$  دائماً حركة **مستقيمية منتظمة** ، بينما تأخذ النقطة  $M$  حركة منحنية ومتغيرة .
  - محور التماثل ( $\Delta$ ) يأخذ مثل النقطة  $A$  ، حركة مستقيمية منتظمة .
  - إذا كان بإمكان الحامل الذاتي التحرك على الوجه  $CD$  فإن حركة المحور ( $\Delta'$ ) تكون مستقيمية منتظمة كذلك .
- تقاطع المحورين ( $\Delta$ ) و ( $\Delta'$ ) يتم في نقطة  $G$  تسمى مركز القصور الحامل الذاتي .

## 3-خلاصة :

لكل جسم صلب نقطة واحدة خاصة تميز حركته نرمز لها ب  $G$  وتسمى مركز القصور .

## III-مبدأ القصور :

1-المجموعة شبه معزولة ميكانيكيا :



أ-تعريف :

الجسم المعزول ميكانيكيا هو الذي لا يخضع لأي تأثير ميكانيكي .

الجسم الشبه معزول هو الذي تكون القوى المطبقة عليه متوازنة فيما بينها ، أي أن مجموع متجهتها منعدم  $\sum \vec{F} = \vec{0}$  .

ب-مثال :

الحامل الذاتي فوق المنضدة الهوائية الأفقية ، وعند تشغيل المقصافة الهوائية يعتبر شبه معزول ، لأنه يخضع لقوى  $\vec{P}$  وزنه و  $\vec{R}$  تأثير المنضدة .



القوتان متوازنتان نكتب :  $\vec{R} + \vec{P} = \vec{0}$

نقول إن الحامل الذاتي شبه معزول ميكانيكيا .

ملحوظة :

في حالة المنضدة المائلة يصبح الحامل الذاتي جسم غير شبه معزول حيث :

$$\vec{R} + \vec{P} \neq \vec{0}$$

## 2-نص مبدأ القصور :

في معلم غاليلي ، عندما يكون جسم صلب معزولا ميكانيكيا أو شبه معزول ، فإن متجهة سرعة مركز قصوره تكون ثابتة فيكون مركز قصور الجسم في إحدى الحالتين التاليتين :

❖ إذا كان في حالة سكون ، فإنه يبقى في حالة سكون .

❖ إذا كان في حالة حركة ، فإن حركة مركز قصوره  $G$  تكون مستقيمية منتظامه أي متجهة سرعته ثابتة

$$\vec{V}_G = \vec{C}te$$

ملحوظة :

المعلم الغاليلي هو المعلم الذي يتحقق فيه مبدأ القصور .

## IV-الحركة الإجمالية والحركة الخاصة :

- ✓ الحركة الإجمالية لجسم صلب هي حركة مركز قصوره .
- ✓ الحركة الخاصة لجسم صلب هي حركة باقي نقطه حول مركز قصوره .
- ✓ في مرجع غاليلي الحركة الإجمالية تكون مستقيمية منتظمة والحركة الخاصة تكون دوران منتظم ، إذا كان الجسم معزولاً أو شبه معزول ميكانيكيا .

## V-مركز الكتلة :

### 1-تعريف :


المجموعة المادية  $S$  تتكون من النقط  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  ذات الكتل  $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$  تحقق العلاقة :

$$(2) \quad \overrightarrow{OG} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \cdot \overrightarrow{OA_i}}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad \text{ومنها نستنتج العلاقة:} \quad (1) \quad \sum_{i=1}^n m_i \cdot \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$$

نسمى العلقتين (1) و (2) العلاقة المرجحية ،  $G$  مرجع *barycentre* المجموعة  $S$  والذي يتطاير تماماً مع مركز الكتلة  $\sum_{i=1}^n m_i = m$  كتلة المجموعة  $S$  .

### 2-مثال :

نربط حاملين ذاتيين متجانسين  $S_1$  و  $S_2$  كتلتهما على التوالي :  $m_1 = 700 \text{ g}$  و  $m_2 = 1400 \text{ g}$  بقضيب كتلته مهملة بحيث المسافة بين مركزي قصور الحاملين الذاتيين هي :  $G_1G_2 = 45 \text{ cm}$  . أوجد المسافة  $GG_2$  بين  $G$  مركز قصور المجموعة و  $G_2$  مركز قصور الحامل  $S_2$  .



العلاقة المرجحية تكتب :

$$m_1 \cdot \overrightarrow{GG_1} + m_2 \cdot \overrightarrow{GG_2} = \vec{0} \Rightarrow 700 \cdot \overrightarrow{GG_1} + 1400 \cdot \overrightarrow{GG_2} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{GG_1} = -2 \cdot \overrightarrow{GG_2}$$

$$\overrightarrow{GG_2} + \overrightarrow{G_2G_1} = -2 \overrightarrow{GG_2} \Rightarrow 3 \overrightarrow{GG_2} = \overrightarrow{G_1G_2} \Rightarrow \overrightarrow{GG_2} = \frac{\overrightarrow{G_1G_2}}{3} \Rightarrow GG_2 = \frac{45}{3} = 15 \text{ cm}$$

ملحوظة :

ينطبق مركز الكتلة لمجموعة أجسام صلبة متجانسة مع مركز قصورها  $G$  .

3-مركز قصور بعض الاجسام الصلبة المتجانسة :

