

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

تمارين في دروس

استخراج و فصل و تصنيع الأنواع الكيميائية و المجهّمه بعدها

تمرين 1

النوع الكيميائي المسؤول عن رائحة و مذاق أحد مكونات اللوز المر الطبيعي والذي نرمز له بـ (AA) هو Benzaldéhyde والذي نرمز له اختصاراً بـ (B) و لكتفته حضوره في المختبر و نسميه البنز الدييد التجاري .

نريد التتحقق من صحة لصيقة لشراب كتب عليها "شراب من مستخلص اللوز الطبيعي" نأخذ 10ml من الشراب و نضيف إليه مذيباً عضوياً و نعزل الطور المائي عن الطور العضوي لنجعل على السائل (S). الشكل جانبه يعطي نتائج التحليل بواسطة CCM

1- كم عدد مكونات الشراب (S) و اللوز الطبيعي؟

2- هل مستخلص اللوز الطبيعي (AA) والشراب يحتويان على (B)، علّ.

3- هل اللصيقة على قنينة الشراب توافق التحليل الكروماتوغرافي؟ وما مرد المذاق الذي يتميز به الشراب؟

4- اعتماداً على الجدول التالي أي مذيب أكثر ملائمة لاستخراج (B)؟ علّ جوابك.

المذيب	الكحول	الماء	الإثير
(ذوبانية)(B)	جيده جدا	جيده جدا	0.80
امتصاص مع الماء	نعم	---	0.71
			جيده جدا

5- اقترح طريقة لاستخراج الزيت الأساسي للوز من اللوز.

تمرين 2

يحتوي أنبوب اختبار على كتلة $m_1 = 20\text{ g}$ من التولوين و كتلة $m_2 = 8,7\text{ g}$ من الماء.

نعطي: الكثافة الحجمية للماء $\rho_e = 1\text{ g/cm}^3$ و كثافة التولوين بالنسبة للماء $d = 0,87$.

(1) أرسم أنبوب الإختبار محدداً عليه الطور المائي و الطور العضوي .

(2) أحسب V_1 حجم التولوين و V_2 حجم الماء ثم إستنتج V_T حجم الخليط .

(3) أحسب الكثافة الحجمية لل الخليط .

تمرين 3

1- نعتبر الأنواع الكيميائية التالية: - غاز البوتان - الماء - السليولوز - المطاط - كلورور الصوديوم.

1-1: بين كيف يمكن تمييز بين نوع كيميائي عضوي و آخر غير عضوي .

1-2: صنف الأنواع الكيميائية المذكورة إلى عضوية وغير عضوية .

2- لاجزاء تصنيع الأسبرين، نسخن بالارتفاع خليطاً من حمض الساليسيليك واندري الايثانويك في حوجلة تحتوي على حبيبات الخفاف. يتكون أيضاً خلال التفاعل، حمض الايثانويك . بعد التفاعل نضيف ماء بارداً إلى الخليط التفاعلي فنلاحظ تكون بلورات الأسبرين الغير الحالص.

2-1: أعط تبيّنة التركيب التجاري مع ذكر أسماء مكوناته.

2-2: ما الغاية من التسخين بالإرتفاع اشترح مبدأه؟ ثم ما دور حجر خفان في هذه التجربة؟

2-3: هل الأسبرين قابل للتذوبان في الماء البارد؟ علّ جوابك؟

3-4: كيف يمكن جمع بلورات الأسبرين؟

3-5: حدد المتفاعلات والنواتج لهذا التفاعل؟ اكتب معادلة التفاعل دون استعمال الصيغ؟

3-6: اقترح طريقة للتحقق من هوية النوع الكيميائي المصنوع؟

3- داخل حوض للتحليل الكروماتوغرافي، يحتوي على $ml = 15$ من السيكلوهكسان 99% كثافته $d=0.78$ ، نتج التحليل الكروماتوغرافي

على صفيحة رقيقة أبعادها $10\text{cm} \times 5\text{cm}$ للمحاليل التالية: - A - أسيتات الليناليل حيث $R_f(A)=0.71$ - B - اللينالول حيث $R_f(B)=0.34$ و - C - خليط من المحلولين A و B. نسحب صفيحة التحليل الكروماتوغرافي من حوض التحليل عندما تبتعد مقدمة المذيب ب 6.5cm عن خط الوضع. A و B و C أنواع كيميائية غير ملونة.

3-1: ماذا تمثل العلامة 99% ؟

3-2: أحسب كثافة السيكلوهكسان الموجودة داخل حوض التحليل الكروماتوغرافي.

3-3: أرسم حبة التصفيق تحتوي على السيكلوهكسان والماء مبيناً طبيعة كل طور.

3-3: عرف التحليل الكروماتوغرافي.

3-4: أذكر ثلاثة تقييمات لإظهار التحليل الكروماتوغرافي.

3-5: اعتماداً على المعطيات السابقة مثل رسم التحليل الكروماتوغرافي المحصل ، و حلله .

تمرين 4

ينتج عطر الياسمين او ايتوانات البانزيل (Eb) عن تفاعل حمض الايثانويك (Ae) مع كحول البانزيل (Ab). يتم هذا التفاعل في تركيب الارتفاع باستعمال $V_{Ae} = 30\text{ ml}$ من حمض الايثانويك و $ml = 20 = V_{Ab}$ من حمض البانزيل.

1 - اعط تبيّنة التركيب التجاري مع تسمية كل مكون.

2 - باستعمال معطيات الجدول جانبه، احسب كثافة كل من حمض الايثانويك (Ae) و كحول البانزيل (Ab) المستعملين. واستنتاج كثافة الخليط التفاعلي.

نعطي الكثافة الحجمية للماء $\rho_e = 1\text{ g/cm}^3$

3 - عند نهاية التفاعل نحصل على طورين :

3-1. ما اسم العدة التجريبية التي تستعمل لفصل هادين الطورين.

3-2. كيف يتم فصلهما، اشرح ذلك موضحاً موضع الطورين.

3-4. كيف يمكن أن نتحقق من أن النوع الكيميائي المحصل عليه خالص .