

# المول - كمية المادة

*la mole - quantité de matière*



الجذع المشترك  
الكيمياء

## 1- المول :

### 1-1- نشاط :

لتحديد عدد ذرات الحديد  $^{56}_{26}Fe$  المتواجدة في مسمار من حديد ، نقيس كتلته بواسطة ميزان إلكتروني . نعتبر المسمار مكوناً فقط من ذرات الحديد  $^{56}_{26}Fe$  .

نعطي: كتلة النويات هي  $m_p = m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} kg$

أ- احسب كتلة ذرة واحدة من الحديد  $^{56}_{26}Fe$  .

بما أن كتلة الذرة متمركزة في نواتها فإن الكتلة التقريرية لذرة الحديد هي

$$m(^{56}_{26}Fe) \approx A \cdot m_p = 56 \times 1,67 \cdot 10^{-27} = 9,35 \cdot 10^{-26} kg$$

ب- استنتج  $N$  عدد ذرات الحديد  $^{56}_{26}Fe$  المتواجدة في المسمار .

لدينا عدد ذرات الحديد  $^{56}_{26}Fe$  المتواجدة في المسمار ذي الكتلة  $m = 6,3 g$

$$\text{هو } N = \frac{m}{m(^{56}_{26}Fe)} = \frac{6,3}{9,35 \cdot 10^{-23}} = 6,7 \cdot 10^{22}$$

ج- إذا كان بالإمكان تعداد ذرة واحدة كل ثانية ، حدد المدة الزمنية اللازمة لـتعداد عدد ذرات الحديد

$^{56}_{26}Fe$  المتواجدة في المسمار . ماذا تستنتاج ؟

$$\text{لدينا } \Delta t = \frac{6,7 \cdot 10^{22}}{365 \times 24 \times 3600} = 2,1246 \cdot 10^{15} ans \quad \Delta t = 6,7 \cdot 10^{22} s \quad \text{أي } \Delta t = 6,7 \cdot 10^{22} s$$

ف تستنتج استحالة تعداد هذه الذرات .

د- نعتبر مجموعة من الرزم الورقية التي تحتوي كل واحدة منها على 500 ورقة ( انظر جانبه ) . احسب عدد الأوراق الموجودة في هذه العينة . ماذا

تقترح لحساب عدد ذرات الحديد  $^{56}_{26}Fe$  المتواجدة في المسمار السابق ؟

لدينا خمسة رزم ورقية في هذه العينة وبالتالي عدد الأوراق الموجودة في هذه العينة هو  $2500 = 5 \times 500 = N$  . نلاحظ أن عدد هذا العدد من الأوراق تم بسهولة عند تجزيء هذا العدد إلى مجموعات متساوية ، فنفترض اختيار مجموعة تحتوي على عدد لا يتغير من الذرات يسمى المول .

### 2- المول :

#### 1-2-1- عدد أفوكادرو :

نأخذ عينة من الكربون  $^{12}_6C$  كتلتها  $m = 12,00 g$  وكتلة ذرة واحدة من الكربون  $^{12}_6C$  هي  $m(^{12}_6C) = 1,992662 \cdot 10^{-23} g$  . تحتوي هذه العينة على ذرة كربون  $^{12}_6C$  حيث

$$N = \frac{m}{m(^{12}_6C)} = \frac{12,00 \cdot 10^{-3}}{12 \times 1,67 \cdot 10^{-27}} = 6,02 \cdot 10^{23} \quad \text{نسميه عدد أفوكادرو .}$$

#### 2-2-1- تعريف :

المول هو كمية المادة لمجموعة تحتوي على عدد من الدقائق ( ذرات - جزيئات - أيونات - إلكترونات ... ) يساوي عدد الذرات الموجودة في  $12g$  من الكربون  $^{12}_6C$  أي عدد أفوكادرو من الدقائق .

#### 2-2-2- ثابتة أفوكادرو :

ثابتة أفوكادرو  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} mol^{-1}$  تعبر عن عدد الدقائق في مول واحد حيث :

بالنسبة لعينة معينة من مادة ما ، تحتوي على عدد  $N$  من الدوائقي  $X$  ، تكون كمية مادة هذه العينة هي :

$$mol \leftarrow n(X) = \frac{N}{N_A}$$

## تطبيق

- أ- احسب كمية مادة الحديد المتواجدة في المسamar السابق . هل العدد المحصل عليه يدخل في نطاق السلم المعتمد استعماله ( السلم الماكروسكوبى ) ؟  
 ب- احسب عدد جزيئات الماء المتواجدة في مول واحد من الماء .

أ- لدينا  $mol(Fe) = \frac{N}{N_A} = \frac{6,7 \cdot 10^{22}}{6,02 \cdot 10^{23}} = 0,11 mol$  وهذا العدد يدخل في السلم الماكروسكوبى .


ب- لدينا  $n(H_2O) = \frac{N}{N_A} = 6,02 \cdot 10^{23}$  إذن عدد جزيئات الماء هو  $n(H_2O) = \frac{N}{N_A}$  .

ملحوظة : يمثل رمز الدقيقة مولا واحدا من هذه الدقيقة .

## 2- الكتلة المولية :

### 1- نشاط :

تمثل عينات المواد المتواجدة في الشكل أسفله مولا واحدا من كل مادة ، تم قياس كتلها بواسطة ميزان إلكتروني .



أ- بين أن هذه العينات تضم نفس عدد الأنواع الكيميائية . وأعط قيمة هذا العدد .

لدينا  $n(S) = n(Ag) = n(NaCl) = n(C_6H_{12}O_6) = 1 mol$  أي  $\frac{N(S)}{N_A} = \frac{N(Ag)}{N_A} = \frac{N(NaCl)}{N_A} = \frac{N(C_6H_{12}O_6)}{N_A} = 1 mol$

إذن  $N(S) = N(Ag) = N(NaCl) = N(C_6H_{12}O_6) = N = 6,02 \cdot 10^{23}$  .

ب- عين قيمة ( $S$ ) كتلة مول واحدة من ذرات الكبريت ، و ( $Ag$ ) كتلة مول واحدة من ذرات الفضة . يسمى هذا المقدار الكتلة المولية الذرية . ثم قارنها مع القيمة الموجدة في الجدول الدوري .

لدينا كتلة مول واحد من ذرات الكبريت هي  $M(S) = 32 g \cdot mol^{-1}$  إذن  $m(S) = 32g$  .

لدينا كتلة مول واحد من ذرات الفضة هي  $M(Ag) = 108 g \cdot mol^{-1}$  إذن  $m(Ag) = 108 g$  . ونلاحظ أن هذه القيمة مساوية تقريباً للقيمة الموجدة في الجدول الدوري .

ج- عين قيمة  $M(NaCl)$  كتلة مول واحدة من كلورور الصوديوم ، و  $M(C_6H_{12}O_6)$  كتلة مول واحدة من جزيئات الغليوكوز . يسمى هذا المقدار الكتلة المولية الجزيئية .

لدينا كتلة مول واحد من كلورور الصوديوم هي  $m(NaCl) = 58,4 g$  إذن  $M(NaCl) = 58,4 g \cdot mol^{-1}$  .

لدينا كتلة مول واحد من الغليوكوز هي  $m(C_6H_{12}O_6) = 180 g$  إذن  $M(C_6H_{12}O_6) = 180 g \cdot mol^{-1}$  .

د- استخرج من الجدول الدوري للعناصر الكيميائية ، الكتل المولية الذرية المكونة لجزئيات كلورور الصوديوم وجزئيات الغليكوز ، ثم قارن  $M(NaCl) = M(Na) + M(Cl)$  مع  $M(C_6H_{12}O_6) = 6 \cdot M(C) + 12 \cdot M(H) + 6 \cdot M(O)$ . ماذا تستنتج ؟  
 لدينا  $M(O) = 16 g \cdot mol^{-1}$  و  $M(C) = 12 g \cdot mol^{-1}$  و  $M(H) = 1 g \cdot mol^{-1}$  و  $M(Cl) = 35,5 g \cdot mol^{-1}$  و  $M(Na) = 23 g \cdot mol^{-1}$ .  
 لدينا  $M(NaCl) = M(Na) + M(Cl) = 23 + 35,5 = 58, g \cdot mol^{-1}$ .  
 لدينا  $6 \cdot M(C) + 12 \cdot M(H) + 6 \cdot M(O) = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180 g \cdot mol^{-1}$ .  
 فنلاحظ أن  $M(C_6H_{12}O_6) = 6 \cdot M(C) + 12 \cdot M(H) + 6 \cdot M(O)$ .  
 فنستنتج أن الكتلة المولية الجزئية تساوي مجموع الكتل المولية الذرية للذرات المكونة لها .

الكتلة المولية الذرية $g \cdot mol^{-1}$	العنصر الكيميائي
$M(H) = 1,0$	الهيدروجين
$M(C) = 12,0$	الكريون
$M(N) = 14,0$	الأزوت
$M(O) = 16,0$	الأوكسجين
$M(F) = 19,0$	الفلور
$M(Mg) = 24,3$	المغنيزيوم
$M(Al) = 27,0$	الألومينيوم
$M(Si) = 28,1$	السيليسيوم
$M(P) = 31,0$	الفوسفور
$M(Fe) = 55,8$	الحديد

**2-2- الكتلة المولية الذرية :**

**الكتلة المولية الذرية** لعنصر كيميائي هي كتلة مول واحد من ذرات هذا العنصر . ويرمز لها ب  $M(X)$  . ويعبر عنها بالوحدة  $kg \cdot mol^{-1}$  وعملياً بالوحدة  $g \cdot mol^{-1}$

**ملحوظة :** حساب الكتلة المولية الذرية تعتبر العنصر الكيميائي النحاس  $Cu$  . في الحالة الطبيعية يتكون ، أساساً من النظيرين  $\frac{63}{29}Cu$  و  $\frac{65}{29}Cu$  ، وفارتهما على التوالي : 69,1% و 30,8%

كتلة مول واحد من ذرات  $\frac{63}{29}Cu$  :  $M_1 \approx A_1 = 63 g \cdot mol^{-1}$

كتلة مول واحد من ذرات  $\frac{65}{29}Cu$  :  $M_2 \approx A_2 = 65 g \cdot mol^{-1}$

إذن كتلة مول واحد من ذرات النحاس في الحالة الطبيعية هي :

$$M(Cu) = 0,691 \times M_1 + 0,308 \times M_2 = 63,5 g \cdot mol^{-1}$$

**2-3- الكتلة المولية الجزئية :**

**الكتلة المولية الجزئية** لجسم خالص هي كتلة مول واحد من جزيئات هذا الجسم ، وتتساوي مجموع الكتل المولية الذرية للذرات المكونة لجزيئه . ويعبر عنها بالوحدة  $g \cdot mol^{-1}$ .

**2-4- العلاقة بين الكتلة وكمية المادة :**

تعرف **كمية المادة** ( $X$ ) لعينة كتلتها ( $m(X)$  مكونة من نوع كيميائي  $X$  كتلته المولية ( $M(X)$  بالعلاقة :

$$mol \leftarrow n(X) = \frac{m(X)}{M(X)} \quad \begin{matrix} \rightarrow g \\ \rightarrow g \cdot mol^{-1} \end{matrix}$$

**مثال :**

كمية مادة الحديد الموجودة في المسamar السابق هي  $n(Fe) = \frac{m}{M(Fe)} = \frac{6,3}{55,8} = 0,11 mol$

**3- تحديد كمية مادة جسم غازي :**

**3-1- الحجم المولي :**

**الحجم المولي**  $V_m$  لغاز هو الحجم الذي يشغل مول واحد من هذا الغاز في ظروف تجريبية معينة لدرجة الحرارة والضغط . يعبر عنه بالوحدة  $m^3 \cdot mol^{-1}$  وعملياً بالوحدة  $L \cdot mol^{-1}$

**3-2- العلاقة بين الحجم وكمية المادة :**

تعرف **كمية المادة** ( $X$ ) لعينة من غاز حجمها ( $V$ ) مكونة من نوع كيميائي  $X$  ، موجودة في ظروف تجريبية معينة لدرجة الحرارة والضغط ، بالعلاقة :

$$mol \leftarrow n = \frac{V(X)}{V_m} \quad \begin{matrix} \rightarrow L \\ \rightarrow L \cdot mol^{-1} \end{matrix}$$

### 3-3- قانون أفوگادرو – أمبير:

#### 1-3- نشاط :

نعطي في الجدول أسفله قيم  $m$  كتلة الحجم  $V = 0,533 L$  لبعض الغازات في نفس الظروف التجريبية لدرجة الحرارة والضغط .

$H_2$	$CH_4$	$C_2H_4$	$O_2$	صيغة جزيئية الغاز
0,042	0,330	0,577	0,665	كتلته $m(g)$
2	16	28	32	الكتلة المولية الجزيئية $M(g.mol^{-1})$
0,021	0,021	0,021	0,021	كمية المادة $n(X) = \frac{m}{M} (mol)$
25,38	25,38	25,38	25,38	الحجم المولي $V_m = \frac{V}{n} (L.mol^{-1})$

أ- أتمم الجدول أعلاه .

انظر أعلاه .

ب- قارن قيم كمية مادة الغازات المدروسة ثم قيم حجمها المولي .  
نلاحظ أن نفس كمية المادة  $n(X) = 0,021 mol$  ل مختلف الغازات تشغّل نفس الحجم المولي  $V_m = 25,38 L.mol^{-1}$  في نفس الظروف التجريبية لدرجة الحرارة والضغط .

#### 3-3- نص قانون أفوگادرو – أمبير :

في نفس الظروف التجريبية لدرجة الحرارة والضغط ، يشغل مول واحد من الأنواع الكيميائية في الحالة الغازية نفس الحجم المولي كيف ما كانت طبيعة الغاز .

ملحوظة :

+ قيمة الحجم المولي في الظروف النظامية (  $P = 1atm = 101325Pa$  و  $\theta = 0^\circ C$  ) هي  $V_m = 22,4 L.mol^{-1}$

+ قيمة الحجم المولي في الظروف الاعتيادية (  $P = 1atm = 101325Pa$  و  $\theta = 20^\circ C$  ) هي  $V_m = 24,0 L.mol^{-1}$

#### 4- كثافة غاز :

تعرف كثافة غاز ، بالنسبة للهواء ، بأنها خارج قسمة الكتلة  $m$  لحجم  $V$  من هذا الغاز على الكتلة  $m_a$  للحجم نفسه من الهواء ، شريطة أن يؤخذ الغاز والهواء في نفس الشروط لدرجة الحرارة والضغط .

$$d = \frac{m}{m_a} = \frac{M}{M_a}$$

ملحوظة :

في الظروف النظامية ، يكون الحجم المولي هو  $V_m = 22,4 L.mol^{-1}$  و الكتلة الحجمية للهواء هو  $\rho_a = 1,293 g.L^{-1}$  وبالتالي الكتلة المولية للهواء هي

$$M_a = \rho_a \cdot V_m = 1,293 \times 22,4 = 29 g.mol^{-1}$$

إذن ، يعبر عن كثافة الغاز في الظروف النظامية بالعلاقة :

#### 4- معادلات الحالة للغازات الكاملة :



#### 4- متغيرات الحالة للغاز :

تتميز حالة غاز بأربعة مقادير فизيائية عينية وهي : الضغط  $P$  والحجم  $V$  ودرجة الحرارة  $T$  وكمية المادة  $n$  . وتسمى هذه المتغيرات بمتغيرات الحالة .

## 1-1-4-نشاط :

■ نحجز في محقق مرتبط بالمانومتر عينة من الهواء لا تتغير كميته ، ثم ندفع بببطء المكبس ونسجل القيم التالية .

35	30	25	20	15	V(mL)
42,8	50,0	60,0	75,0	100,0	P(hPa)
1498	1500	1500	1500	1500	P.V



أ- ما الفائدة من دفع أو جر المكبس ببطء ؟

نقوم بالدفع أو الجر ببطء من أجل أن تبقى درجة الحرارة ثابتة .

ب- أتمم ملأ الجدول ثم استنتج العلاقة التي تجمع الضغط بالحجم .

انظر أعلاه ، نلاحظ أن  $P.V = Cte$  فكلما انخفض الحجم V ازداد الضغط P .

■ عند تسخين الحوصلة باليدين ، تتحرك قطرة الزئبق إلى اليمين . حيث كمية الهواء المحبوس في الحوصلة لا تتغير ويبقى الضغط داخلها ثابتا .

ماذا تستنتج ؟

كلما ارتفعت درجة الحرارة T ارتفع الحجم V .

■ نسخ الهواء المحجوز داخل الحوصلة ونسجل القيم التالية .

45	20	15	8	0	-10	T( $^{\circ}$ C)
1102	1009	998	974	946	912	P(hPa)

ماذا تستنتج ؟

كلما ارتفعت درجة الحرارة T ارتفع الضغط P .

## 1-2-4-خلاصة :

تسمى المقادير الفيزيائية العينية التي تميز الغاز بمتغيرات الحالة وهي غير مستقلة حيث :

❖ كلما انخفض الحجم V ازداد الضغط P ، عندما تبقى كمية المادة ودرجة الحرارة ثابتتين .

❖ كلما ارتفعت درجة الحرارة T ارتفع الضغط P ، عندما تبقى كمية المادة والحجم ثابتين .

❖ كلما ارتفعت درجة الحرارة T ارتفع الحجم V ، عندما تبقى كمية المادة والضغط ثابتين .

❖ كلما ارتفعت كمية المادة n ارتفع الضغط P ، عندما تبقى درجة الحرارة والحجم ثابتين .

## 2-4-قانون بويل – ماريוט :

عند درجة حرارة ثابتة وبالنسبة لكمية معينة من غاز ، يبقى جداء الضغط P والحجم V الذي يشغله هذا الغاز ثابتا .  $P.V = Cte$  . تتعلق الثابتة بدرجة الحرارة وبكمية المادة والوحدات المختارة .

## 3-4-نموذج الغاز الكامل :

الغاز الكامل هو غاز نموذجي يخضع خصوصياتاً لقانون بويل – ماريوت وقانون أفوگادرو – أمبير . وتجربياً ، يتحقق ذلك بتطبيق ضغط منخفض على الغاز ( $P \leq 10^6 Pa$ ) وتبقي درجة حرارته بعيدة عن درجة حرارة إسالته .

## 4-4-معادلة الحالة للغازات الكاملة :

بيّنت التجارب أن متغيرات الحالة لغاز مرتبطة فيما بينها بالعلاقة التالية :

والتي تسمى **معادلة الحالة للغازات الكاملة** حيث R ثابتة الغازات الكاملة مع

$R = 8,314 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$  أو  $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

## 4-5-درجة الحرارة المطلقة :

درجة الحرارة المطلقة T يعبر عنها بالوحدة الكلفين K . حيث :

تسمى درجة الحرارة بالصفر المطلق .