

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

تمارين

تمرين 1

- يتفاعل أيون الألومنيوم Al^{3+} مع أيون الهيدروكيد OH^- حيث يتكون راسب أبيض هيدروكسيد الألومنيوم صيغته $\text{Al}(\text{OH})_3$.
1. أكتب معادلة التفاعل المتوازنة.
 2. نجعل $n(\text{Al}^{3+}) = 0,2\text{mol}$ تتفاعل مع $n(\text{OH}^-) = 0,3\text{mol}$
 - أ- أنجز الجدول الوصفي لهذا التحول.
 - ب- حدد التقدم الأقصى و استنتج المتفاعل المد.
 - ج- أحسب كتلة الراسب المنتكون

تمرين 2

- نحرق 4g من الحديد Fe في حجم $V=1\text{L}$ من غاز ثاني الأوكسجين، وفق المعادلة: $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$
- 1- أنجز جدولًا لتطور التفاعل الحاصل بين الحديد و غاز ثاني الأوكسجين
 - 2- أحسب كمية مادة كل من الحديد و غاز ثاني الأوكسجين في الحالة البدئية
 - 2- أحسب كمية مادة كل من الحديد و غاز ثاني الأوكسجين عندما يأخذ التقدم القيمة $x = 0,05\text{mol}$.
 - 3- أوجد قيمة التقدم الأقصى x_{\max} .
 - 4- أحسب كمية مادة كل متفاعلة في الحالة النهائية، و استنتاج المتفاعل المد
الحجم المولاي $V_m = 24 \text{ l.mol}^{-1}$.

تمرين 3

- عند الشروط العاديّة لدرجة الحرارة والضغط $P = 1\text{ atm}$ و $\theta = 20^\circ\text{C}$ ، $m=6\text{g}$ ، نحرق طرف شريط من المغنتيوم (Mg) كتلته m ثم ندخله بسرعة في قارورة توجد فيها كمية وافرة من غاز ثاني الكلور (Cl_2) فيحدث تفاعل شديد يتوقف بعد احتراق شريط المغنتيوم بأكمله ، حيث ينتج عن هذا التفاعل جسم صلب أبيض ، هو كلورور المغنتيوم (MgCl_2) كتلته $g = 23,75 \cdot m$.
1. مثل خطاطة التحول الكيميائي الحاصل محدداً الحالة البدئية وال حالة النهائية
 2. حدد المتفاعلات والتواتج.
 3. أكتب المعادلة المتوازنة للتفاعل الحاصل.
 4. أحسب $n(\text{Mg})$ كمية مادة المغنتيوم المتوازنة في الكتلة m لشريط المغنتيوم
 5. أوجد V كتلة غاز ثاني الكلور المتفاعلة ، ثم استنتاج $V(\text{Cl}_2)$ حجمه المتفاعله.
- نعطي: $V_m = 24 \text{ g.mol}^{-1}$.

تمرين 4

- نأخذ حجما $V_1 = 20\text{ml}$ من محلول S_1 لكبريتات النحاس II تركيزه $C_1 = 0,1\text{mol.l}^{-1}$ و حجما $V_2 = 20\text{ml}$ من محلول S_2 لهيدروكسيد الصوديوم $C_2 = 0,1\text{mol.l}^{-1}$ ثم نخلط المحلولين .
- 1- اجرد الأنواع الكيميائية المكونة للمجموعة الكيميائية في الحالة البدئية محدداً الحالة الفيزيائية لكل نوع .
 - 2- اعط الأنواع الكيميائية المكونة للمجموعة الكيميائية في الحالة النهائية محدداً الحالة الفيزيائية لكل نوع .
 - 3- اكتب المعادلة الحصيلة المتوازنة للتفاعل الحاصل .
 - 4- احسب كمية المادة البدئية لكل من المتفاعلات
 - 5- حدد التقدم الأقصى x_m للتفاعل و المتفاعل المد و استنتاج حصيلة المادة .

تمرين 5

- 1- أكتب معادلة احتراق الكربون في غاز ثاني الأوكسجين.
- 2- نحرق $1,3\text{mol}$ من الكربون في 4mol من غاز ثاني الأوكسجين.
- 2-1: أنجز جدولًا لتطور التفاعل الحاصل بين الكربون و غاز ثاني الأوكسجين 2-2: أحسب كمية مادة كل من الكربون و غاز ثاني أوكسيد الكربون عندما يأخذ التقدم القيمة $x = 0,2\text{mol}$.
- 3- تكون قيمة التقدم الأقصى هي: $x_{\max} = 1,3\text{mol}$ ، أحسب كمية مادة كل متفاعله متبق في الحالة النهائية، و استنتاج المتفاعل المد .

تمرين 6

- يحترق الألومنيوم في ثاني الأوكسجين، فينتج عنه أوكسيد الألومنيوم Al_2O_3 .
- 1- أكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل و وزنه.
 - 2- ندخل $0,54\text{g}$ من الألومنيوم في قارورة تحتوي على $1,44\text{l}$ من غاز ثاني الأوكسجين.
 - 2-1: أحسب كمية مادة المتفاعلات في الحالة البدئية. نعطي: $M(\text{Al}) = 27\text{g.mol}^{-1}$ و $V_m = 24\text{l.mol}^{-1}$
 - 2-2: أحسب التقدم الأقصى x_{\max} للتفاعل .
 - 2-3: استنتاج حصيلة المادة في الحالة النهائية.
 - 3- مثل مبيانا تغير كميات مادة الألومنيوم و كميات مادة غاز ثاني الأوكسجين بدالة القدم x على نفس نظمة المحورين.
 - 4- استنتاج مبيانا قيمة التقدم الأقصى x_{\max} .