




## **L** Projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre droite

### a. Activité :

- Que représente le point  $M'$  pour le point  $M$  par rapport aux droites  $(D)$  et  $(\Delta)$  ?
  - Que représente le point  $M_1$  pour le point  $M$  par rapport aux droites  $(D)$  et  $(\Delta)$  ?

## **b.** Vocabulaire :

- Le point  $M'$  est appelé projection du point  $M$  sur  $(D)$  parallèlement à la droite  $(\Delta)$ .
  - La droite  $(\Delta)$  est appelé la direction de la projection .
  - Le point  $M_1$  est appelé projection du point  $M$  sur  $(\Delta)$  parallèlement à la droite  $(D)$ .



### c. Définition :

- (D) et ( $\Delta$ ) sont deux droites sécantes en O .  
M est un point du plan (P) .  
• La droite qui passe par le point M et parallèle à la droite ( $\Delta$ ) coupe la droite (D) en un point M' est appelé la projection du point M sur (D) parallèlement à la droite ( $\Delta$ ) .

#### **d. Remarques :**

- La relation qui relie tout point  $M$  du plan  $(P)$  on associe un point unique  $M'$  de  $(P)$  ; cette relation on le note par  $p$  ou  $q$  ..
  - Cette relation on la schématisse de la façon suivante 
$$p : (P) \rightarrow (P) \\ M \mapsto p(M) = M'$$
.
  - $p(M) = M'$  ; On dit que  $M$  a pour image le point  $M'$  par la projection  $p$  .( ou bien  $M'$  est l'image de  $M$  par rapport à la projection  $p$  .

### e. Exercice :

## La projection sur un axe :

- ✓ **(D)** et **(Δ)** sont deux droites sécantes en **O** rapportés respectivement aux repères  $(O, \overrightarrow{OA})$  et  $(O, \overrightarrow{OB})$   
.
  - ✓ Le point  $M'$  est la projection du point  $M$  sur **(D)** parallèlement à la droite **(Δ)**. On a  $\overrightarrow{OM'} = x\overrightarrow{OA}$  avec  $x$  est l'abscisse du point  $M'$  par rapport au repère  $(O, \overrightarrow{OA})$
  - ✓ Le point  $M_1$  est la projection du point  $M$  sur **(Δ)** parallèlement à la droite **(D)**. On a  $\overrightarrow{OM_1} = y\overrightarrow{OB}$  avec  $y$  est l'abscisse du point  $M'$  par rapport au repère  $(O, \overrightarrow{OB})$

1. Montrer que :  $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$  .



f. Cas particulier :

- Si  $(\Delta) \perp (D)$ , le point  $M'$  est appelé la projection orthogonale de  $M$  sur la droite  $(D)$ .
- La relation  $p$  est appelé la projection orthogonale dans le plan  $(P)$ .
- Si  $(\Delta) \not\perp (D)$  La relation  $p$  est appelé projection oblique ou simplement projection.

III. Exprimons théorème de Thales et la réciproque du théorème de Thales en utilisons la projection :

a. Activité :

1. Enoncé le théorème direct de Thales puis l'exprimer en utilisant la projection.
2. Enoncé le théorème réciproque de Thales puis l'exprimer en utilisant la projection.


b. théorème direct de Thales :

- $(D_1)$  et  $(D_2)$  sont deux droites sécantes en  $O$
- Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts de  $O$
- Soient  $A'$  et  $B'$  deux points distincts de  $O$
- les droites  $(AA') \parallel (BB')$

$$\text{alors } \frac{OB}{OA} = \frac{OB'}{OA'} = \frac{BB'}{AA'}$$

théorème direct de Thales exprimer en utilisant la projection :

- $(D)$  et  $(\Delta)$  sont deux droites sécantes à une troisième droite.
- $A$  et  $B$  et  $C$  trois points distincts alignés tel que  $(AB)$  n'est pas parallèle à  $(\Delta)$
- $A'$  et  $B'$  et  $C'$  leurs projections respectivement sur  $(D)$  parallèlement à  $(\Delta)$



c. théorème réciproque de Thales :

- $(D)$  et  $(\Delta)$  sont deux droites sécantes en  $A$ .
- $A$  et  $B$  et  $C$  sont trois points de  $(D)$   $A'$  et  $B'$  et  $C'$  sont trois points de  $(\Delta)$  dans le même ordre que  $A$  et  $B$  et  $C$
- $\frac{AC}{AB} = \frac{AC'}{AB'}$

$$\text{alors } (BB') \parallel (CC')$$



théorème réciproque de Thales exprimer en utilisant la projection :

- (D) et ( $\Delta$ ) sont deux droites sécantes
- A et B et C trois points distincts et non alignés du plan (P)
- A' et B' sont les projections de A et B respectivement sur (D) parallèlement à ( $\Delta$ ).
- C est un point de (D) tel que A', B' et C sont dans le même ordre de A et B et C et  $\frac{A'C'}{A'B'} = \frac{AC}{AB}$

alors C'est la projection de C sur (D) parallèlement à ( $\Delta$ )


### III. Conservation du coefficient de colinéarité de deux vecteurs :

#### a. Activité :

On considère la figure ci-contre :

1. Construire G' la projection de G sur (D) parallèlement à la droite ( $\Delta$ ).
2. Ecrire  $\vec{AG}$  en fonction de  $\vec{AB}$ . Puis  $\vec{A'G'}$  en fonction de  $\vec{A'B'}$ .
3. Ecrire  $\vec{AB}$  en fonction de  $\vec{CD}$ . Puis  $\vec{A'B'}$  en fonction de  $\vec{C'D'}$ .
4. Donner la propriété :

#### b. Propriété :



- (D) et ( $\Delta$ ) sont deux droites sécantes
- A et B et C et D et I sont des points plan (P)
- A' et B' et C' et D' et I' sont leurs projections respectivement sur (D) parallèlement à ( $\Delta$ ).
- $\vec{CD} = k \vec{AB}$
- I est le milieu de [AB]

alors

- $\vec{C'D'} = k \vec{A'B'}$
- I' est le milieu de [A'B']

#### c. Remarque :

- Dans l'écriture  $\vec{CD} = k \vec{AB}$  le nombre k s'appelle le coefficient de colinéarité des vecteurs  $\vec{CD}$  et  $\vec{AB}$ .
- Dans la propriété si  $\vec{CD} = k \vec{AB}$  alors  $\vec{C'D'} = k \vec{A'B'}$  on dit la projection conserve le coefficient de colinéarité de deux vecteurs