

# FONCTIONS - Généralités

Leçon : FONCTIONS - Généralités

## Présentation globale

Chapitre n° 1

### I) Définitions et Domaine de définitions.

1 Définitions

2 Exemples

3 Domaine de définitions.

Chapitre n° 2

### II) Egalité de deux fonctions – Représentations graphique

1 Egalité de deux fonctions

2 Représentations graphique

Chapitre n° 3

### III) Fonctions paires et Fonctions impaires

1 Définitions

2 le graphe et la parité de la fonction

Chapitre n° 4

### IV) Les variations d'une fonction numérique

1 Fonction croissante -décroissante -fonction constantes

2 Le taux d'accroissement d'une fonction

Chapitre n° 5

### V) Les extrema d'une fonction numérique

VI) Etude et représentation graphique des fonctions  $x \xrightarrow{f} ax^2$

VII) Etude et représentation graphique des fonctions  $x \xrightarrow{f} ax^2 + bx + c$

VIII) Etude et représentation graphique des fonctions :  $x \xrightarrow{f} \frac{a}{x}$

IX) Etude et représentation graphique des fonctions homographique :  $x \xrightarrow{f} \frac{ax+b}{cx+d}$

## I) Définitions et Domaine de définitions

### 1°) Définitions

**Définition :** Une fonction est un procédé qui à un nombre  $x$  appartenant à un ensemble  $D$  associe un nombre  $y$ . On note :  $x \xrightarrow{f} y$  ou encore  $f : x \mapsto y$  ou encore  $y = f(x)$

On dit que  $y$  est l'image de  $x$  par la fonction  $f$  et que  $x$  est un antécédent de  $y$  par la fonction  $f$

### 2°) Exemples

Les fonctions numériques sont, le plus souvent, définies par une expression mathématique, comme par exemple :

$$f(x) = x^2 + 2x - 5 \quad \text{où} \quad g(x) = \frac{3x^3 + 2x^2 - 1}{5x^2 - 4}. \quad \text{où} \quad h(x) = \frac{2x - 1}{5x - 4} \quad \text{où} \quad l(x) = \sqrt{x} \quad \text{où}$$

$$R(x) = \frac{\sin x - \cos x}{\tan x}$$

$f$  S'appelle une fonction polynôme

$g$  S'appelle une fonction rationnelle

$h$  S'appelle une fonction rationnelle et s'appelle aussi une fonction homographique

Une fonction homographique s'écrit sous la forme :  $h(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$

$l$  S'appelle la fonction racine carré

$R$  S'appelle la fonction circulaire ou fonction trigonométrique

#### Exemple 1

Soit la fonction  $f$  définie par,  $f(x) = 3x^2 - 1$

1) Calculer l'image de 1 et  $\sqrt{2}$  et -1 par  $f$ .

2) Déterminer les antécédents éventuels de 2 par  $f$ ,

Réponses : 1)  $f(1) = 3 \times 1^2 - 1 = 3 - 1 = 2$  et  $f(\sqrt{2}) = 3 \times (\sqrt{2})^2 - 1 = 6 - 1 = 5$

$$f(-1) = 3 \times (-1)^2 - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$2) f(x) = 2 \text{ssi } 3 \times x^2 - 1 = 2$$

$$\text{ssi } 3 \times x^2 = 2 + 1 \text{ssi } 3 \times x^2 = 3 \text{ssi } x^2 = 1$$

$$\text{ssi } x = -1 \text{ ou } x = 1$$

donc les antécédents éventuels de 2 par  $f$  sont -1 et 1

#### Exemple 2

Soit la fonction  $f$  définie par  $f(x) = x^3 - x^2$

Compléter le tableau de valeurs suivants :

|        |    |    |   |   |               |   |
|--------|----|----|---|---|---------------|---|
| $x$    | -2 | -1 | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | 2 |
| $f(x)$ |    |    |   |   |               |   |

### 3°) Domaine de définitions

#### ACTIVITES

a. On considère la fonction définie par :  $x \xrightarrow{f} \frac{1}{x-3}$

Parmi les valeurs suivantes, laquelle/lesquelles n'a/ont pas d'image par  $f$  ? 0 ; 2 ; -3 ; 3.

b. On considère la fonction définie par :  $x \xrightarrow{g} \sqrt{x-3}$

Parmi les valeurs suivantes, laquelle/lesquelles n'a/ont pas d'image par  $g$  ? 0 ; 2 ; -3 ; 4.

c. On considère la fonction définie par :  $x \xrightarrow{h} \frac{1}{\sqrt{7-x}}$

Parmi les valeurs suivantes, laquelle/lesquelles n'a/ont pas d'image par  $h$  ? 5 ; -6 ; 9 ; 7.

#### DEFINITION

Pour une fonction  $f$  donnée, l'ensemble de tous les nombres réels qui ont une image calculable par cette fonction est appelé ensemble de définition de la fonction  $f$ , que l'on notera  $D_f$

#### Exemple 1

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes définie par

1)  $f(x) = 3x^2 - x + 1$ . 2)  $f(x) = \frac{x^3}{2x-4}$ . 3)  $f(x) = \frac{2x^4}{x^2-4}$ . 4)  $f(x) = \frac{7x-1}{x^3-2x}$ .

5)  $f(x) = \sqrt{-3x+6}$ . 6)  $f(x) = \frac{x-5}{2x^2-5x-3}$ . 7)  $f(x) = \sqrt{x^2-3x+2}$ . 8)  $f(x) = \sqrt{\frac{-3x+9}{x+1}}$ .

9)  $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{-2x^2+x+3}}$ . 10)  $f(x) = \frac{|x-5|}{x^2+1}$ . 11)  $f(x) = \frac{\sqrt{|x|}}{x}$ . 12)  $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$ .

13)  $f(x) = \sqrt{-2x^2+x+3}$ . 14)  $f(x) = \frac{|x-5|}{x^2+1}$ . 15)  $f(x) = \frac{\sqrt{|x|}}{x}$ . 16)  $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{2x+4}$ .

17)  $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{x} + \sqrt{-x}$ . 18)  $f(x) = \frac{x}{|2x-4|-|x-1|}$ . 19)  $f(x) = \frac{2 \sin x}{2 \cos x - 1}$ .

20)  $f(x) = \sqrt{\frac{-2x^2+2x+13}{x^2-x-6}}$ . 21)  $f(x) = \sqrt{x^2 + (2\sqrt{3}-\sqrt{2})x - 2\sqrt{6}}$ .

#### Solutions

1)  $f(x) = 3x^2 - x + 1$

$f$  est une fonction polynôme donc un réel a toujours une image.

Donc  $D_f = \mathbb{R}$

2)  $f(x) = \frac{x^3}{2x-4}$ .

Pour les fonctions du type fractions rationnelles, l'ensemble de définition est l'ensemble des nombres pour lesquels le dénominateur est non nul.

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2x-4 \neq 0\}$

$2x-4=0$ ssi  $x=\frac{4}{2}=2$  Donc  $D_f = \mathbb{R} - \{2\}$

On dira aussi que 2 est une valeur interdite pour la fonction  $f$

3)  $f(x) = \frac{2x^4}{x^2 - 4}$ .

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 4 \neq 0\}$$

$$x^2 - 4 = 0 \text{ssi } x^2 - 2^2 = 0 \text{ssi } (x-2)(x+2) = 0$$

ssi  $x-2=0$  ou  $x+2=0$  ssi  $x=2$  ou  $x=-2$   
donc  $D_f = \mathbb{R} - \{-2; 2\}$

4)  $f(x) = \frac{7x-1}{x^3 - 2x}$ .

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^3 - 2x \neq 0\}$$

$$x^3 - 2x = 0 \text{ssi } x(x^2 - 2) = 0 \text{ssi } x=0 \text{ ou } x^2 - 2 = 0 \text{ssi } x=0 \text{ ou } x^2 = 2$$

ssi  $x=0$  ou  $x=\sqrt{2}$  ou  $x=-\sqrt{2}$   
donc  $D_f = \mathbb{R} - \{-\sqrt{2}; 0; \sqrt{2}\}$

5)  $f(x) = \sqrt{-3x+6}$ .

Pour les fonctions du type racine carrée, l'ensemble de définition est l'ensemble des nombres pour lesquels l'intérieur de la racine est positif

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / -3x+6 \geq 0\}$$

$$-3x+6 \geq 0 \text{ssi } -3x \geq -6 \text{ssi } x \leq \frac{-6}{-3} \text{ssi } x \leq 2$$

Donc  $D_f = ]-\infty; 2]$

6)  $f(x) = \frac{x-5}{2x^2 - 5x - 3}$ .

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2x^2 - 5x - 3 \neq 0\}$$

$$2x^2 - 5x - 3 = 0 \quad a = 2 \text{ et } b = -5 \text{ et } c = -3$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 = 7^2 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-(-5) + \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{7+5}{4} = \frac{12}{4} = 3 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{(-5) - \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{5-7}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

Donc  $D_f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}; 3\right\}$

7)  $f(x) = \sqrt{2x^2 - 3x + 1}$ .

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2x^2 - 3x + 1 \geq 0\} \text{ soit } \Delta \text{ son discriminant}$$

$$a = 2 \quad \Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1 > 0$$

$$x_1 = \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{4}{4} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

|        |           |       |     |           |
|--------|-----------|-------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $1/2$ | $1$ | $+\infty$ |
| $P(x)$ | +         | 0     | -   | 0         |

Donc  $D_f = \left] -\infty, \frac{1}{2} \right] \cup [1, +\infty[$

8)  $f(x) = \sqrt{\frac{-9x+3}{x+1}}$ .  $D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{-9x+3}{x+1} \geq 0 \text{ et } x+1 \neq 0 \right\}$

$-9x+3=0$  ssi  $-9x=-3$  ssi  $x=\frac{1}{3}$

$x+1=0$  ssi  $x=-1$

|                     |           |      |               |           |
|---------------------|-----------|------|---------------|-----------|
| $x$                 | $-\infty$ | $-1$ | $\frac{1}{3}$ | $+\infty$ |
| $-9x+3$             | +         | +    | 0             | -         |
| $x+1$               | -         | 0    | +             | +         |
| $\frac{-9x+3}{x+1}$ | -         | +    | 0             | -         |

Donc  $D_f = \left[ -1, \frac{1}{3} \right]$

9)  $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{-2x^2+x+3}}$ .

$D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} / -2x^2+x+3 > 0 \right\}$

$-2x^2+x+3=0$   $a=-2$  et  $b=1$  et  $c=3$

$\Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4 \times (-2) \times 3 = 1 + 24 = 25 = (5)^2 > 0$  Donc on a deux racines

$x_1 = \frac{-1+5}{2 \times (-2)} = \frac{4}{-4} = -1$  et  $x_2 = \frac{-1-5}{2 \times (-2)} = \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2}$

|             |           |      |       |           |
|-------------|-----------|------|-------|-----------|
| $x$         | $-\infty$ | $-1$ | $3/2$ | $+\infty$ |
| $-2x^2+x+3$ | -         | 0    | +     | 0         |

Donc  $D_f = \left[ -1, \frac{3}{2} \right]$

10)  $f(x) = \frac{|x-5|}{x^2+1}$ .  $D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} / x^2+1 \neq 0 \right\}$

$x^2+1=0$  ssi  $x^2=-1$

Cette équation n'admet pas de solution dans  $\mathbb{R}$

Donc  $D_f = \mathbb{R}$

11)  $f(x) = \frac{\sqrt{|x|}}{x}$ .

$f(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $\sqrt{|x|} \in \mathbb{R}$  et  $x \neq 0$

Or on sait que  $|x| \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$

Donc  $f(x) \in \mathbb{R}$ ssi  $x \neq 0$

Donc  $D_f = \mathbb{R} - \{0\} = \mathbb{R}^*$

$$16) \quad f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}. \quad D_f = \{x \in \mathbb{R} / x+2 \geq 0 \text{ et } x-1 \neq 0\}$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \geq -2 \text{ et } x \neq 1\}$$

$$D_f = [-2, 1[ \cup ]1, +\infty[$$

$$17) \quad f(x) = 3x^2 - \frac{1}{x} + \sqrt{-x}$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / -x \geq 0 \text{ et } x \neq 0\}$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 0 \text{ et } x \neq 0\}$$

$$D_f = ]-\infty, 0[$$

$$18) \quad f(x) = \frac{x}{|2x-4| - |x-1|}. \quad D_f = \{x \in \mathbb{R} / |2x-4| - |x-1| \neq 0\}$$

$$|2x-4| - |x-1| = 0 \quad \text{ssi} \quad |2x-4| = |x-1|$$

$$\text{ssi} \quad 2x-4 = x-1 \quad \text{ou} \quad 2x-4 = -(x-1)$$

$$\text{ssi} \quad 2x-x = 4-1 \quad \text{ou} \quad 2x-4 = -x+1$$

$$\text{ssi} \quad x = 3 \quad \text{ou} \quad 2x+x = 4+1$$

$$\text{ssi} \quad x = 3 \quad \text{ou} \quad 3x = 5 \quad \text{ssi} \quad x = 3 \quad \text{ou} \quad x = \frac{5}{3}$$

$$\text{Donc} \quad D_f = \mathbb{R} - \left\{ \frac{5}{3}; 3 \right\}$$

$$19) \quad f(x) = \frac{2 \sin x}{2 \cos x - 1}. \quad D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2 \cos x - 1 \neq 0\}$$

$$2 \cos x - 1 = 0 \quad \text{ssi} \quad \cos x = \frac{1}{2}$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \text{ssi} \quad \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{où} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Donc:} \quad D_f = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi; \frac{\pi}{3} + 2k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$20) \quad f(x) = \sqrt{\frac{-2x^2 + 2x + 13}{x^2 - x - 6}}. \quad D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{-2x^2 + 2x + 13}{x^2 - x - 6} \geq 0 \text{ et } x^2 - x - 6 \neq 0 \right\}$$

- On détermine les racines du trinôme  $-2x^2 + 2x + 13$ :

Le discriminant est  $\Delta' = 2^2 - 4 \times (-2) \times 13 = 108$  et ses racines sont :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{108}}{2 \times (-2)} = \frac{1 + 3\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 + \sqrt{108}}{2 \times (-2)} = \frac{1 - 3\sqrt{3}}{2}$$

- On détermine les racines du trinôme  $x^2 - x - 6$ :

Le discriminant est  $\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-6) \times 1 = 25$  et ses racines sont :

$$x_1' = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{1 - 5}{2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2' = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

- On obtient le tableau de signe :

| $x$                                   | $-\infty$ | $\frac{1-3\sqrt{3}}{2}$ | $-2$ | $3$ | $\frac{1+3\sqrt{3}}{2}$ | $+\infty$ |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|------|-----|-------------------------|-----------|
| $-2x^2 + 2x + 13$                     | -         | 0                       | +    | +   | +                       | 0         |
| $x^2 - x - 6$                         | +         |                         | 0    | -   | 0                       | +         |
| $\frac{-2x^2 + 2x + 13}{x^2 - x - 6}$ | -         | 0                       | +    | -   | +                       | 0         |

$$D_f = \left[ \frac{1-3\sqrt{3}}{2}; -2 \right] \cup \left[ 3; \frac{1+3\sqrt{3}}{2} \right].$$

$$21) \quad f(x) = \sqrt{x^2 + (2\sqrt{3} - \sqrt{2})x - 2\sqrt{6}} \quad D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} / x^2 + (2\sqrt{3} - \sqrt{2})x - 2\sqrt{6} \geq 0 \right\}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - 4 \times 1 \times 2\sqrt{6}$$

$$\Delta = 12 - 4\sqrt{6} + 2 + 8\sqrt{6} = 14 + 4\sqrt{6}$$

$$14 + 4\sqrt{6} = 14 + 2 \times 2\sqrt{3} \times \sqrt{2} = (2\sqrt{3})^2 + 2 \times 2\sqrt{3} \times \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2$$

$$14 + 4\sqrt{6} = (2\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$$

On a  $\Delta = 14 + 4\sqrt{6} > 0$  donc

$$x_1 = \frac{-2\sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{14 + 4\sqrt{6}}}{2 \times 1} = \frac{-2\sqrt{3} + \sqrt{2} + |2\sqrt{3} + \sqrt{2}|}{2 \times 1} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2\sqrt{3} + \sqrt{2} - |2\sqrt{3} + \sqrt{2}|}{2 \times 1}$$

$$x_1 = \frac{-2\sqrt{3} + \sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2 \times 1} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2\sqrt{3} + \sqrt{2} - 2\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2 \times 1} = \frac{-4\sqrt{3}}{2} = -2\sqrt{3}$$

| $x$   | $-\infty$ | $-2\sqrt{3}$ | $\sqrt{2}$ | $+\infty$ |
|---|-----------|--------------|------------|-----------|
| $x^2 + (2\sqrt{3} - \sqrt{2})x - 2\sqrt{6}$ | +         | 0            | -          | 0         |

$$\text{On a donc : } D_f = \left[ -\infty; -2\sqrt{3} \right] \cup \left[ \sqrt{2}; +\infty \right[$$

## II) Egalité de deux fonctions – Représentations graphique

### 1) Egalité de deux fonctions

Définition :

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions, et  $D_f$  et  $D_g$  leurs domaines de définition respectifs on dit que  $f$  et  $g$  sont égales et on écrit  $f=g$ .  
si et seulement si :

$D_f = D_g$  et pour tout  $x \in D_f$  (ou  $x \in D_g$ ) on a  $f(x)=g(x)$

**Exemple 1 :** Soient les deux fonctions :  $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{\sqrt{x^2}}$  et  $g(x) = \frac{1+3x^2}{|x|}$

- on a  $f(x) \in \mathbb{R}$ ssi  $\sqrt{x^2} \in \mathbb{R}$  et  $x \neq 0$

or on sait que  $x^2 \geq 0$  donc  $\sqrt{x^2} \in \mathbb{R}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$

alors  $f(x) \in \mathbb{R}$ ssi  $x \neq 0$  donc  $D_f = \mathbb{R}^*$

- on a  $g(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $|x| \neq 0$  ssi  $x \neq 0$

donc  $D_g = \mathbb{R}^*$

alors  $D_f = D_g = \mathbb{R}^*$

on sait que  $\sqrt{x^2} = |x|$  et  $3x^2 + 1 = 1 + 3x^2$  donc  $f(x) = g(x)$

donc finalement on a trouver que :  $D_f = D_g = \mathbb{R}^*$  et  $f(x) = g(x)$

donc :  $f = g$ .

**Exemple 2 :** Soient les deux fonctions :  $h(x) = \frac{x^2 - x}{x}$  et  $t(x) = x - 1$

- on a  $h(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x \neq 0$  donc  $D_h = \mathbb{R}^*$
- on a  $t(x)$  est un polynôme donc  $D_t = \mathbb{R}$

alors  $D_h \neq D_t$  donc :  $h \neq t$

## 2) Représentations graphique

Dans ce paragraphe le plan est rapporté a un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

**Définition :** Soit  $f$  une fonction , et  $D_f$  son domaine de définition

l'ensemble des points  $M(x, f(x))$  forme la courbe représentative de la fonction  $f$ , souvent notée  $C_f$ .

$$C_f = \{M(x, f(x)) / x \in D_f\}$$

### Méthode :


Pour tracer la courbe représentative de la fonction On calcule des images en nombre suffisant, et on présente les résultats dans un tableau de valeurs.

**Exemple 1 :** Tracer la représentation graphique de la fonction  $f$  tq :  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

Sur  $I$  un l'intervalle  $I = [-2; 3]$

**Réponses :**

|        |     |     |   |     |     |     |
|--------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| $x$    | -2  | -1  | 0 | 1   | 2   | 3   |
| $f(x)$ | 0,2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |



**Exemple 2 :** la courbe représentative d'une fonction affine  $f$  ( $f(x) = ax + b$  avec  $a \in \mathbb{R}$  et  $b \in \mathbb{R}$ ) est une droite d'équation  $y = ax + b$

**Exemple 3 :** Soie  $f$  une fonction tq :  $f(x) = |2x + 3|$


- on a  $f(x) \in \mathbb{R}$  donc  $D_f = \mathbb{R}$

$$2x+3=0 \text{ ssi } x=\frac{-3}{2}$$

$$\text{Donc : } \begin{cases} f(x)=2x+3 \\ f(x)=-2x-3 \end{cases}$$

|          |                |           |
|----------|----------------|-----------|
| $x$      | $\frac{-3}{2}$ | $+\infty$ |
| $2x+3$   | -              | 0 +       |
| $ 2x+3 $ | $-2x-3$        | $2x+3$    |

$$\text{Donc } f(x)=2x+3 \text{ si } x \in \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[ \text{ et } f(x)=-2x-3 \text{ si } x \in \left]-\infty, -\frac{3}{2}\right]$$



**Exemple 4:** Soie  $f$  une fonction tq :  $f(x)=|x-2|+|x+2|$


- on a  $f(x) \in \mathbb{R}$  donc  $D_f = \mathbb{R}$

$$x+2=0 \text{ ssi } x=-2$$

$$x-2=0 \text{ ssi } x=2$$

|               |           |        |       |           |
|---------------|-----------|--------|-------|-----------|
| $x$           | $-\infty$ | $-2$   | $2$   | $+\infty$ |
| $x-2$         | -         | -      | 0     | +         |
| $ x-2 $       | $-x+2$    | $-x+2$ | $x-2$ |           |
| $x+2$         | -         | 0      | +     | +         |
| $ x+2 $       | $-x-2$    | $x+2$  | $x+2$ |           |
| $ x-2 + x+2 $ | $-2x$     | 4      | $2x$  |           |


$$\text{Donc } f(x)=-2x \text{ si } x \in ]-\infty, -2] \text{ et } f(x)=4 \text{ si } x \in [-2, 2] \text{ et } f(x)=2x \text{ si } x \in [2, +\infty[$$



**Exemple 5 :** La courbe ci-dessous représente la fonction  $f$  définie sur  $[-6; 7]$

Soie  $f$  une fonction Questions : Répondre par lecture graphique :

- 1- Quelles sont les images des réels  $-5$ ,  $-3$ ,  $0$  et  $6$  ?
- 2- Quels sont les antécédents de  $-1$  et  $0$  ?
- 3- Résoudre graphiquement  $f(x) = 0$
- 4- Quel est, en fonction de  $m$ , le nombre de solutions de  $f(x) = m$
- 5- Résoudre graphiquement  $f(x) < 0$
- 6- Résoudre graphiquement  $f(x) \geq 2$



**Réponses :** 1) Image de  $-5$  est  $0$  (ordonnée du point d'abscisse  $-5$ ) Image de  $-3$  est  $4$

Image de  $0$  est  $-2$  Image de  $6$  est  $-2$

2) Antécédents de  $-1$  sont:  $-5,5$   $-1,75$   $0,5$  et  $5$

Antécédents de  $0$  sont:  $-5$   $-2$   $1$  et  $4$

3) La solution est l'ensemble des antécédents de  $0$  :  $S = \{-5; -2; 1; 4\}$

4) Nombre de solutions de  $f(x) = m$  C'est le nombre de points d'intersection de courbe avec une droite parallèle à l'axes des abscisses et d'ordonnées m.

Si  $m < -4$ : pas de solution

Si  $m = -4$ : une solution

Si:  $-4 < m < -3$  deux solutions

Si  $-3 < m < -2$ : trois solutions

Si  $-2 < m < 2$ : quatre solutions

Si  $m = 2$ : trois solutions

Si:  $2 < m < 4$  deux solutions

Si  $m = 4$ : une solution

Si  $m > 4$ : pas de solution

5)  $f(x) < 0$  Cela correspond aux valeurs de x pour lesquelles  $C_f$  est au-dessous de l'axe des abscisses.  $S = [-6; 7] \cup ]-2; 1[ \cup ]4; 7]$

6)  $f(x) \geq 2$  Cela correspond aux valeurs de x pour lesquelles  $C_f$  est au-dessus de la droite d'équation  $y = 2$  donc  $S = [-4; 2.5] \cup \{2\}$

## III) Fonctions paires et Fonctions impaires

### 1. Définitions

#### a. Ensemble de définition centré

Soit f une fonction. Soit  $D_f$  son ensemble de définition.

On dit que  $D_f$  est un ensemble de définition centré si et seulement si :


Pour tout réel  $x$ , si  $x \in D_f$ , alors  $-x \in D_f$ .

| Exemples d'ensembles centrés                    | Exemples d'ensembles non centrés |
|---|----------------------------------|
| $]-\infty, +\infty[$                            | $]0, +\infty[$                   |
| ${}^\circ * \quad (\text{ou } {}^\circ -\{0\})$ | ${}^\circ -\{1\}$                |
| ${}^\circ -\{-1; 1\}$                           | ${}^\circ -\{-1; 2\}$            |
| $[-4; 4]$                                       | $[-4; 3]$                        |

#### b. Fonction paire

On dit qu'une fonction f est paire si et seulement si :

1. Son ensemble de définition est centré,  
2. Pour tout réel x de  $D_f$ , on a :  $f(-x) = f(x)$



## Remarques :

- si  $n$  est un entier pair, positif ou négatif, la fonction définie par  $f(x) = kx^n$  est paire.  
(c'est d'ailleurs de cet exemple que vient la dénomination de fonction paire)
- la fonction  $x \mapsto |x|$  est une fonction paire,
- la fonction  $x \mapsto \cos(x)$  est une fonction paire,
- l'opposée d'une fonction paire est une fonction paire,
- l'inverse d'une fonction paire est une fonction paire,
- la somme de deux fonctions paires est une fonction paire,
- le produit de 2 fonctions paires ou de 2 fonctions impaires est une fonction paire.

## c. Fonction impaire

On dit qu'une fonction  $f$  est impaire si et seulement si :

1. Son ensemble de définition est centré,
  2. Pour tout réel  $x$  de  $D_f$ , on a :  $f(-x) = -f(x)$

## Remarques :

- si  $n$  est un entier impair, positif ou négatif, la fonction  $x \mapsto kx^n$  est impaire,
- la fonction  $x \mapsto \sin(x)$  est impaire,
- la fonction  $x \mapsto \tan x$  est impaire,
- l'opposée d'une fonction impaire est une fonction impaire,
- l'inverse d'une fonction impaire est une fonction impaire,
- la somme de deux fonctions impaires est une fonction impaire,
- le produit d'une fonction paire et d'une fonction impaire est une fonction impaire.
- la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.

**Exemple 1 :** 1) Soit  $f$  une fonction tq :  $f(x) = 3x^2 - 5$

$f$  est une fonction polynôme donc un réel a toujours une image.

Donc  $D_f = \mathbb{R}$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}$ , alors  $-x \in \mathbb{R}$
- $f(-x) = 3(-x)^2 - 5 = 3x^2 - 5$
- $f(-x) = f(x)$

Donc  $f$  est une fonction paire,

2) Soit  $g$  une fonction tq :  $g(x) = \frac{3}{x}$

on a  $g(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x \neq 0$

donc  $D_g = \mathbb{R}^*$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}^*$ , alors  $-x \in \mathbb{R}^*$
- $g(-x) = \frac{3}{-x} = -\frac{3}{x}$
- $g(-x) = -g(x)$

Donc  $g$  est une fonction impaire,

3) Soit  $h$  une fonction tq :  $h(x) = 2x^3 + x^2$

$h$  est une fonction polynôme donc Un réel a toujours une image.

Donc  $D_h = \mathbb{R}$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}$ , alors  $-x \in \mathbb{R}$

$$h(-x) = 2(-x)^3 + (-x)^2 = -2x^3 + x^2$$

$$h(-x) = -(2x^3 - x^2) \neq -h(x)$$

Donc  $h$  est une fonction ni paire ni impaire,

4) Soit  $t$  une fonction tq :  $t(x) = \frac{x}{x-2}$

on a  $t(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x-2 \neq 0$  ssi  $x \neq 2$

Donc  $D_t = \mathbb{R} - \{2\}$


on a  $-2 \in D_t$  mais  $-(-2) = 2 \notin D_t$

Donc  $D_t$  n'est pas symétrique par rapport à  $O$


Donc  $h$  est une fonction ni paire ni impaire,

## 2. le graphe et la parité de la fonction

- la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par à l'axe des



fonction impaire est



## Application :

Etudier la parité des fonctions suivantes définie par

$$1) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x} \quad 2) f(x) = x^2 + \frac{1}{x} \quad 3) f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 1} \quad 4) f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

$$5) f(x) = \frac{2x^3}{x^2 + 5} \quad 6) f(x) = |x| - \sqrt{2x^2 + 4} \quad 7) \quad 8) f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2}$$

## Solutions

$$1) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x} \quad \text{on a } f(x) \in \mathbb{R} \text{ ssi } x \neq 0$$

donc  $D_f = \mathbb{R}^*$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}^*$ , alors  $-x \in \mathbb{R}^*$

$$- f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{-x} = -\frac{x^2 - 1}{x}$$

$$f(-x) = -f(x)$$

Donc  $f$  est une fonction impaire,

2)  $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$  on a  $f(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x \neq 0$

donc  $D_f = \mathbb{R}^*$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}^*$ , alors  $-x \in \mathbb{R}^*$

-  $f(-x) = (-x)^2 + \frac{1}{-x} = x^2 - \frac{1}{x} = \left(-x^2 + \frac{1}{x}\right)$

$f(-x) \neq -f(x)$

Donc  $f$  est une fonction ni paire ni impaire,

3)  $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 1}$  on a  $f(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x^2 - 1 \neq 0$

$x^2 - 1 = 0$  ssi  $x^2 = 1$  ssi  $x = 1$  ou  $x = -1$

donc  $D_f = \mathbb{R} - \{-1; 1\}$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R} - \{-1; 1\}$ , alors  $-x \in \mathbb{R} - \{-1; 1\}$

-  $f(-x) = \frac{|-x|}{(-x)^2 - 1} = \frac{|x|}{x^2 - 1}$

$f(-x) = f(x)$

Donc  $f$  est une fonction paire

4)  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ .

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 1-x^2 \geq 0\}$

$1-x^2 = 0$  ssi  $x^2 = 1$  ssi  $x = 1$  ou  $x = -1$

|         |           |      |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
| $1-x^2$ | -         | 0    | +   | 0 -       |

Donc  $D_f = [-1, 1]$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in [-1, 1]$ , alors  $-x \in [-1, 1]$

-  $f(-x) = \sqrt{1-(-x)^2} = \sqrt{1-x^2}$

$f(-x) = f(x)$

Donc  $f$  est une fonction paire

5)  $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 + 5}$ .

$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x^2 + 5 \neq 0\}$

$x^2 + 5 = 0$  ssi  $x^2 = -5$  pas de solutions

Donc  $D_f = \mathbb{R}$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}$ , alors  $-x \in \mathbb{R}$

$$f(-x) = \frac{2(-x)^3}{(-x)^2 + 5} = \frac{-2x^3}{x^2 + 5}$$

$$f(-x) = -f(x)$$

Donc  $f$  est une fonction impaire

$$6) f(x) = |x| - \sqrt{2x^2 + 4}.$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 2x^2 + 4 \geq 0\}$$

Or on sait que  $2x^2 \geq 0$  Pour tout réel  $x$ , donc  $2x^2 + 4 \geq 0 + 4$  donc  $2x^2 + 4 \geq 4 \geq 0$

Donc  $D_f = \mathbb{R}$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}$ , alors  $-x \in \mathbb{R}$

$$f(-x) = |-x| - \sqrt{2(-x)^2 + 4} = |x| - \sqrt{2x^2 + 4}$$

$$f(-x) = f(x)$$

Donc  $f$  est une fonction paire

$$6) f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2}. \quad D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\} \quad \text{Donc } D_f = \mathbb{R}^+ = [0; +\infty[$$

On a  $2 \in \mathbb{R}^+$  mais  $-2 \notin \mathbb{R}^+$  Donc  $f$  est une fonction ni paire ni impaire

#### IV) Les variations d'une fonction numérique

##### 1) Sens de variation d'une fonction :fonction croissante -décroissante -fonction constantes


**Définition :** Soit  $f$  une fonction et  $D_f$  son domaine de définition

Et soit  $I$  un intervalle inclus dans  $D_f$

- Dire  $f$  que est strictement croissante sur  $I$  ( croissante sur  $I$  ) signifie que :

Si  $x_1 \in I$  et  $x_2 \in I$  tq  $x_1 < x_2$  alors  $f(x_1) < f(x_2)$  ( $f(x_1) \leq f(x_2)$ )


*Rq : Une fonction croissante « conserve l'ordre ».*



- Dire  $f$  que est strictement décroissante sur  $I$  ( décroissante sur  $I$  ) signifie que :

Si  $x_1 \in I$  et  $x_2 \in I$  tq  $x_1 < x_2$  alors  $f(x_1) > f(x_2)$  ( $f(x_1) \geq f(x_2)$ )

*Rq : Une fonction décroissante « inverse l'ordre ».*




- Dire  $f$  que est constante sur  $I$  signifie que :

Si  $x_1 \in I$  et  $x_2 \in I$  tq  $x_1 < x_2$  alors  $f(x_1) = f(x_2)$

- Une fonction définie sur un intervalle  $I$  est monotone sur cet intervalle si elle est : soit croissante sur  $I$  soit décroissante sur  $I$

**Illustration graphique :**



Fonction croissante sur  $[a, b]$ , mais non strictement croissante

Fonction strictement croissante sur  $[a, b]$

**Exemple :** 1) Soit  $f$  une fonction tq :  $f(x) = 7x - 5$

$f$  est une fonction polynôme donc  $D_f = \mathbb{R}$

Soit  $x_1 \in \mathbb{R}$  et  $x_2 \in \mathbb{R}$  tq  $x_1 < x_2$

Donc  $7x_1 < 7x_2$  car  $7 > 0$

Donc  $7x_1 - 5 < 7x_2 - 5$

Alors  $f(x_1) < f(x_2)$  d'où  $f$  que est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$

2) Soit  $g$  une fonction tq :  $g(x) = \frac{2}{x}$

$g(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x \neq 0$

Donc  $D_g = \mathbb{R} - \{0\} = \mathbb{R}^*$

a) Soit  $x_1 \in [0; +\infty[$  et  $x_2 \in [0; +\infty[$  tq  $x_1 < x_2$

Donc  $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$  Donc  $\frac{2}{x_1} > \frac{2}{x_2}$  car  $2 > 0$

Alors  $f(x_1) > f(x_2)$  d'où f que est strictement décroissante sur  $[0; +\infty[$

b) Soit  $x_1 \in ]-\infty; 0]$  et  $x_2 \in ]-\infty; 0]$  tq  $x_1 < x_2$


Donc  $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$  Donc  $\frac{2}{x_1} > \frac{2}{x_2}$  car  $2 > 0$

Alors  $f(x_1) > f(x_2)$  d'où f que est strictement décroissante sur  $]-\infty; 0]$

b) tableau de variation :

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           |     |           |

3)



|        |    |     |   |    |
|--------|----|-----|---|----|
| $x$    | -5 | -2  | 2 | 5  |
| $f(x)$ | 5  | 0,5 | 2 | -2 |

**Propriété :** Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle  $I$

On dit que f est strictement constante sur  $I$  ssi il existe un réel  $k$  tq:  $f(x) = k$

pour tout  $x \in I$

## 2) Le taux d'accroissement d'une fonction

**a) Définition :** Soit f une fonction et  $D_f$  son domaine de définition

Et soient  $x_1 \in D_f$  et  $x_2 \in D_f$  tq  $x_1 \neq x_2$

On appelle Le taux d'accroissement (taux de variation) de la fonction  $f$  entre  $x_1$  et  $x_2$

Le réel noté  $T(x_1; x_2)$  est tq :  $T(x_1; x_2) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$

**Exemple :** Soit  $f$  une fonction tq :  $f(x) = 3x^2 + 2$

$f$  est une fonction polynôme donc  $D_f = \mathbb{R}$

soient  $x_1 \in \mathbb{R}$  et  $x_2 \in \mathbb{R}$  tq  $x_1 \neq x_2$

$$T(x_1; x_2) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{(3x_1^2 + 2) - (3x_2^2 + 2)}{x_1 - x_2}$$

$$T(x_1; x_2) = \frac{3x_1^2 - 3x_2^2 + 2 - 2}{x_1 - x_2} = \frac{3(x_1^2 - x_2^2)}{x_1 - x_2}$$

$$T(x_1; x_2) = \frac{3(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{x_1 - x_2} = 3(x_1 + x_2)$$

## b) Le taux d'accroissement d'une fonction et les variations :

**Propriété :** Soit  $f$  une fonction numérique définie sur un intervalle  $I$

- On dit que  $f$  est strictement croissante(croissante) sur  $I$ ssi pour tout  $x_1 \in I$  et  $x_2 \in I$  et  $x_1 \neq x_2$  on a  $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$  ( $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq 0$ )
- On dit que  $f$  est strictement décroissante(décroissante) sur  $I$ ssi pour tout  $x_1 \in I$  et  $x_2 \in I$  et  $x_1 \neq x_2$  on a  $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0$  ( $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq 0$ )
- On dit que  $f$  est constante sur  $I$ ssi pour tout  $x_1 \in I$  et  $x_2 \in I$  et  $x_1 \neq x_2$  on a  $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = 0$

**Exemple :** 1) Soit  $f$  une fonction tq :  $f(x) = 3x^2 + 2$   $D_f = \mathbb{R}$

soient  $x_1 \in \mathbb{R}$  et  $x_2 \in \mathbb{R}$  tq  $x_1 \neq x_2$  on a :  $T(x_1; x_2) = 3(x_1 + x_2)$

a) Soit  $x_1 \in [0; +\infty[$  et  $x_2 \in [0; +\infty[$

Donc  $x_1 \geq 0$  et  $x_2 \geq 0$  Donc  $x_1 + x_2 \geq 0$  Donc  $3(x_1 + x_2) \geq 0$  car  $3 > 0$

Donc  $T(x_1; x_2) = 3(x_1 + x_2) \geq 0$

d'où  $f$  que est croissante sur  $[0; +\infty[$

b) Soit  $x_1 \in ]-\infty; 0]$  et  $x_2 \in ]-\infty; 0]$

Donc  $x_1 \leq 0$  et  $x_2 \leq 0$  Donc  $x_1 + x_2 \leq 0$  Donc  $3(x_1 + x_2) \leq 0$  car  $3 > 0$

Donc  $T(x_1; x_2) = 3(x_1 + x_2) \leq 0$

d'où  $f$  que est décroissante sur  $]-\infty; 0]$

b) Résumé : **tableau de variation** :  $f(0) = 3 \times 0^2 + 2 = 2$

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | 2 |           |

2) Soit  $f$  une fonction tq :  $g(x) = \frac{x}{x+1}$  on a  $f(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x+1 \neq 0$  ssi  $x \neq -1$

Donc  $D_g = \mathbb{R} - \{-1\}$

soient  $x_1 \in D_g$  et  $x_2 \in D_g$  tq  $x_1 \neq x_2$  on a :  $T(x_1; x_2) = \frac{g(x_1) - g(x_2)}{x_1 - x_2}$

$$g(x_1) - g(x_2) = \frac{x_1}{x_1+1} - \frac{x_2}{x_2+1} = \frac{x_1(x_2+1) - x_2(x_1+1)}{(x_1+1)(x_2+1)}$$

$$T(x_1; x_2) = \frac{x_1 - x_2}{(x_1+1)(x_2+1)} \times \frac{1}{x_1 - x_2} = \frac{1}{(x_1+1)(x_2+1)}$$

a) sur  $I = ]-\infty; -1[$

Soit  $x_1 \in ]-\infty; -1[$  et  $x_2 \in ]-\infty; -1[$   $x_1 \neq x_2$

Donc  $x_1 < -1$  et  $x_2 < -1$  Donc  $x_1 + 1 < 0$  et  $x_2 + 1 < 0$  Donc  $(x_1 + 1)(x_2 + 1) > 0$

Donc  $T(x_1; x_2) = \frac{1}{(x_1+1)(x_2+1)} > 0$  sur  $I = ]-\infty; -1[$

d'où  $g$  que est strictement croissante sur  $I = ]-\infty; -1[$

b) sur  $J = ]-1; +\infty[$

Soit  $x_1 \in ]-1; +\infty[$  et  $x_2 \in ]-1; +\infty[$   $x_1 \neq x_2$

Donc  $x_1 > -1$  et  $x_2 > -1$  Donc  $x_1 + 1 > 0$  et  $x_2 + 1 > 0$  Donc  $(x_1 + 1)(x_2 + 1) > 0$

Donc  $T(x_1; x_2) = \frac{1}{(x_1+1)(x_2+1)} > 0$  sur  $J = ]-1; +\infty[$

d'où  $g$  que est strictement croissante sur  $J = ]-1; +\infty[$

c) résumé : **tableau de variation** :

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| $x$    | $-\infty$   | $-1$ | $+\infty$   |
| $f(x)$ |  |      |  |

c) **les variations et la parité**:

**Propriété** : Soit  $f$  une fonction numérique définie sur un intervalle  $I \subset \mathbb{R}^+$  et soit  $I'$  le symétrique de l'intervalle  $I$

Si  $f$  est paire alors :

- $f$  est croissante sur  $I$  ssi  $f$  est décroissante sur  $I'$
- $f$  est décroissante sur  $I$  ssi  $f$  est croissante sur  $I'$

Si  $f$  est impaire alors :

- $f$  est croissante sur  $I$  ssi  $f$  est croissante sur  $I'$
- $f$  est décroissante sur  $I$  ssi  $f$  est décroissante sur  $I'$

**consequences** :

Si  $f$  est paire ou impaire alors il suffit d'étudier ses variations sur  $D_f \cap \mathbb{R}^+$  et en déduire ses variations sur  $D_f$

**Applications** : Soit  $f$  une fonction tq :  $f(x) = x + \frac{1}{x}$

1) Déterminer  $D_f$  et étudier la parité de  $f$

2) Calculer Le taux d'accroissement  $T(x_1; x_2)$  de  $f$  entre  $x_1$  et  $x_2$  deux éléments de  $D_f$  tq  $x_1 \neq x_2$

3) Étudier les variations de  $f$  sur  $I = [0; 1]$  puis sur  $J = [1; +\infty[$

4) En déduire les variations de  $f$  sur  $D_f$

5) Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $D_f$

**Réponses** : 1) on a  $f(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x \neq 0$  Donc  $D_f = \mathbb{R} - \{0\} = \mathbb{R}^*$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}^*$ , alors  $-x \in \mathbb{R}^*$

-  $f(-x) = -x + \frac{1}{-x} = -x - \frac{1}{x} = -\left(x + \frac{1}{x}\right)$

$$f(-x) = -f(x)$$

Donc  $f$  est une fonction impaire,

$$\begin{aligned}
 2) f(x_1) - f(x_2) &= \left( x_1 + \frac{1}{x_1} \right) - \left( x_2 + \frac{1}{x_2} \right) = x_1 + \frac{1}{x_1} - x_2 - \frac{1}{x_2} \\
 &= \frac{x_1^2 \times x_2 + x_2 - x_2^2 \times x_1 - x_1}{x_1 \times x_2} = \frac{x_1 \times x_2 (x_1 - x_2) + x_2 - x_1}{x_1 \times x_2} = \frac{(x_1 - x_2)(x_1 \times x_2 - 1)}{x_1 \times x_2} \\
 T(x_1; x_2) &= \frac{(x_1 - x_2)(x_1 \times x_2 - 1)}{x_1 \times x_2} \times \frac{1}{x_1 - x_2} = \frac{x_1 \times x_2 - 1}{x_1 \times x_2}
 \end{aligned}$$

a) sur  $I = ]0; 1]$

Soit  $x_1 \in ]0; 1]$  et  $x_2 \in ]0; 1]$

Donc  $0 < x_1 \leq 1$  et  $0 < x_2 \leq 1$   $x_2 + 1 < 0$  Donc  $0 < x_1 x_2 \leq 1$  et  $x_1 \neq x_2$

Donc  $x_1 x_2 - 1 < 0$  et on a  $0 < x_1 x_2$  Donc  $T(x_1; x_2) = \frac{x_1 \times x_2 - 1}{x_1 \times x_2} < 0$

d'où  $f$  que est strictement décroissante sur  $I = ]0; 1]$

b) sur  $J = [1; +\infty[$

Soit  $x_1 \in [1; +\infty[$  et  $x_2 \in [1; +\infty[$

Donc  $x_1 \geq 1$  et  $x_2 \geq 1$  Donc  $x_1 x_2 \geq 1$  et  $x_1 \neq x_2$  Donc  $x_1 x_2 > 1$  Donc  $x_1 x_2 - 1 > 0$

et on a  $0 < x_1 x_2$  Donc  $T(x_1; x_2) = \frac{x_1 \times x_2 - 1}{x_1 \times x_2} > 0$

d'où  $f$  que est strictement croissante sur  $J = [1; +\infty[$

3)  $f$  est impaire et le symétrique de  $I = ]0; 1]$  est l'intervalle  $I' = [-1; 0[$  et le symétrique de  $J = [1; +\infty[$  est l'intervalle  $J' = ]-\infty; -1]$

Donc :  $f$  est strictement décroissante sur  $I$  Donc  $f$  est strictement décroissante sur  $I'$   
 $f$  est strictement croissante sur  $J$  Donc  $f$  est strictement croissante sur  $J'$

5) le tableau de variations de  $f$  sur  $D_f$


| $x$                  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
|----------------------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| Variations de $f(x)$ |           | -2   |     | 2   |           |

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} = 2$$

$$f(-1) = -1 - \frac{1}{1} = -2$$

## V) Les extrema d'une fonction numérique

### 1) Définitions :



Soit  $f$  une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert  $I$  et soit  $a \in I$

- Dire que  $f(a)$  est une valeur maximale de  $f$  sur  $I$  (ou  $f(a)$  est un maximum de  $f$  sur  $I$ ) ssi pour tout  $x \in I$ :  $f(x) \leq f(a)$
- Dire que  $f(a)$  est une valeur minimale de  $f$  sur  $I$  (ou  $f(a)$  est un minimum de  $f$  sur  $I$ ) ssi pour tout  $x \in I$ :  $f(x) \geq f(a)$

### 2) Exemples

1° Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = 5x^2 + 3$   $D_f = \mathbb{R}$

On a pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $x^2 \geq 0$  Donc  $5x^2 \geq 0$  car  $5 > 0$

Par suite  $5x^2 + 3 \geq 3$  et on a  $f(0) = 3$

Donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $f(x) \geq f(0)$

d'où  $f(0) = 3$  est un minimum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$

2° Soit  $g$  une fonction numérique tq :  $g(x) = -4x^2 + 1$   $D_g = \mathbb{R}$

On a pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $x^2 \geq 0$  Donc  $-4x^2 \leq 0$  car  $-4 < 0$

Par suite  $-4x^2 + 1 \leq 1$  et on a  $g(0) = 1$

Donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $g(x) \leq g(0)$

d'où  $g(0) = 1$  est un maximum de  $g$  sur  $\mathbb{R}$

### 3) Propriétés

Soit  $f$  une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert  $I = [a; b]$  ( $a$  et  $b$  dans  $\mathbb{R}$ ) et soit  $c \in I$

- Si  $f$  est croissante sur  $[a; c]$  et décroissante sur  $[c; b]$  alors  $f(c)$  est une valeur maximale de  $f$  sur  $I$
- Si  $f$  est décroissante sur  $[a; c]$  et croissante sur  $[c; b]$  alors  $f(c)$  est une valeur minimale de  $f$  sur  $I$

|        |     |        |     |
|--------|-----|--------|-----|
| $x$    | $a$ | $c$    | $b$ |
| $f(x)$ |     | $f(c)$ |     |

|        |     |        |     |
|--------|-----|--------|-----|
| $x$    | $a$ | $c$    | $b$ |
| $f(x)$ |     | $f(c)$ |     |

**Application :** Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = -4x^2 + 4x + 5$

1°a) montrer que  $f(x) = 6 - (2x - 1)^2$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$

b)  $f(x) \leq 6$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$

2° calculer :  $f\left(\frac{1}{2}\right)$  et en déduire les extréums de  $f$  sur  $\mathbb{R}$

**Reponses:** 1°a) on a  $D_f = \mathbb{R}$

$$6 - (2x - 1)^2 = 6 - (4x^2 - 4x + 1)$$

$$= 6 - 4x^2 + 4x - 1 = -4x^2 + 4x + 5$$

$$\text{Donc : } f(x) = 6 - (2x - 1)^2$$

b) Donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on a  $(2x - 1)^2 \geq 0$

Par suite  $(2x - 1)^2 \leq 0$  donc  $6 - (2x - 1)^2 \leq 6$

Donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $f(x) \leq 6$

$$2^{\circ} \text{ on a } f\left(\frac{1}{2}\right) = 6 - \left(2 \times \frac{1}{2} - 1\right)^2 = 6 - (1 - 1)^2 = 6$$

on a pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $6 - (2x - 1)^2 \leq 6$  alors  $f(x) \leq f\left(\frac{1}{2}\right)$

Donc  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 6$  est un maximum de  $f$  sur  $\mathbb{R}$

## VI) Etude et représentation graphique des fonctions $x \xrightarrow{f} ax^2$

Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = ax^2$  avec  $a \in \mathbb{R}^*$

1° on a  $f$  est une fonction polynôme donc  $D_f = \mathbb{R}$

2° Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}$ , alors  $-x \in \mathbb{R}$

$$f(-x) = a(-x)^2 = ax^2$$

$$f(-x) = f(x)$$

Donc  $f$  est une fonction paire,

Donc il suffit d'étudier la monotonie sur  $I = [0; +\infty[$

3° soient  $x_1 \in [0; +\infty[$  et  $x_2 \in [0; +\infty[$  tq  $x_1 \neq x_2$

$$T(x_1; x_2) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{ax_1^2 - ax_2^2}{x_1 - x_2} = \frac{a(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{x_1 - x_2}$$

$$\text{Donc } T(x_1; x_2) = a(x_1 + x_2)$$

1<sup>er</sup> cas : si  $a > 0$

On a :  $x_1 \in [0; +\infty[$  donc  $x_1 \geq 0$  et  $x_2 \in [0; +\infty[$  donc  $x_2 \geq 0$

Donc  $x_1 + x_2 \geq 0$  et puisque  $x_1 \neq x_2$  Donc  $x_1 + x_2 > 0$

Et on a :  $a > 0$  donc sur  $[0; +\infty[$   $T(x_1; x_2) > 0$

Et alors  $f$  est strictement croissante sur  $[0; +\infty[$

et puisque  $f$  est une fonction paire alors  $f$  est strictement décroissante sur  $]-\infty; 0]$

Tableau de variations de  $f$  si  $a > 0$

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ |     | $+\infty$ |

↗ ↘

**2i r cas : si  $a < 0$**

On a :  $x_1 \in ]-\infty; 0]$  donc  $x_1 \leq 0$  et  $x_2 \in ]-\infty; 0]$  donc  $x_2 \leq 0$

Donc  $x_1 + x_2 \leq 0$  et puisque  $x_1 \neq x_2$  Donc  $x_1 + x_2 < 0$

Et on a :  $a < 0$  donc sur  $]-\infty; 0]$   $T(x_1; x_2) < 0$

Et alors  $f$  est strictement décroissante croissante sur  $[0; +\infty[$

et puisque  $f$  est une fonction paire alors  $f$  est strictement croissante sur  $]-\infty; 0]$


Tableau de variations de  $f$  si  $a < 0$

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↗ ↘ | $+\infty$ |


#### 4° Repr  tation graphique

**D finition :** dans un Rep re orthonorm   $(0; \vec{i}; \vec{j})$  la courbe repr  tative de la fonction  $x \xrightarrow{f} ax^2$  avec  $a \in \mathbb{R}^*$  s'appelle une parabole dont les ´l ments caract ristiques sont son sommet qui est l'origine du rep re et son axe de sym trie qui est l'axe des ordonn es

*Si  $a > 0$*



*Si  $a < 0$*




**Exemples**

1° Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = \frac{1}{2}x^2$   $D_f = \mathbb{R}$

On a  $a = \frac{1}{2} > 0$  Donc

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

|        |   |               |   |               |
|--------|---|---------------|---|---------------|
| $x$    | 0 | 1             | 2 | 3             |
| $f(x)$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | 2 | $\frac{9}{2}$ |




2° Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2$   $D_f = \mathbb{R}$

On a  $a = -\frac{1}{2} < 0$  Donc

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

|        |   |                |                |    |
|--------|---|----------------|----------------|----|
| $x$    | 0 | $\frac{1}{2}$  | 1              | 2  |
| $f(x)$ | 0 | $-\frac{1}{8}$ | $-\frac{1}{2}$ | -2 |



**VII) Etude et représentation graphique des fonctions  $x \xrightarrow{f} ax^2 + bx + c$**

**1) Formules du changement d'origine du repère**

Soit  $W(\alpha; \beta)$  un point dans le Repère  $(0; \vec{i}; \vec{j})$  et  $M$  un point du plan

$M(x; y)$  les coordonnées de  $M$  dans le repère  $(0; \vec{i}; \vec{j})$

$M(X; Y)$  les coordonnées de  $M$  dans le repère  $(W; \vec{i}; \vec{j})$

On a  $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$  et  $\overrightarrow{WM} = X\vec{i} + Y\vec{j}$  et  $\overrightarrow{OW} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j}$

$$\overrightarrow{WM} = \overrightarrow{WO} + \overrightarrow{OM} = -\overrightarrow{OW} + \overrightarrow{OM}$$

Donc  $X \vec{i} + Y \vec{j} = -\alpha \vec{i} - \beta \vec{j} + x \vec{i} + y \vec{j} = (x - \alpha) \vec{i} + (y - \beta) \vec{j}$

Donc  $\begin{cases} X = x - \alpha \\ Y = y - \beta \end{cases}$  sont des formules du changement de l'origine de repère

## 2) Etude et graphe de $x \xrightarrow{f} ax^2 + bx + c$

**Propriétés :** 1° Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = ax^2 + bx + c$

Avec  $a \in \mathbb{R}^*$  et  $b \in \mathbb{R}$  et  $c \in \mathbb{R}$

1° On a  $f$  est une fonction polynôme donc  $D_f = \mathbb{R}$

2° Pour tout réel  $x \in \mathbb{R}$  on peut écrire sous la forme :  $f(x) = a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$

Avec  $\Delta = b^2 - 4ac$  et s'appelle la forme canonique de  $f(x)$

On pose  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$

Alors  $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$  c ad  $f(x) - \beta = a(x - \alpha)^2$

3° On a  $f(x) = y$  on pose  $Y = y - \beta$  et  $X = x - \alpha$  et soit  $W(\alpha; \beta)$  Alors :

Dans le repère  $(W; \vec{i}; \vec{j})$  la courbe  $(C_f)$  de  $f$  est d'équation  $Y = aX^2$  donc c'est une parabole de sommet  $W$  et son axe de symétrie est l'axe des ordonnées

**Conséquences :** 1° Dans le repère  $(0; \vec{i}; \vec{j})$  la courbe  $(C_f)$  c'est une parabole de sommet  $W(\alpha; \beta)$  et d'axe de symétrie la droite  $x = \alpha$

## 2° Les variations de $f$

Si  $a > 0$

|        |           |          |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\beta$  |           |

Si  $a < 0$

|        |           |          |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $\beta$  |           |

**Exemples** 1° Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = 2x^2 - 4x - 2$

on a  $f$  est une fonction polynôme donc  $D_f = \mathbb{R}$

On a  $a = 2$  et  $b = -4$  et  $c = -2$  ( $f(x) = ax^2 + bx + c$ )

Donc  $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \times 2} = 1$  et  $\beta = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{32}{4 \times 2} = -4$

Pour tout réel  $x \in \mathbb{R}$  on peut écrire sous la forme :


$$f(x) = a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a} = 2(x - 1)^2 - 4 (f(1) = 2 - 4 - 2 = -4)$$

Soit  $W(1; -4)$ . Donc dans le repère  $(0; \vec{i}; \vec{j})$  la courbe  $(C_f)$  c'est une parabole de sommet  $W(1; -4)$  et d'axe de symétrie la droite  $x = 1$ .

#### Tableau de variations de $f$

On a  $a = 2 > 0$  donc :

| $x$    | $-\infty$ | 1  | $+\infty$ |
|--------|-----------|----|-----------|
| $f(x)$ |           | -4 |           |



2° Soit  $g$  une fonction numérique tq :  $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1$

on a  $g$  est une fonction polynôme donc  $D_g = \mathbb{R}$

On a  $a = -\frac{1}{2}$  et  $b = 2$  et  $c = 1$  ( $g(x) = ax^2 + bx + c$ )

Donc  $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} = 2$  et  $\beta = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{4+2}{-2} = 3$

Donc pour tout réel  $x \in \mathbb{R}$  on peut écrire sous la forme :


$$g(x) = a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a} = -\frac{1}{2} (x - 2)^2 + 3 \quad \left( g(2) = -\frac{1}{2}(2 - 2) + 3 = 3 \right)$$

Soit  $W(2; 3)$ . Donc dans le repère  $(0; \vec{i}; \vec{j})$  la courbe  $(C_g)$  c'est une parabole de sommet  $W(2; 3)$  et d'axe de symétrie la droite  $x = 2$ .

#### Tableau de variations de $f$

On a  $a = -\frac{1}{2} < 0$  donc :

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | 3 |           |



### VIII) Etude et représentation graphique des fonctions : $x \xrightarrow{f} \frac{a}{x}$ ( $a \in \mathbb{R}^*$ )

Soit  $f$  une fonction tq :  $f(x) = \frac{a}{x}$

1) La parité de la fonction : On a  $f(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x \neq 0$

Donc  $D_f = \mathbb{R}^*$

- Pour tout réel  $x$ , si  $x \in \mathbb{R}^*$ , alors  $-x \in \mathbb{R}^*$

$$f(-x) = \frac{a}{-x} = -\frac{a}{x}$$

$$f(-x) = -f(x)$$

Donc  $f$  est une fonction impaire,

2) Les variations de la fonction : soient  $x_1 \in \mathbb{R}^*$  et  $x_2 \in \mathbb{R}^*$  tq  $x_1 \neq x_2$  on a :

$$T(x_1; x_2) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

$$T(x_1; x_2) = \frac{\frac{a}{x_1} - \frac{a}{x_2}}{x_1 - x_2} = \frac{ax_2 - ax_1}{(x_1 - x_2)(x_1 x_2)} = \frac{-a(x_1 - x_2)}{x_1 x_2 (x_1 - x_2)} = \frac{-a}{x_1 x_2}$$

a) sur  $I = \mathbb{R}^{*+}$

Soit  $x_1 \in \mathbb{R}^{*+}$  et  $x_2 \in \mathbb{R}^{*+}$   $x_1 \neq x_2$

Donc  $x_1 > 0$  et  $x_2 > 0$  Donc  $x_1 x_2 > 0$  Donc  $\frac{1}{x_1 x_2} > 0$

1<sup>er</sup> cas : si  $a > 0$

Donc :  $\frac{-a}{x_1 x_2} < 0$  donc sur  $I = \mathbb{R}^{*+}$   $T(x_1; x_2) < 0$

Et alors  $f$  est strictement décroissante sur  $I = \mathbb{R}^{*+}$

et puisque  $f$  est une fonction impaire alors  $f$  est strictement décroissante sur  $J = \mathbb{R}^{*-}$

Tableau de variations de  $f$  si  $a > 0$

| $x$    | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
|--------|-----------|---|-----------|
| $f(x)$ |           |   |           |

2i r cas : si  $a < 0$

Donc :  $\frac{-a}{x_1 x_2} > 0$  donc sur  $I = \mathbb{R}^{*+}$   $T(x_1; x_2) > 0$

Et alors  $f$  est strictement croissante sur  $I = \mathbb{R}^{*+}$

et puisque  $f$  est une fonction impaire alors  $f$  est strictement croissante sur  $J = \mathbb{R}^{*-}$

Tableau de variations de  $f$  si  $a < 0$

| $x$    | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
|--------|-----------|---|-----------|
| $f(x)$ |           |   |           |

### 3) Repr sentation graphique



**D finition :** dans un Rep re orthonorm   $(0; \vec{i}; \vec{j})$  la courbe repr sentative de la

fonction  $x \xrightarrow{f} \frac{a}{x}$  avec  $a \in \mathbb{R}^*$  s'appelle une hyperbole d' quation  $y = \frac{a}{x}$  dont les  l ments caract ristiques sont : son centre de sym trie qui est l'origine du rep re et

Ses deux asymptotes qui sont l'axe des abscisses et l'axe des ordonn es


si  $a > 0$

si  $a < 0$



**Exemples :** Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = \frac{2}{x}$

|        |   |   |   |               |
|--------|---|---|---|---------------|
| $x$    | 0 | 1 | 2 | 3             |
| $f(x)$ |   | 2 | 1 | $\frac{2}{3}$ |



## IX) Etude et représentation graphique des fonctions homographiques :

$$x \xrightarrow{f} \frac{ax+b}{cx+d} \quad a \neq 0 \text{ et } c \neq 0$$

1) Soit  $f$  une fonction tq :  $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$  on a  $f(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $cx+d \neq 0$  ssi  $x \neq -\frac{d}{c}$

$$\text{Donc } D_f = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$$

$$2) \text{Pour tout } x \in D_f : f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a(x + \frac{b}{a})}{c(x + \frac{d}{c})} = \frac{a \left( x + \frac{d}{c} - \frac{d}{c} + \frac{b}{a} \right)}{c \left( x + \frac{d}{c} \right)}$$

$$f(x) = \frac{a}{c} \left( 1 + \frac{\frac{bc-ad}{c^2}}{x + \frac{d}{c}} \right) = \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc-ad}{c^2}}{x + \frac{d}{c}}$$

$$\text{On pose } \alpha = -\frac{d}{c} \text{ et } \beta = \frac{a}{c} \text{ et } \gamma = \frac{-\det f}{c^2} \text{ avec } \det f = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

1) Résumé et propriété : Soit  $f$  une fonction homographique tq :  $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$

$a \neq 0$  et  $c \neq 0$  et  $ad - bc \neq 0$

- Pour  $x \in \mathbb{R} - \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$  on a  $f(x) = \beta + \frac{\gamma}{x - \alpha}$  dite forme réduite de  $f(x)$

$$\text{Avec } \alpha = -\frac{d}{c} \text{ et } \beta = \frac{a}{c} \text{ et } \gamma = \frac{-\det f}{c^2} \text{ avec } \det f = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

- Soit  $W(\alpha; \beta)$  Donc dans le repère  $(W; \vec{i}; \vec{j})$  l'équation de  $(C_f)$  est  $Y = \frac{\gamma}{X}$  avec  $Y = y - \beta$  et  $X = x - \alpha$  donc  $(C_f)$  est une hyperbole de centre  $W$  et d'asymptotes l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées
- dans le repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$   $(C_f)$  est l'hyperbole de centre  $W$  et d'asymptotes les droites d'équations respectives  $x = \alpha$  et  $y = \beta$

**Conséquences :**

**1iér cas :** si  $\det f = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc > 0$

Tableau de variations de f :

|        |           |                |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-\frac{d}{c}$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           |                |           |

**2iér cas :** si  $\det f = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc < 0$

Tableau de variations de f :

|        |           |                |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-\frac{d}{c}$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           |                |           |

**Exemples 1:** Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = \frac{-2x+1}{2x-4}$

on a  $f(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $2x-4 \neq 0$  ssi  $x \neq 2$

Donc  $D_f = \mathbb{R} - \{2\}$

Si  $x \in \mathbb{R} - \{2\}$  on a

$$f(x) = \frac{-(2x-4)-3}{2x-4} = \frac{-(2x-4)}{2x-4} + \frac{-3}{2x-4} = -1 + \frac{-3}{2x-4}$$

$$f(x) + 1 = \frac{-3}{2x-4}$$


$$\begin{array}{r}
 -2x + 1 \\
 -2x + 4 \\
 \hline
 -3
 \end{array}$$

$2x - 4$

-1

On pose  $\alpha = 2$  et  $\beta = -1$  et soit  $W(2; -1)$

- Donc dans le repère  $(W; \vec{i}; \vec{j})$  l'équation de  $(C_f)$  est  $Y = \frac{-3/2}{X}$  avec  $Y = y + 1$  et  $X = x - 2$  donc  $(C_f)$  est une hyperbole de centre  $W$  et d'asymptotes les droites d'équations respectives  $x = 2$  et  $y = -1$
- Tableau de variations



**Exemples 2:** Soit  $f$  une fonction numérique tq :  $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

on a  $f(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x-1 \neq 0$  ssi  $x \neq 1$

Donc  $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$

Si  $x \in \mathbb{R} - \{1\}$  on a

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{2(x-1)}{x-1} + \frac{3}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$$

$$f(x) - 2 = \frac{3}{x-1} \text{ ssi } y - 2 = \frac{3}{x-1}$$

On pose  $\begin{cases} x-1=X \\ y-2=Y \end{cases}$  donc  $\begin{cases} x=X+1 \\ y=Y+2 \end{cases}$

$$y = \frac{2x+1}{x-1} \text{ ssi } Y = \frac{3}{X}$$

$$\begin{array}{r} 2x+1 \\ -2x+2 \\ \hline 3 \end{array}$$

$x-1$   
2

- Tableau de variations de  $X \rightarrow \frac{3}{X} (3 > 0)$

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           |   |           |


On a  $\begin{cases} X = 0 \\ Y = 0 \end{cases}$  donc  $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$

- Donc le tableau de variations de  $x \rightarrow \frac{2x+1}{x-1}$

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           |   |           |

- Représentation graphique

|    |               |    |   |   |               |   |
|----|---------------|----|---|---|---------------|---|
| -2 | 1-            | 0  | 1 | 2 | 3             | 4 |
| 1  | $\frac{1}{2}$ | -1 |   | 5 | $\frac{7}{2}$ | 3 |



**Exemples 3:** Soit  $g$  une fonction numérique tq :  $g(x) = \frac{-x}{x-2}$

on a  $g(x) \in \mathbb{R}$  ssi  $x-2 \neq 0$  ssi  $x \neq 2$

Donc  $D_g = \mathbb{R} - \{2\}$

Si  $x \in \mathbb{R} - \{2\}$  on a

$$g(x) = \frac{-x}{x-2} = \frac{-1(x-2)-2}{x-2} = \frac{-1(x-2)}{x-2} + \frac{-2}{x-2} = -1 + \frac{-2}{x-2}$$

$$g(x) + 1 = \frac{-2}{x-2} \text{ ssi } y + 1 = \frac{-2}{x-2}$$

On pose  $\begin{cases} x-2 = X \\ y+1 = Y \end{cases}$  donc  $\begin{cases} x = X+2 \\ y = Y-1 \end{cases}$

$$y = \frac{-x}{x-2} \text{ ssi } Y = \frac{-2}{X}$$

- Tableau de variations de  $X$   $\longrightarrow \frac{-2}{X} (-2 < 0)$

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           |   |           |


On a  $\begin{cases} X = 0 \\ Y = 0 \end{cases}$  donc  $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$


- Donc le tableau de variations de  $x$   $\longrightarrow \frac{-x}{x-2}$

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           |   |           |

- Représentation graphique

|      |   |   |   |    |    |      |
|------|---|---|---|----|----|------|
| -1   | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5    |
| -1/3 | 0 | 1 |   | -3 | -2 | -5/3 |





## X) Applications : Position relative de courbes, interprétation graphique d'équations et d'inéquations

Le but de ce chapitre est de pouvoir déterminer par le calcul, entre 2 courbes, quelle courbe se situe au-dessus de l'autre et sur quel(s) intervalle(s). Il te permettra d'interpréter ensuite, dans des problèmes plus concrets, des situations liées à la physique, la chimie, l'économie, ?

### 1) Position relative de deux courbes et intersection

Soient  $(C_f)$  la courbe représentative de  $f$  et  $(C_g)$  la courbe représentative de  $g$ .

On peut établir les relations suivantes :

$$M(x; y) \in (C_f) \text{ssi } y = f(x)$$

$$M(x; y) \in (C_g) \text{ssi } y = g(x)$$


Aux points d'intersection de  $(C_f)$  et de

$(C_g)$ , on a  $M \in (C_f)$  et  $M \in (C_g)$  donc

soit  $f(x) = g(x)$


**A retenir :**

- les solutions de l'équation  $f(x) = g(x)$  sont les abscisses des points d'intersection de  $(C_f)$  et de  $(C_g)$ .
- les solutions de l'inéquation  $f(x) \geq g(x)$  sont les abscisses des points de  $(C_f)$  situées au-dessus de  $(C_g)$ .
- les solutions de l'inéquation  $f(x) \leq g(x)$  sont les abscisses des points de  $(C_f)$  situées au-dessous de  $(C_g)$ .



**Un cas particulier : équation  $f(x) = m$  et inéquation  $f(x) \geq m$**

- Les solutions de l'équation  $f(x) = m$  sont les abscisses des points d'intersection de  $(C_f)$  avec la droite d'équation  $y = m$
- Les solutions de l'inéquation  $f(x) \geq m$  sont les abscisses des points de  $(C_f)$  situés au-dessus de la droite d'équation  $y = m$ .



**2) Quelques exercices d'application**

**Exercice1 :** Soit la courbe  $(C_f)$  représentative de  $f$  telle que  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3$  et la droite  $(D)$  d'équation  $y = -x - 3$

- 1- Résoudre graphiquement l'équation  $f(x) = 3$  puis l'inéquation  $f(x) < 3$ .
- 2- Résoudre graphiquement l'équation  $f(x) = 0$  puis l'inéquation  $f(x) \geq 0$   
(On donnera un encadrement d'amplitude  $5 \times 10$  des solutions non entières.)
- 3- Résoudre graphiquement l'équation  $f(x) = -x - 3$  puis l'inéquation  $f(x) \leq -x - 3$


**Réponses :** 1)  $f(x) = 3$  La solution est l'ensemble des antécédents de 3 :  $S = \{0; 4\}$

2-  $f(x) = 0$  La solution est l'ensemble des antécédents de 0 :  $S = \{a; 1; b\}$  Avec  $-1 < a < -0.5$  et  $3.5 < b < 4$

$f(x) \geq 0$   
 $S = [a; 1] \cup [b; +\infty[$

3-  $f(x) = -x - 3$  La solution l'ensemble des abscisses des points d'intersection de  $(C_f)$  et de D :  $y = -x - 3$  donc  $S = \{-1; 2; 3\}$


$f(x) \leq -x - 3$   
 $S = ]-\infty; -1] \cup [2; 3]$



**Exercice2 :** Soient  $f$  et  $g$  les deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = x^2 - 3x - 4$  et  $g(x) = 3x + 12$

- 1) Tracer Les courbes représentatives  $(C_f)$  et  $(C_g)$
- 2) Résoudre graphiquement et algébriquement l'équation  $f(x) = g(x)$
- 3) Résoudre graphiquement et algébriquement l'inéquation  $f(x) \geq g(x)$
- 4) Trouver les points d'intersection de la courbe  $(C_f)$  avec les axes du repère

**Réponses :** 1) Les courbes représentatives  $(C_f)$  (en rouge) et  $(C_g)$  (en bleu) sont données dans le repère ci-dessous



2) a) résolution graphique de l'équation  $f(x) = g(x)$

Il suffit de chercher les abscisses des points d'intersection des courbes  $(C_f)$  et  $(C_g)$

On a donc  $x = -2$  et  $x = 8$  donc  $S = \{-2; 8\}$

b) résolution algébrique de l'équation  $f(x) = g(x)$

$$f(x) = g(x) \text{ssi } x^2 - 3x - 4 = 3x + 12 \text{ssi } x^2 - 6x - 16 = 0$$

$$a = 1 \text{ et } b = -6 \text{ et } c = -16$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 1 \times (-16) = 36 + 64 = 100 = (10)^2 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-(-6) + \sqrt{100}}{2 \times 1} = \frac{6 + 10}{2} = \frac{16}{2} = 8 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-(-6) - \sqrt{100}}{2 \times 1} = \frac{6 - 10}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$\text{donc } S = \{-2; 8\}$$

3) a) résolution graphique de l'inéquation  $f(x) > g(x)$

La courbe  $(C_f)$  est au-dessus de  $(C_g)$  si  $x \in ]-\infty; -2[ \cup ]8; +\infty[$

Donc  $S = ]-\infty; -2[ \cup ]8; +\infty[$

b) résolution algébrique de l'inéquation  $f(x) > g(x)$

$f(x) > g(x)$ ssi  $x^2 - 3x - 4 > 3x + 12$ ssi  $x^2 - 6x - 16 > 0$

Les racines sont :  $x_1 = 8$  et  $x_2 = -2$

|                 |           |      |     |           |
|-----------------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$             | $-\infty$ | $-2$ | $8$ | $+\infty$ |
| $x^2 - 6x - 16$ | +         | 0    | -   | 0         |

Donc  $S = ]-\infty; -2[ \cup ]8; +\infty[$

5) a) Intersection de la courbe  $(C_f)$  avec l'axe des abscisses

Les points d'intersection C et D de la courbe  $(C_f)$  avec l'axe des abscisses ont leurs ordonnées nulles, et leurs abscisses sont les solutions de l'équation  $f(x) = 0$

$f(x) = 0$ ssi  $x^2 - 3x - 4 = 0$

$a = 1$  et  $b = -3$  et  $c = -4$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25 = (5)^2 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-(-3) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 + 5}{2} = \frac{8}{2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-(-3) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 - 5}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

donc les points d'intersection de la courbe  $(C_f)$  avec l'axe des abscisses sont :

$C(-1; 0)$  et  $D(4; 0)$

b) Intersection de la courbe  $(C_f)$  avec l'axe des ordonnées

le point d'intersection de la courbe  $(C_f)$  avec l'axe des ordonnées a une abscisse nulle

et on a  $f(0) = 0^2 - 3 \times 0 - 4 = -4$

donc le point d'intersection de la courbe  $(C_f)$  avec l'axe des ordonnées est :  $E(-4; 0)$