

### I- Définition d'une solution aqueuse

Une solution est obtenue par dissolution d'une espèce chimique dans un liquide appelé **solvant** : l'espèce chimique dissoute est appelée **soluté**.

Dans une solution, le solvant est l'espèce chimique majoritaire et le soluté est l'espèce minoritaire.

Il y a une limite à la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant : si l'on dépasse cette limite on obtient une solution saturée.

#### Remarque

Si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution aqueuse.

### II- Notion de concentration

#### Notion de concentration massique

On appelle, concentration massique  $C_m$  , le rapport entre  $m(x)$  la masse de soluté dissous et  $V$  la volume totale de la solution :  $C_m(x) = \frac{m(x)}{V}$

La concentration massique exprimée en g/L

#### Notion de concentration molaire

On appelle, concentration molaire  $C(x)$  en soluté apporté d'une solution aqueuse de ce soluté, le rapport entre  $n(x)$  la quantité matière de soluté dissous et  $V$  la volume totale de la solution  $C(x) = \frac{n(x)}{V}$

Une concentration molaire est souvent exprimée en mol/L qui n'est pas l'unité internationale.

L'unité internationale de concentration molaire est le mol/m<sup>3</sup>

#### La relation entre concentration molaire et massique

$$C(x) = \frac{n(x)}{V} \text{ avec } n(x) = \frac{m(x)}{M(x)} \Leftrightarrow C(x) = \frac{m(x)}{V} \cdot \frac{1}{M(x)} \Leftrightarrow C(x) = C_m(x) \cdot \frac{1}{M(x)}$$

### III- Dilution d'une solution aqueuse

Diluer une solution aqueuse , c'est l'ajoute de l'eau distillée à un volume donné de cette solution :

- la **solution de départ** est appelée solution **mère**.


- la **solution diluée** obtenue est appelée **fille** :

La concentration molaire  $C_{fille}$  de la solution-fille est toujours inférieur à la concentration molaire  $C_{mère}$  de solution-mère


Lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière  $n_{fille} = n_{mère}$  , ce qui se traduit par la relation entre les concentrations  $C_{fille}$  ,  $C_{mère}$  et les volumes  $V_{mère}$ , volume de solution-mère prélevé et  $V_{fille}$  volume de solution fille fabriquée ;  $C_{fille} \cdot V_{fille} = C_{mère} \cdot V_{mère}$

#### Protocole d'une préparation de solution par dilution

Introduire la solution mère dans un bêcher. Prélever à l'aide d'une pipette jaugée, rincée et de volume préalablement calculé, la solution mère.



Verser la solution mère prélevée dans une fiole jaugée de volume adapté



Compléter la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et agiter en retournant complètement la fiole jaugée pour homogénéiser la solution.

